

Istituzioni di Algebra

A.A. 2025-2026

SIMONE SACCANI

ALGEBRA COMMUTATIVA

Topologia di Zariski

Def. A ring (commutative with 1)

$$\text{Spec } A = \{ \mathfrak{p} \subseteq A \mid \mathfrak{p} \text{ is prime} \}$$

Open sets: a basis is given by the principal open sets

$$D(a) = \{ \mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{p} \not\ni a \}, \quad a \in A$$

Rmk Closed sets: $\left(\bigcup_{a \in X} D(a) \right)^c = \bigcap_{a \in X} D(a)^c = \bigcap_{a \in X} \{ \mathfrak{p} \in \text{Spec } A \mid a \in \mathfrak{p} \} =$
 $= \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \ni a \quad \forall a \in X \} = \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \supseteq (a : a \in X) \} =: V(I)$
 where $I = (a : a \in X)$

Ex $\{ \mathfrak{p} \}$ is a closed subset $\iff \mathfrak{p}$ is maximal

Pf $(\Leftarrow) \{ \mathfrak{p} \} = V(\mathfrak{p}) = \{ \mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p} \} = \{ \mathfrak{p} \}$

$(\Rightarrow) \{ \mathfrak{p} \} = V(I) \quad \mathfrak{p} \in V(I) \Rightarrow I \subseteq \mathfrak{p}$

If $\mathfrak{p} \ni \mathfrak{q}$ with $\mathfrak{q}$ prime, then $I \subseteq \mathfrak{q} \Rightarrow \mathfrak{q} \in V(I) = \{ \mathfrak{p} \} \Rightarrow \mathfrak{p} = \mathfrak{q} \Rightarrow \mathfrak{p}$ maximal

Def. Let $\varphi: A \rightarrow B$ be a ring homomorphism

$$\begin{aligned} \varphi^*: \text{Spec } B &\longrightarrow \text{Spec } A \\ \mathfrak{p} &\longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

Ex φ^* is continuous

Pf We check that $(\varphi^*)^{-1}(D(a))$ is open

$$\begin{aligned} (\varphi^*)^{-1}(D(a)) &= \{ \mathfrak{p} \in \text{Spec } B \mid \varphi^*(\mathfrak{p}) \in D(a) \} = \{ \mathfrak{p} \mid \varphi^*(\mathfrak{p}) \not\ni a \} = \\ &= \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \not\ni \varphi(a) \} = D(\varphi(a)) \end{aligned}$$

□

esempio • $\text{Spec } \mathbb{Q} = \{ \cdot \}$

• $\text{Spec } \mathbb{Z} =$


$$V((0)) = \text{Spec } \mathbb{Z}$$

$$V((n)) = \{ \mathfrak{p} \in \text{Spec } \mathbb{Z} \mid \mathfrak{p} \ni n \} = \{ p \mid p \mid n \}$$

Closed subsets = finite unions of closed points (or $\text{Spec } \mathbb{Z}$)


• $\text{Spec } \mathbb{C}[x]$

$$(0), (\varphi(x)) = (x - x_0) \quad \text{for } x_0 \in \mathbb{C}$$



• $\text{Spec } \mathbb{R}[x]$

$$(0), (x - x_0), (x^2 + ax + b) \quad \text{with } a^2 - 4b < 0$$



Closed sets: $\emptyset, \text{Spec } \mathbb{C}[x]$, finite unions of closed pts

$$x^2 + ax + b \quad \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ \parallel & & \\ \varphi: \mathbb{C}[t] & \xrightarrow{\quad} & \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-1)} = B \\ t & \mapsto & x \end{array}$$

$$\varphi^\# : \text{Spec } B \longrightarrow \text{Spec } A$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } \mathbb{C}[t] & \xrightarrow{(t-x_0)} & \\ \text{Spec } B & \xrightarrow{(y-1, x-x_0)} & \uparrow \varphi^\# \\ & & \bullet (y-1) \\ & & \bullet (y+1) \end{array}$$

$$\{ \mathfrak{p} \in \mathbb{C}[x,y] \text{ prime} \mid \mathfrak{p} \supseteq (y^2-1) \} = \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \supseteq y+1 \text{ or } \mathfrak{p} \supseteq y-1 \}$$

$$\{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \supseteq y-1 \} \longleftrightarrow \{ \mathfrak{q} \text{ prime of } \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y-1)} \cong \mathbb{C}[x] \}$$

$$(y-1), (y-1, x-x_0) \longleftrightarrow (0), (x-x_0)$$

$$\bullet \text{Spec } \mathbb{Z}[i] \xrightarrow{i^\#} \text{Spec } \mathbb{Z}$$

$$i: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}[i]$$

$$(0), (3), (7), (11), (p) \text{ with } p \equiv 3 \pmod{4}$$

$$5 = (2+i)(2-i) \quad 2+i, 2-i \text{ are prime}$$

$$(2) = (1+i)^2$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & (2+i) & & (2+3i) & & \\ & & \bullet & & \bullet & & \\ i^\# \swarrow & (1+i) & (3) & & (7) & (11) & \\ & \bullet & \bullet & & \bullet & \bullet & \\ & (2-i) & & & (2-3i) & & \\ \searrow & (2) & (3) & (5) & (7) & (11) & (13) \\ & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet & \bullet \\ & & & & & & (0) \end{array}$$

$$(2+i)\mathbb{Z}[i] \cap \mathbb{Z} = (5)$$

$$(2+i)(a+bi) = n$$

$$(2-i)(a-bi) = n$$

$$n \in (2+i) \cap (2-i) = (2+i)(2-i) = (5)$$

Rmk : rings as rings of functions

$$\mathcal{S} = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1 \}$$

$f(x,y) \in \mathbb{R}[x,y]$ is a function on the circle

$$f_1(x,y) \equiv 1 \quad f_2(x,y) = x^2 + y^2$$

$$\text{Same function} \iff (f_1 - f_2)(x,y) = 0 \quad \forall (x,y) \in \mathcal{S}$$

$$\iff f_1 - f_2 \in (x^2 + y^2 - 1)$$

$\mathbb{R}[x,y]/(x^2 + y^2 - 1)$ is the ring of polynomial functions on the variety defined by $x^2 + y^2 - 1 = 0$

Topological interpretation of known results

$$\bullet \{ \text{ideals in } A/I \} \longleftrightarrow \{ \text{ideals in } A \text{ containing } I \}$$

$$J \longmapsto \pi^{-1}(J)$$

$$\pi: A \longrightarrow A/I, \quad \pi^\#: \text{Spec } A/I \longrightarrow \text{Spec } A$$

$$\searrow \sim \downarrow V(I)$$

$$\text{Im } \pi^\# = \{ \pi^{-1}(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \in \text{Spec } A/I \} =$$

$$= \{ \mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \supseteq I \} = V(I)$$

Let's check that the topologies agree

$$\overline{X} \subseteq \text{Spec } A/I \text{ closed subset, } \overline{X} = V(\overline{J}) \text{ for some } \overline{J} \triangleleft A/I \longleftrightarrow J \supseteq A, J \supseteq I$$

$$V(\overline{J}) \cap \text{Im } \pi^\# = \{ \mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \supseteq \overline{J} \} \cap V(I) = \{ \mathfrak{q} \in \text{Spec } A \mid \mathfrak{q} \supseteq J \} =$$

$$= \{ \pi^\#(\mathfrak{q}) \mid \mathfrak{q} \supseteq \overline{J} \} = V(\overline{J})$$

esempio $\pi: \mathbb{C}[x] \longrightarrow \mathbb{C}[x]/(x(x-1))$
 $\pi^*: \text{Spec } \mathbb{C}[x]/(x(x-1)) \xrightarrow{\sim} \text{Spec } \mathbb{C}[x]$
 $(x) \quad (x-1) \xrightarrow{\sim} (x) \quad (x-1) \quad (0)$

- Localization by $S = \{a^n\}, a \in A$

$$\begin{aligned} i: A &\longrightarrow S^{-1}A \\ a &\longmapsto \frac{a}{1} \\ \{ \mu \in \text{Spec } S^{-1}A \} &\longleftrightarrow \{ \mu \in \text{Spec } A \mid \mu \cap S = \emptyset \} = \{ \mu \in \text{Spec } A \mid \mu \not\ni a \} = D(a) \\ i^*: \text{Spec } S^{-1}A &\xrightarrow{\sim} \text{Spec } A \\ &\searrow \sim \\ &D(a) \end{aligned}$$

EX i^* identifies $\text{Spec } S^{-1}A$ with $D(a)$ (as topological spaces)

esempio $A = \mathbb{Z}, S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}, S^{-1}A = \mathbb{Q}, i: A \longrightarrow \mathbb{Q}$
 $i^*: \text{Spec } \mathbb{Q} \longrightarrow \{0\} \in \text{Spec } A$
 but $\{0\}$ is not open in $\text{Spec } \mathbb{Z}$

- Nilradical: $\sqrt{(0)} = \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}_{\geq 1} \text{ s.t. } a^n = 0\}$

FACT $\sqrt{(0)} = \bigcap_{\mu \in \text{Spec } A} \mu$

$$\begin{aligned} \pi: A &\longrightarrow A/\sqrt{(0)} \\ \pi^*: \text{Spec } A/\sqrt{(0)} &\xrightarrow{\sim} \text{Spec } A \end{aligned}$$

Slogan: A and $A/\sqrt{(0)}$ have the same spectrum (Δ for us)

- Chinese Remainder Theorem (= disconnected topological spaces)

$$A = B \times C \longrightarrow \text{Spec } A = \text{Spec } B \sqcup \text{Spec } C$$

Reason: $I \triangleleft A \Rightarrow I = I_1 \times I_2$ with $I_1 \triangleleft B, I_2 \triangleleft C$

$$A/I_1 \cong B/I_1 \times C/I_2 \text{ can only be an integral domain if } B/I_1 = \{1\} \text{ or } C/I_2 = \{1\}$$

$$\text{Spec } A = \{ B \times I_2 \mid I_2 \in \text{Spec } C \} \sqcup \{ I_1 \times C \mid I_1 \in \text{Spec } B \}$$

Conversely, suppose $\text{Spec } A$ is disconnected

$$\text{Spec } A = V(I) \sqcup V(J) \text{ for some ideals } I, J$$

1) $V(I) \cap V(J) = \emptyset$: no prime μ contains both I and J

$$\Rightarrow I+J = (1) \text{ because } I+J \text{ is not contained in any max ideal}$$

2) $\forall \mu \in \text{Spec } A$ is either in $V(I)$ or in $V(J)$, so

$$\forall \mu \quad \mu \supseteq I \text{ or } \mu \supseteq J \Rightarrow \mu \supseteq I \cap J$$

$$\text{so } (0) = \sqrt{(0)} = \bigcap_{\mu} \mu \supseteq I \cap J$$

$\uparrow$
if A is reduced

So I, J satisfy the assumptions of the CRT, and

$$A \cong A/I \times A/J$$

! A different point of view

$$\text{Spec } A = \underbrace{V(I)}_{\text{one comp.}} \cup \underbrace{V(J)}_{\text{other comp.}}$$

I want to find a function f on this top. space that is 0 on one comp. and 1 on the other.

$$\begin{cases} f \equiv 0 & (I) \\ f \equiv 1 & (J) \end{cases}$$

A anello, $\text{Spec } A$ disconnesso $= V(I) \amalg V(J)$

$$\Rightarrow A/\sqrt{0} = A_{\text{red}} \simeq B \times C$$

$$\begin{matrix} (1,0) \\ (0,1) \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \exists \bar{e}, 1-\bar{e} \in A^{\text{red}} \text{ t.c. } \bar{e}(1-\bar{e}) = \bar{0}$$

$$\Leftrightarrow \exists e \in A \text{ t.c. } (e(1-e))^N = 0$$

Gli ideali $I_1 = e^N, I_2 = (1-e)^N$ soddisfanno le ipotesi del TCR:

$$\bullet I_1 + I_2 = (1)$$

$$\text{Sia } P \text{ primo} \ni I_1 + I_2 \Rightarrow P \ni e^N, (1-e)^N \Rightarrow P \ni e, 1-e \Rightarrow P \ni 1 \nmid$$

$$\bullet I_1 \cap I_2 = I_1 I_2 = (e^N)((1-e)^N) = 0$$

$$\Rightarrow A \simeq A/I_1 \times A/I_2 \quad (\text{con i fattori non banali})$$



Conclusione A è un prodotto $\Leftrightarrow \text{Spec } A$ è disconnesso

EX $A = \mathbb{Z}[x]/((x-3)(x+4))$, $S = \{x^k\}_{k \in \mathbb{N}}$

Show that A is not a product but $S^{-1}A$ is.

sol $i: \mathbb{Z} \hookrightarrow A$

$$i^*: \text{Spec } A \longrightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$$



$$\text{Spec } A = \{ \text{primes in } \mathbb{Z}[x] \text{ containing } (x-3)(x+4) \} =$$

$$= \{ \text{primes cont. } (x-3) \} \cup \{ \text{primes cont. } (x+4) \} =$$

$$\doteq \text{Spec } \mathbb{Z}[x]/(x-3) \cup \text{Spec } \mathbb{Z}[x]/(x+4) \doteq \text{Spec } \mathbb{Z} \cup \text{Spec } \mathbb{Z} =$$

$$= \{ (x-3), (x-3, p) \mid p \text{ prime of } \mathbb{Z} \} \cup \{ (x+4), (x+4, p) \mid p \text{ prime of } \mathbb{Z} \}$$

Algebraic version:


$$S^{-1}A \simeq \frac{S^{-1}\mathbb{Z}[x]}{(x-3)(x+4)} \simeq \frac{S^{-1}\mathbb{Z}[x]}{(x-3)} \times \frac{S^{-1}\mathbb{Z}[x]}{(x+4)}$$

$$(x-3) + (x+4) \stackrel{?}{=} (1)$$

$$(x-3, x+4) = (x-3, 7)$$

$$S^{-1}\mathbb{Z} \times S^{-1}\mathbb{Z}$$

def. X spazio topologico si dice irriducibile se per ogni scrittura $X = C_1 \cup C_2$ come unione di due chiusi si ha $C_1 = X$ o $C_2 = X$.



esempio $\text{Spec } \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(xy)} \rightsquigarrow$

$$\begin{aligned} & \{ \mathfrak{p} \in \text{Spec } \mathbb{C}[x,y] \mid \mathfrak{p} \supseteq (xy) \} \\ & \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \supseteq (x) \} \cup \{ \mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \supseteq (y) \} \\ & \text{Spec } \mathbb{C}[y] \quad \text{Spec } \mathbb{C}[x] \\ & V(x) \subseteq \text{Spec } \mathbb{C}[x,y]/(xy) = V(x) \cup V(y) \end{aligned}$$



Lemma X top. space, $Y \subseteq X$ irreducible $\Rightarrow \overline{Y}$ irreducible.

Dimostrazione

$$\begin{aligned} \overline{Y} &= C_1 \cup C_2 \text{ with } C_1, C_2 \text{ closed in } X \text{ (or equiv. in } \overline{Y}). \\ \Rightarrow Y &= \overline{Y} \cap Y = \underbrace{(C_1 \cap Y)}_{\text{closed in } Y} \cup \underbrace{(C_2 \cap Y)}_{\text{closed in } Y} \Rightarrow C_1 \cap Y = Y \text{ or } C_2 \cap Y = Y \end{aligned}$$

$$\text{wlog } C_1 \cap Y = Y \Rightarrow Y \subseteq C_1 \Rightarrow \overline{Y} \subseteq C_1 \Rightarrow \overline{Y} = C_1. \quad \square$$

corollario $x \in X \Rightarrow \overline{\{x\}}$ is irreducible

In the example, $V(x) \simeq \text{Spec } \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(x)} \simeq \text{Spec } \mathbb{C}[y] = \overline{\{0\}}$
 let's check: $\overline{\{0\}} = \bigcap_{\substack{V \ni 0 \\ I \subseteq (0)}} V(I) = V((0)) = \text{Spec } \mathbb{C}[y]$

def. An irred. component is an irred. subset, maximal by inclusion.

teorema let R be a ring

$$\begin{aligned} \{ \text{closed subsets of } \text{Spec } R \} &\longleftrightarrow \{ \text{radical ideals } I \text{ of } R : I = \sqrt{I} \} \\ \alpha: C &\xrightarrow{\quad} \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \in C \\ I \subseteq \mathfrak{p}}} I : \beta \\ V(I) &\xleftarrow{\quad} \end{aligned}$$

(i) α, β are inclusion-reversing bijections that are mutually inverse
 (ii) C irred $\iff \alpha(C)$ is prime
 (iii) Irred components of $\text{Spec } R \longleftrightarrow$ minimal primes of R

Dimostrazione

$$(i) C_1 \subseteq C_2 \Rightarrow \alpha(C_1) \supseteq \alpha(C_2)$$

$$\begin{aligned} I_1 \subseteq I_2 &\Rightarrow \bigcap_{\mathfrak{p} \in C_1} \mathfrak{p} \supseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in C_2} \mathfrak{p} \\ V(I_1) &= \{ \mathfrak{p} : I_1 \subseteq \mathfrak{p} \} \\ V(I_2) &= \{ \mathfrak{p} : I_2 \subseteq \mathfrak{p} \} \end{aligned}$$

$$(a) \alpha(\beta(I)) = \alpha(V(I)) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = \bigcap_{I \subseteq \mathfrak{p}} \mathfrak{p} = \sqrt{I} = I$$

$$(b) V(I) = V(\sqrt{I}). \text{ indeed } \mathfrak{p} \supseteq I \iff \mathfrak{p} \supseteq \sqrt{I}$$

So every closed subset is of the form $\beta(V(I))$, hence β is surjective

(a) $\Rightarrow \beta$ is injective

$\Rightarrow \beta$ is a bijection and (a) $\Rightarrow \alpha$ is the inverse

(ii) Let's first prove that $\forall$ prime $\mathfrak{p}$ we have

$$\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$$

($\Leftarrow$) It suffices $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{p})$, true by def.

$$(\Rightarrow) \overline{\{\mathfrak{p}\}} = \bigcap_{\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{I}} V(\mathfrak{I}) = \bigcap_{\mathfrak{I} \subseteq \mathfrak{p}} V(\mathfrak{I}) \supseteq V(\mathfrak{p}) \iff V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{I}) \quad \forall \mathfrak{I} \subseteq \mathfrak{p}$$

which is true since V reverses inclusions.

($\Leftarrow$) If $\mathfrak{p}$ is prime, $V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$ is irred. by the Cor.

($\Rightarrow$) C irred, $I = I(C)$. Let $a, b \in R$ s.t. $ab \in I$

$$\text{Claim: } C = V(\sqrt{I(a)}) \cup V(\sqrt{I(b)})$$

$$V(I)'' = C$$

To prove ($\Leftarrow$), take $\mathfrak{p} \in C \iff \mathfrak{p} \supseteq I$. Then

$$ab \in I \subseteq \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ or } b \in \mathfrak{p}$$

$$\hookrightarrow (I, a) \subseteq \mathfrak{p} \implies \sqrt{I(a)} \subseteq \mathfrak{p} = \mathfrak{p}$$

$$\implies \mathfrak{p} \in V(\sqrt{I(a)})$$

$$C \text{ irred} \implies \text{wlog } V(\sqrt{I(a)}) = C = V(I)$$

$$\stackrel{(i)}{\implies} I = \sqrt{I(a)} \ni a, \text{ so } I \text{ is prime.}$$

(iii) Irred. subsets $\longleftrightarrow$ primes (ii)

Maximal under inclusion $\longleftrightarrow$ minimal under inclusion (i)

proposizione R Noetherian ring. $\text{Spec} R$ has finitely many connected components and finitely many irreducible components.

DIMOSTRAZIONE

By Noetherian induction

$X = \{C \subseteq \text{Spec} R \text{ closed subspaces having infinitely many irred. comp.}\}$

If $X = \emptyset$, we're done.

Otherwise, X has a minimal element.

$$\begin{array}{c} X \\ \emptyset \\ C_1 \not\supseteq C_2 \not\supseteq C_3 \not\supseteq \dots \end{array}$$

$$V(I_1) \not\supseteq V(I_2) \not\supseteq V(I_3) \not\supseteq \dots$$

$$I_1 \not\supseteq I_2 \not\supseteq I_3 \not\supseteq \dots \quad \text{cannot go on forever}$$

Let C be minimal.

• C is irreducible: contradiction as $C \in X$

• C is reducible: $C = C_1 \cup C_2$, C_1, C_2 closed $\neq C$

$\implies C_1, C_2 \notin X \implies$ they have finitely many irred. comp.

$\implies C$ has finitely many irred. comp. □

corollario If R is Noetherian, then R has finitely many minimal primes.

DIMOSTRAZIONE

Minimal primes correspond to irred. comp. □

Dimensione di Krull

Def. Let R be a ring.

A chain of prime ideals in R is a sequence

$P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq P_2 \subsetneq \dots \subsetneq P_n$, where each P_i is a prime ideal of R

The length of such chain is n

The Krull dimension of R is the sup of the lengths of all the chains of prime ideals in R .

esempio • $R = \mathbb{C}[x_1, x_2, x_3, \dots]$ has $\dim R = +\infty$

$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq \dots$

• $\dim R$ can be infinite if R is Noetherian

• $\dim \mathbb{Q} = 0$, $\dim(\text{field}) = 0$

• $\dim \mathbb{C}[x]_{(x)} = 0$ (only prime ideal is (x))

• $\dim \mathbb{Z} = 1$ $(0) \subsetneq (p)$

• $\dim R = 1$ where R is a PID not a field

• $\dim \mathbb{Z}[x] = 2$

Prime ideals: (0) , (p) , $(f(x))$, $(p, g(x))$
 $f(x)$ primitive + irred in $\mathbb{Q}[x]$, $g(x)$ irred mod p

• $\dim \mathbb{C}[x, y] = 2$

Let P be a prime of $\mathbb{C}[x, y]$

(0) , $(x-x_0, y-y_0)$, $(f(x, y))$

$P \cap \mathbb{C}[x] = \begin{cases} (0) & (1) \\ (x-x_0) & (2) \end{cases}$

(2): $P \supseteq (x-x_0) \iff \text{primes of } \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x-x_0)} \simeq \mathbb{C}[y] \supseteq (0), (y-y_0)$
 $\implies (x-x_0), (x-x_0, y-y_0)$

(1): $P \cap \mathbb{C}[x] = (0)$ $S := \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$

$\downarrow$
 prime ideal in $S^{-1}\mathbb{C}[x, y] = \mathbb{C}(x)[y] \supseteq (0), (\frac{f(x, y)}{g(x)})$
"

$(0), (f(x, y))$ in $\mathbb{C}[x, y] \longleftrightarrow (0), (\frac{f(x, y)}{g(x)})$

Prime ideals are (0) , $(f(x, y))$, $(x-x_0, y-y_0)$.


In particular they're either maximal or principal.

$(0) \subsetneq (x) \subsetneq (x, y)$

$(0) \subsetneq (x^2+y^2-1) \subsetneq (x-1, y)$ (*)

$(0) \subsetneq (f_1(x, y)) \subsetneq (f_2(x, y)) \subsetneq (x-x_0, y-y_0)$


impossible: f_1, f_2 are irred.



Why primes?

$\times > \times > / > \cdot$

we don't want chains like these!



Anelli Artiniani

A ring R is Artinian if it satisfies the descending chain condition (dcc) on ideals: every chain $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$ is eventually stationary.
Equivalently, there are no infinite chains $I_1 \supseteq I_2 \supseteq I_3 \supseteq \dots$

Aim: Artinian $\iff$ Noetherian of dimension 0.

Motivation: R Noeth of dim 0.

$\text{Spec } R = \cdot \quad \cdot \quad \cdot \quad \cdot$
 $\odot$
 spectrum of a local Artinian ring

Teorema di struttura per anelli Artiniani

Every Artinian ring is a finite direct product of local Artinian rings.

Lemma R Artinian domain $\implies R$ is a field.

DIMOSTRAZIONE

$t \in R \setminus \{0\}$. Consider $(t) \supseteq (t^2) \supseteq (t^3) \supseteq \dots$

By the Artin property, $\exists n$ s.t. $(t^n) = (t^{n+1})$.

$\implies \exists u \in R^\times$ s.t. $t^{n+1} = ut^n \implies t^n(t-u) = 0$

$\implies t = u \in R^\times$

□

corollario Let R be Artinian. Every prime ideal is maximal.

DIMOSTRAZIONE

$P \triangleleft R$ prime. $R/P = \text{Artinian domain} = \text{field}$
 $\implies P$ maximal.

□

Lemma di Nakayama

Let R be a local ring with maximal ideal $\mathfrak{m}$ and let N be a finitely-generated R -module.
If $\mathfrak{m} \cdot N = N$, then $N = (0)$.

Preliminari:

- un A -modulo è Noetheriano/Artiniano se soddisfa ACC/DCC per i sottomoduli
- A è Noetheriano/Artiniano se lo è come A -modulo (i sottomoduli sono gli ideali)
- $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ succ. esatta corta
 M Noeth/Artin $\iff M', M''$ Noeth/Artin
- Per un modulo, Artiniano $\not\Rightarrow$ Noetheriano
esempio $M = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}[p^\infty] = \{x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z} : \exists n \geq 1 \text{ t.c. } p^n x = 0\}$
- Se $A = K$ è un campo, un A -mod M (cioè un K -sp. vett.)
è Noetheriano $\iff \dim_K M < +\infty \iff$ è Artiniano
- Sia M un A -modulo e $\text{Ann}_A M := \{a \in A \mid aM = 0 \forall M \in M\}$
Allora M è un $A/\text{Ann}_A M$ -modulo: $\bar{a} \cdot m = am$ con $a \in A$ un qualsiasi sollevamento di $\bar{a}$

Oss Un A -modulo è un gruppo abeliano M + un omomorfismo di anelli $\Phi: A \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(M)$

Allora $\text{Ann}_A M = \text{Ker } \Phi \rightsquigarrow \bar{\Phi}: A/\text{Ker } \Phi \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}} M$

- Conseguenza di Nakayama: $(A, \mathfrak{m})$ anello locale con ideale massimale $\mathfrak{m}$,
 N un A -mod fin.gen, e $n_1, \dots, n_r \in A$ t.c. $\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_r \in N/\mathfrak{m}N$ sono generatori
 $\implies n_1, \dots, n_r$ sono generatori di N .

DIMOSTRAZIONE

$$\begin{aligned} S = \langle n_1, \dots, n_r \rangle & \quad S/\mathfrak{m}N \cap S = N/\mathfrak{m}N \implies S + \mathfrak{m}N = N \\ \implies N/S & = S + \mathfrak{m}N/S = \mathfrak{m}(N/S) \xrightarrow{\text{nak}} N/S = \{0\} \implies N = S. \end{aligned}$$

teorema A anello Artiniano $\implies A$ Noetheriano.

DIMOSTRAZIONE

$\mathcal{C} = \{I \triangleleft A \mid I \text{ non fin.gen.}\}$. La tesi è che $\mathcal{C} = \emptyset$.

Supponiamo per assurdo $\mathcal{C} \neq \emptyset$: allora ha un el. minimale $I \neq (0)$.

Oss Sia $r \in A$. C'è una successione esatta

$$0 \rightarrow \{i \in I \mid ri = 0\} = I[r] \rightarrow I \xrightarrow{\cdot r} rI \rightarrow 0$$

Almeno uno fra $I[r]$ e rI non è fin.gen

Siccome $I[r], rI \subseteq I$ e se il contenimento è stretto sono fin.gen.,
allora o $I[r] = I$ o $rI = I$

Conseguenza: $P = \text{Ann}_A I$ è primo: se $xy \in P$, voglio mostrare $x \in P$ o $y \in P$.

Se così non fosse, $xy \cdot I = x(yI) = xI = I$, assurdo.

I è un A -modulo $\implies I$ è un A/P -modulo

A artiniano: P primo $\implies P$ massimale

$\implies I$ è uno sp. vett. su A/P , artiniano

$\implies I$ è Noeth. come sp. vett.

$\implies I$ è fin.gen. come A/P -mod, quindi come A -mod. ζ

□

proposizione A Artiniano $\implies A$ Noetheriano di dim. 0.

proposizione $(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano di dim 0.
Allora A è Artiniano.

DIMOSTRAZIONE

Dimostriamo che $\mathfrak{m}$ è nilpotente.

Modo 1: considero $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}^2 \supseteq \mathfrak{m}^3 \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{m}^n$ si stabilizza
 $\implies \exists n$ t.c. $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$. $M := \mathfrak{m}^n$ è fin.gen. e $\mathfrak{m}M = M$

$\implies M = (0)$ per Nakayama

Modo che funziona: $\sqrt{(0)} = \bigcap P = \mathfrak{m} \implies \exists n$ t.c. $\mathfrak{m}^n = (0)$

Per induzione su n : $n=1$, $\mathfrak{m} = (0)$, A è un campo e quindi Artiniano.

$$0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow A / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow A / \mathfrak{m}^n \longrightarrow 0$$

$\xRightarrow{\text{A-mod}}$
 $\implies A/\mathfrak{m} - \text{mod}$

$\implies$ sp. vett. di dim. finita
perché $\mathfrak{m}^n$ è fin.gen.

$\implies$ artiniano come A -mod.

Per esattezza, A è Artiniano.



teorema (1) A Noeth, $\dim A = 0 \implies A \simeq \prod_{i=1}^r A_i$, A_i locale Noeth di dim 0
(2) A Noeth, $\dim A = 0 \implies A$ Artiniano

DIMOSTRAZIONE

(1) $\implies$ (2) facilmente perché ogni A_i è Artiniano per la Prop. precedente

(1) A Noeth $\implies A$ ha un n° finito $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ di primi minimali, che sono anche massimali (e anche tutti gli id. primi poiché $\dim A = 0$).

$$N := \mathfrak{m}_1 \dots \mathfrak{m}_r = \mathfrak{m}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{m}_r = \sqrt{(0)} \implies \exists n \geq 1 \text{ t.c. } N^n = (0)$$

$$\mathfrak{m}_i^n + \mathfrak{m}_j^n = (1) \text{ perché } \mathfrak{m}_i + \mathfrak{m}_j = (1)$$

$$A \simeq A/N^n = A/\mathfrak{m}_1^n \dots \mathfrak{m}_r^n \simeq \prod_{i=1}^r A/\mathfrak{m}_i^n$$

Vediamo che $A/\mathfrak{m}_i^n$ è Noeth, locale, 0-dim.



Domini di valutazione discreta (DVR)

Def. Un DVR è un PID locale che non è un campo.

esempio $\mathbb{Z}_{(p)}$, $\mathbb{Z}_p$ = anello degli interi p-adici
 $\mathbb{C}[[t]] = \{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \mid a_n \in \mathbb{C} \}$, locale con ideale (t)

proposizione Sia $(A, \mathfrak{m})$ dominio locale. Le seguenti sono equivalenti:

- (1) A è un DVR
- (2) A è Noeth di dim 1, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ è un $A/\mathfrak{m}$ -sp. vett. di dim 1
- (3) A è Noeth, $\mathfrak{m}$ è principale e $\mathfrak{m} \neq (0)$.

DIMOSTRAZIONE

(1) $\Rightarrow$ (2) Per def A è PID $\Rightarrow A$ Noeth.

$\dim \leq 1$ perché è PID e $\dim \neq 0$ perché A non è campo.

$\dim_{A/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1$: na $\dim \leq 1$ perché $\mathfrak{m}$ è principale
 (la classe mod $\mathfrak{m}$ genera $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$)

e $\dim \neq 0$: se $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = (0) \Rightarrow \mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2$
 $\xrightarrow{\text{Nak}} \mathfrak{m} = (0) \nleftrightarrow$

(2) $\Rightarrow$ (3) l'unica parte non banale è che $\mathfrak{m}$ è principale:

se $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \langle \bar{t} \rangle \xrightarrow{\text{Nak}} \mathfrak{m} = (t)$

Oss $\dim_{A/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \stackrel{(\ast)}{=} \dim A$: regolarità

(3) $\Rightarrow$ (1) Scegliamo $\mathfrak{m} = (t)$. Dimostriamo che ogni elemento di $A \setminus \{0\}$ si scrive in modo unico come $a = ut^n$ con $n \in \mathbb{N}$, $u \in A^\times$.

$a \in A \begin{cases} a \in \mathfrak{m} : a = ta_1 \begin{cases} a_1 \in A^\times, u = a_1, n = 1 \\ a = t \cdot ta_2 \end{cases} \\ a \notin \mathfrak{m} \Rightarrow a \in A^\times (u = a, n = 0) \end{cases}$

Vediamo che questo procedimento si ferma per Noetherianità:

Considero la catena di ideali $(a) \subseteq (a_1) \subseteq (a_2) \subseteq \dots$

$\exists n$ t.c. $(a_n) = (a_{n+1}) \Leftrightarrow \exists u \in A^\times$ t.c. $u' a_n = a_{n+1}$
 $u' t a_{n+1}$

O $a_{n+1} = 0 \Rightarrow a = 0$, oppure $u't = 1 \Rightarrow t = (u')^{-1}$ è unità, assurdo.

Dimostriamo che A è PID.

Sia I un ideale: $I = \{u_i t^{n_i} \mid i \in \mathbb{N}, u_i \in A^\times, n_i \in \mathbb{N}\}$

Sia $n = \min \{n_i\}$. Allora $t^n \in I$ e viceversa

ogni $u_i t^{n_i} = (u_i t^{n_i-n}) t^n \in (t^n) \Rightarrow I = (t^n)$.

Inoltre, se $u_1 t^{n_1} = u_2 t^{n_2} \Rightarrow t^{n_2-n_1} = u_1 u_2^{-1} \in A^\times \Rightarrow n_2 = n_1, u_1 = u_2$

□

Oss Ogni ideale è della forma $(t^n) = (t)^n = \mathfrak{m}^n$

Oss Sia A un DVR e $K = \text{Frac}(A) = A[\frac{1}{t}]$

$a \in A$ si scrive $a = ut^n \xrightarrow{u_1 t^{n_1}} \frac{u_1 t^{n_1}}{u_2 t^{n_2}} \in A[\frac{1}{t}]$

Inoltre ogni $a \in K$ si scrive in modo unico come $u \cdot t^n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Se inoltre $\mathfrak{m} = (t')$, $t' = u_0 t$ e $a = ut^n = (u \cdot u_0^n)(t')^n$, con lo stesso n .

Def. $v: K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ la valutazione data da A
 $a \mapsto n$ f.c. $a = at^n$

Def. Sia K un campo. Una valutazione discreta su K è una funzione $v: K \rightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$ surgettiva e f.c.
 (i) $v(xy) = v(x) + v(y)$ ($v: K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ omo di gruppi)
 (ii) $v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$
 (iii) $v(x) = \infty \iff x = 0$.

Oss La valutazione di un DVR soddisfa queste proprietà:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad v(u_1 t^{n_1} u_2 t^{n_2}) &= n_1 + n_2 \\ \text{(ii)} \quad v(u_1 t^{n_1} + u_2 t^{n_2}) &= v(u_2 t^{n_2} (1 + u_1^{-1} u_2^{-1} u_1 t^{n_1 - n_2})) = \\ &= \begin{cases} n_2 & \text{se } n_1 > n_2 \\ \geq n_2 & \text{se } n_1 = n_2 \end{cases} \quad \text{con } n_2 \leq n_1 \end{aligned}$$

Oss $A = \mathbb{Z}_{(p)}$ $\text{Frac}(A) = \mathbb{Q}$ $\frac{\alpha}{\beta} = p^n \frac{\alpha'}{\beta'}$ con $n \in \mathbb{Z}, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}, p \nmid \alpha, p \nmid \beta$

Def. Sia K un campo, v una valutazione discreta.
 L'anello di valutazione è $\mathcal{O}_v := \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$

$\mathcal{O}_v$ è un anello locale con ideale massimale $\mathfrak{m}_v := \{x \in K \mid v(x) \geq 1\}$
 $\mathcal{O}_v \setminus \mathfrak{m}_v \stackrel{?}{=} \mathcal{O}_v^*$
 $\frac{1}{a} \cdot v(a) = 0 \implies v(\frac{1}{a}) + v(a) = v(1) = 0 \implies v(\frac{1}{a}) = -v(a) = 0 \implies \frac{1}{a} \in \mathcal{O}_v$

proposizione A è un DVR $\iff \exists K$ campo e una valutazione discreta su K f.c. $A = \mathcal{O}_v$.

Dimostrazione

$(\implies)$ ok

$(\impliedby)$ Devo mostrare che $\mathcal{O}_v$ è DVR: è dominio, locale.

Non è un campo: $\exists a \in K$ f.c. $v(a) = 1$

quindi $a \in \mathcal{O}_v$ ma $\frac{1}{a} \notin \mathcal{O}_v$ poiché $v(\frac{1}{a}) = -1$.

Ogni elemento di K si scrive $x = ua^n$ con $n = v(x), v(u) = 0$

Sia I ideale di $\mathcal{O}_v$, $I = \{u_i a^{n_i} \mid u_i \in \mathcal{O}_v^*, n_i \in \mathbb{N}\}$

$\implies I = (a^{\min\{n_i\}})$

□

esempio $A = \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3)} \quad \mathfrak{m} = (x,y) \quad B = A_{\mathfrak{m}}$

B è un DVR?

B è Noeth.

A è un dominio? $\iff (y^2-x^3)$ è primo in $\mathbb{C}[x,y]$
 $\iff y^2-x^3$ irriducibile ($\mathbb{C}[x,y]$ è UFD).

$y^2-x^3 = \underset{\deg_2}{p_1(x,y)} \underset{\deg_1}{p_2(x,y)} \quad \text{li considero come polinomi in } y, \text{ wlog monici}$

$y^2-x^3 = (y^2+a_1(x)y+a_2(x)) \cdot b(x) \implies b(x)=1$

$y^2-x^3 = (y-a_1(x))(y-a_2(x)) = y^2-(a_1(x)+a_2(x))y+a_1(x)a_2(x)$

$\implies \begin{cases} 0 = a_1(x)+a_2(x) \\ -x^3 = a_1(x)a_2(x) \end{cases} \implies \begin{cases} a_2(x) = -a_1(x) \\ x^3 = a_1(x)^2 \end{cases} \quad \text{assurdo}$

$\dim A = 1$: le catene di primi di $A \longleftrightarrow$ catene di primi in $\mathbb{C}[x,y]$
 $(y^2-x^3) \not\subseteq P \implies P$ massimale

Per capire se B è un DVR, devo capire se $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ come $B/\mathfrak{m}_B$ sp. vett. ha dim 1

$\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}B = (x,y)B$

$\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 = \frac{(x,y)}{(x^2,xy,y^2)}$

Ora $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \simeq \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 = \frac{(x,y)}{(x^2,xy,y^2)} \text{ s.v. su } A/\mathfrak{m} \simeq \mathbb{C}$

$\overline{p(x,y)} \in A \quad \overline{q(x,y)} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$
 $\overline{p(x,y)} \overline{q(x,y)} = \overline{p(0,0)q(x,y)}$

$\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \leq 2$

x e y sono lin. indep?

$\lambda x + \mu y = 0 \text{ in } \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \iff \lambda x + \mu y \in (x^2, xy, y^2) \text{ in } A$

$\iff \lambda x + \mu y \in (x^2, xy, y^2, y^2-x^3) \text{ in } \mathbb{C}[x,y] \iff \lambda = \mu = 0$

Quindi $\dim_{A/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 = \dim_{B/\mathfrak{m}_B} \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 = 2 \implies B$ non è DVR.

EX A anello, $\mathfrak{m}$ massimale, $n \geq 1$

$A/\mathfrak{m}^n \simeq A_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^n = S^{-1}(A/\mathfrak{m}^n)$
 con $S = A \setminus \mathfrak{m}$

Considero

$\varphi: A \longrightarrow A_{\mathfrak{m}} \longrightarrow A_{\mathfrak{m}}/(\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^n$
 $a \longmapsto \frac{a}{1} \longmapsto \overline{\frac{a}{1}}$

Basta mostrare che φ è surgettiva e $\text{Ker } \varphi = \mathfrak{m}^n$.

• surgettiva: prendo $\overline{a/s}$ con $s \notin \mathfrak{m}$

Siccome $s \notin \mathfrak{m}$, $(s, \mathfrak{m}) = (1)$ o $(s) + \mathfrak{m} = (1) \implies (s) + \mathfrak{m}^n = 1$

$\implies \exists b \in (s) \exists m_n \in \mathfrak{m}^n \text{ t.c. } bs + m_n = 1$

In particolare riducendo mod $\mathfrak{m}^n$: $\overline{b} \cdot \overline{s} = \overline{1} \implies b \notin \mathfrak{m}$

$\overline{a/s} = \overline{ab}/\overline{bs} = \overline{ab/1} \in \text{Im } \varphi$

• $\text{Ker } \varphi = \{a \in A \mid \frac{a}{1} \in (\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}})^n\} = \{a \in A \mid a/1 \in \mathfrak{m}^n A_{\mathfrak{m}}\} = \{a \in A \mid \frac{a}{1} = \frac{m_n}{s}, m_n \in \mathfrak{m}^n, s \notin \mathfrak{m}\} =$
 $= \{a \in A \mid u(as - m_n) = 0 \text{ con } m_n \in \mathfrak{m}^n, s \notin \mathfrak{m}, u \notin \mathfrak{m}\}$
 $\downarrow \text{mod } \mathfrak{m}^n$

$\overline{u}(\overline{a} \cdot \overline{s}) = \overline{0} \text{ mod } \mathfrak{m}^n$

$\overline{a}, \overline{s}$ invertibili mod $\mathfrak{m}^n \implies \overline{a} = \overline{0} \text{ mod } \mathfrak{m}^n \implies a \in \mathfrak{m}^n$

□

EX DVR $\mathbb{C}[X,Y]$ $A = \frac{\mathbb{C}[X,Y]}{(Y^2 - X^3 - X^2)}$ $\ni x,y$ classi di X,Y

$m = (x,y)$ ideale max di A

$B = A_m$ è Noetheriano, dominio, locale, dim 1

m_B/m_B^2 è s.v. so B/m_B : di che dim è?

m/m^2 " A/m

$\frac{(x,y)}{(x^2,xy,y^2)}$

$$A \times m_A \longrightarrow m_A \longrightarrow m_A/m_A^2$$

$$\searrow \quad \nearrow$$

$$\overline{p(x,y)} \cdot \overline{q(x,y)} = \overline{p(0,0)q(x,y)}$$

$$\overline{p_2 y + p_1 x + p_0}$$

Voglio dim che $\dim_{A/m} m/m^2 = 2$, cioè x,y sono lin. indep.

$$\lambda \bar{x} + \mu \bar{y} = 0 \text{ in } m_A/m_A^2$$

$$\iff \lambda x + \mu y \in m_A^2 = (x^2, xy, y^2) \text{ in } A$$

$$\iff \lambda x + \mu y = x^2 p_1 + xy p_2 + y^2 p_3 \text{ in } A$$

$$\iff \lambda x + \mu y = x^2 p_1 + xy p_2 + y^2 p_3 + (Y^2 - X^3 - X^2) p_4 \text{ in } \mathbb{C}[X,Y]$$

$$\iff \lambda = \mu = 0$$

EX $\mathbb{C}[X,Y]$ $A = \frac{\mathbb{C}[X,Y]}{(Y^2 + Y - X^3)}$

$B = A_m$ con $m = (x,y)$

$$m_B/m_B^2 \simeq m_A/m_A^2 = \frac{(x,y)}{(x^2,xy,y^2)} = \frac{(x,y)}{(x^2,xy,x^2y)} = \frac{(x,y)}{(x^2,xy,y)} = \frac{(x,y)}{(x^2,y)} = \frac{(x)}{(x^2,y)} = m_A/m_A^2$$

$$(S = A \cdot m_A \quad m_B = S^{-1} m_A \quad m_B/m_B^2 \simeq S^{-1} m_A / S^{-1} m_A^2 \simeq S^{-1} m_A / m_A^2 = m_A/m_A^2)$$

$$\implies \dim_{B/m_B} m_B/m_B^2 \leq 1$$

$$\text{Se } \dim_{B/m_B} m_B/m_B^2 = 0 \implies m_B = m_B^2 \stackrel{\text{Nak}}{\implies} m_B = (0) \quad \nmid$$

Valutazioni discrete

Se $v(x) \neq v(y)$ allora $v(x+y) = \min\{v(x), v(y)\}$

Supponiamo $v(x) > v(y)$

$$v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$$

$$v(y) = v((x+y) + (-x)) \geq \min\{v(x+y), v(-x)\}$$

$$v(-y) = v(-1) + v(y) = v(y)$$

$$0 = v(1) = v((-1)^2) = 2v(-1)$$

$$v(x+y) \geq v(y)$$

$$v(y) \geq \min\{v(x+y), v(x)\} \stackrel{\text{per ass.}}{>} v(y)$$

$\downarrow$

$$\implies v(x+y) \leq v(y)$$

Studiamo ora le valutazioni su $\mathbb{Q}$.

$$v: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Z} \cup \{\infty\}$$

Oss $v|_{\mathbb{Z}} \geq 0$: $v(1) = 0$, $v(2) \geq v(1) \geq 0$, ...

Per induzione $v(n) \geq 0 \quad \forall n > 0$ e $v(-n) = v(n)$

Oss Sia $I = \{x \in \mathbb{Z} \mid v(x) \geq 1\} = (p)$

• Se $xy \in I \iff v(xy) \geq 1 \iff v(x) + v(y) \geq 1$

quindi $v(x) \geq 1$ oppure $v(y) \geq 1$

• $x \in I, y \in \mathbb{Z} \implies xy \in I$ perché $v(xy) = v(x) + v(y) \geq v(x) \geq 1$

Oss Sia $n \in \mathbb{Z}$: $n = p^k m$ con $(p, m) = 1$

$$v(n) = v(p^k) + v(m) = v(p^k) = k v(p)$$

$$0 = v(1) = v(n \cdot \frac{1}{n}) \stackrel{=0}{=} v(n) + v(\frac{1}{n}) \implies v(\frac{1}{n}) = -v(n)$$

$$v(\frac{a}{b}) = v(a) - v(b) = (\alpha - \beta) v(p)$$

$$a = p^\alpha m, b = p^\beta m' \text{ con } (m, p) = 1, (m', p) = 1$$

Siccome v è surgettiva, dev'essere $v(p) = 1$

• $\mathbb{C}[t]$ è un DVR

$$v(a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots) = \min \{i \mid a_i \neq 0\}$$

$m = (t)$. A è locale: $A \cdot m = A^*$

• $A = \mathbb{C}[t]_{(t-t_0)}$ è un DVR

$v(p(t)) = \text{multiplicità di } t_0 \text{ come radice di } p(t)$

$$\frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 + y - x^3)} = A$$

$$B = A_{(x, y)}$$



$v(f) = \text{ordine di annullamento di } f \text{ in } (0,0)$

$$y(y+1) = x^3 \Rightarrow v(y) + v(y+1) = 3v(x) \Rightarrow v(y) = 3v(x)$$

$$v(y) = 3, v(x) = 1$$

$$m = (x, y) = (t) \quad t = xp_1 + yp_2$$

$$1 = v(t) \geq \min \{v(xp_1), v(yp_2)\} \geq \min \{v(x), v(y)\}$$

esempio un anello noetheriano di dim. infinita (Nagata)

$A = K[x_1, x_2, \dots]$ anello dei polinomi in infinite variabili

$$P_1 = (x_1) \quad P_2 = (x_2, x_3) \quad P_3 = (x_4, \dots, x_7) \quad P_4 = (x_8, \dots, x_{15}) \quad \dots \quad P_n = (x_{2^{n-1}}, \dots, x_{2^n-1})$$

sono tutti ideali primi

$$S = A \cdot \bigcup P_i \quad R = S^{-1}A$$

Dimostreremo che

(1) R è Noetheriano

(2) $I \subseteq \bigcup P_i \Rightarrow \exists i \text{ t.c. } I \subseteq P_i$

(3) Gli ideali massimali sono $S^{-1}P_i$

(4) $\dim R = \infty$: $(x_{2^m}) \subsetneq (x_{2^m}, x_{2^m+1}) \subsetneq \dots \subsetneq (x_{2^m}, \dots, x_{2^n-1})$
da' una catena in R di lunghezza $2^n - 1$

(2) Sia $I \subseteq \bigcup P_i$

$$I = \bigcup_{r=1}^{\infty} I \cap K[x_1, \dots, x_r]$$

$P_i \cap K[x_1, \dots, x_r]$: se tutte le variabili in P_i hanno indice $> r$, l'intersez. è 0

$$I \cap K[x_1, \dots, x_r] \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \cap K[x_1, \dots, x_r] \\ = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \cap K[x_1, \dots, x_r]$$

Lemma A anello, $P_1, \dots, P_r$ primi, I ideale di A
 $I \subseteq P_1 \cup \dots \cup P_r \Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, r\} \text{ t.c. } I \subseteq P_i$

$$I \cap K[x_1, \dots, x_r] \subseteq P_{j(r)}$$

Sia ora $\forall \epsilon \in I \setminus \{0\}$, $\forall \epsilon \in K[x_1, \dots, x_h]$

Per ogni $r \geq h$, $\forall \epsilon \in I \cap K[x_1, \dots, x_r] \Rightarrow \epsilon \in P_{j(r)}$

Questo mi dice che le variabili che generano $P_{j(r)}$ sono fra quelle che compaiono in ϵ .

Allora l'indice $j(r)$ è limitato, quindi c'è un j che si ripete infinite volte.

Dato r , scelgo $r' \geq r$ t.c. $j(r') = j$

$$I \cap K[x_1, \dots, x_{r'}] \subseteq I \cap K[x_1, \dots, x_r] \subseteq P_{j(r)} = P_j \quad \forall r$$

$$\text{quindi } I = \bigcup_r I \cap K[x_1, \dots, x_r] \subseteq P_j$$

Lemma Sia A anello t.c.

- ogni $x \in A$ appartiene a un n° finito di ideali max
 - $\forall m$ id. max di A , A_m è Noetheriano.
- Allora A è Noetheriano.

DIMOSTRAZIONE

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \dots$$

Se $I_j = (0) \forall j$, ok

Altrimenti sia $x \in \bigcup I_j \setminus \{0\}$

Siano $m_1, \dots, m_n$ gli ideali max. che lo contengono

$$I_h = I_{h+h} \iff S^{-1}I_h = S^{-1}I_{h+h} \quad \forall S = A \setminus m, m \text{ massimale}$$

Questa omografia è $(1)=(1)$ se $x \in S \iff x \notin m$.

Consideriamo $S^{-1}I_h \subseteq S^{-1}I_{h+1} \subseteq \dots$ in A_{m_i}

Siccome ogni A_{m_i} è noetheriano e ne ho un n° finito,

$$\exists N \text{ t.c. } S^{-1}I_h = S^{-1}I_{h+1} \quad \forall h \geq N \quad \forall S = A \setminus m_i, i=1, \dots, n$$

$$\implies \forall S = A \setminus m, m \text{ max.}$$

$$\implies \forall h \geq N \quad I_h = I_{h+1}$$

□

Vediamo che R soddisfa le ipotesi del criterio.

1) $x \in R$ sta in un n° finito di id. max.

$$x = p/q \quad m \ni x \implies m \ni p = xq$$

Ma $p \in R \setminus A$ appartiene ad un n° finito di P_i

2) Le localizzazioni $R_m = R_{S^{-1}P_i}$ sono Noetheriane:

$$A_{P_i}'' \ni \frac{p(x)}{q(x)}$$

A_{P_i} = localiz. di $\mathbb{C}[x_j | x_j \notin P_i] [x_k | x_k \in P_i]$

e quindi è Noetheriano.

esempio Anelli con catene massimali di lunghezze diverse

1) $A = A_1 \times A_2$ con $\dim A_1 \neq \dim A_2$


2) Con $\text{Spec } A$ connesso

$$\text{Spec } \frac{\mathbb{C}[x,y,z]}{(x^2, y^2)}$$

Primi $\longleftrightarrow$ Primi di $\mathbb{C}[x,y,z]$ che contengono (x^2, y^2)

$$P \ni (x^2, y^2) : 0 \ P \ni z \text{ o } P \ni x, y$$

$$(z) \neq (z, x) \neq (z, x, y) \quad (x, y) \subseteq (x, y, z)$$



Estensioni intere

Def. Un'estensione di anelli è semplicemente un contenimento $A \subseteq B$ fra anelli.

$$[\phi: A \rightarrow B: B \text{ è un } A\text{-modulo}, a \cdot b = \phi(a)b]$$

Oss $K \subseteq L$ estensione di campi: $\alpha \in L$ è algebrico su K se $\exists p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ t.c. $p(\alpha) = 0 \iff [K(\alpha) : K] < +\infty$
 $\iff K(\alpha)$ è un K -modulo fin.gen.

Def. $A \subseteq B$ estensione di anelli, $b \in B$.

b è intero su A se $\exists p(x) \in A[x]$ monico t.c. $p(b) = 0$

$A \subseteq B$ è un'estensione intera se $\forall b \in B$ b è intero su A .

$A \subseteq B$ è un'estensione finita se B è fin.gen. come A -modulo.

teorema di cayley-hamilton

A anello, M A -modulo generato da n elementi, $I \triangleleft A$, $\phi: M \rightarrow M$ endomorfismo di A -moduli.

Supponiamo $\phi(M) \subseteq IM$.

(i) $\exists a_1, \dots, a_n \in A$ t.c. $a_i \in I^i$, $\phi^n + a_1 \phi^{n-1} + \dots + a_n = 0$

(ii) $I = A$. ogni $\phi \in \text{End}_A(M)$ soddisfa un polinomio monico.

Def. Un A -modulo M è fedele se $a \cdot m = 0 \forall m \in M \implies a = 0$.
($\phi: A \rightarrow \text{End}_Z M$ è iniettivo)

Lemma Sia $A \subseteq B$ estensione di anelli, $b \in B$. Sono equivalenti:

(i) b è intero su A

(ii) $A[b]$ è fin.gen. come A -modulo

(iii) $\exists C \subseteq B$ sottanello, $A \subseteq C$, $b \in C$ t.c. C è fin.gen. come A -modulo

(iv) $\exists M$ un $A[b]$ -modulo fedele che è fin.gen. come A -modulo.

Oss $A[b]$ può essere def. come l'immagine $\phi: A[x] \xrightarrow{x \mapsto b} B$

DIMOSTRAZIONE

(i) $\implies$ (ii) $\exists n \geq 1 \exists a_1, \dots, a_n \in A$ t.c. $b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n = 0$

Dico che $A[b]$ è generato da $1, b, b^2, \dots, b^{n-1}$

$b^n = -a_n - \dots - a_1 b^{n-1} \in \langle 1, b, b^2, \dots, b^{n-1} \rangle_A$

Se $b^k \in \langle 1, b, \dots, b^{n-1} \rangle_A$, scrivo $b^k = c_0 + c_1 b + \dots + c_{n-1} b^{n-1}$

$b^{k+1} = b b^k = c_0 b + \dots + c_{n-1} b^n = c_0 b + \dots + c_{n-1} (-a_n - \dots - a_1 b^{n-1})$
 $\in \langle 1, b, \dots, b^{n-1} \rangle_A$

- (i) $\Rightarrow$ (ii) Prendo $C=A[b]$
 (ii) $\Rightarrow$ (iv) Prendo $M=C$ che è fin.gen. come A -modulo ed è fedele perché $\alpha \in A[b] \quad \alpha \cdot c = 0 \quad \forall c \in C \stackrel{c=1}{\Rightarrow} \alpha = 0$
 (iv) $\Rightarrow$ (i) da moltiplicazione per b , $[b]: M \rightarrow M$ è un endomorfismo di un A -mod fin.gen $\stackrel{CH}{\Rightarrow} \exists a_1, \dots, a_n \in A$ t.c.
 $[b]^n + a_1[b]^{n-1} + \dots + a_n = 0$
 $\iff$ l'endomorfismo $[b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n] = 0$
 $\iff b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n = 0$ in $A[b]$ perché M è fedele

□

Lemma $A \subseteq B \subseteq C$

- (1) B finito su A , C finito su $B \Rightarrow C$ finito su A
- (2) B finito su $A \Rightarrow B$ intero su A
- (3) Se B è intero su A ed è fin.gen. come A -algebra, allora B è finito su A .
- (4) B intero su A , C intero su $B \Rightarrow C$ intero su A .

DIMOSTRAZIONE

- (1) $B = \langle b_1, \dots, b_m \rangle_A, \quad C = \langle c_1, \dots, c_n \rangle_B$
 Dato $c \in C \quad \exists \beta_1, \dots, \beta_n \in B$ t.c. $c = \sum_{i=1}^n \beta_i c_i$
 Ogni β_i si può scrivere come $\beta_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} b_j$
 $\Rightarrow c = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} b_j c_i \Rightarrow C = \langle a_{ij} b_j c_i \rangle_A$
- (2) B finito su $A \Rightarrow$ dato $b \in B$, b sta in un sottoanello fin.gen. come A -mod (B stesso) $\stackrel{\text{lemma}}{\Rightarrow} b$ intero

Oss B fin.gen. come A -algebra vuol dire che $\exists n \geq 1$ t.c. $\exists \Phi: A[x_1, \dots, x_n] \rightarrow B$ omo sng
 $x_i \mapsto b_i$

esempio $A = \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] = S^{-1}\mathbb{Z}$ con $S = \{2^n\}$
 è fin.gen. come $\mathbb{Z}$ -algebra
 ma non è fin.gen. come $\mathbb{Z}$ -modulo:
 se volesse $A = \langle a_1, \dots, a_n \rangle_{\mathbb{Z}} \quad a_i = \frac{p_i}{2^{n_i}}$
 $N = \max\{n_i\} \Rightarrow \langle a_1, \dots, a_n \rangle \subseteq \frac{1}{2^N} \mathbb{Z} \quad \nexists$

(3) Per induzione sul numero dei generatori

- Se $B = A[b]$, B è un A -mod fin.gen.
- Se $B = A[b_1, \dots, b_{n+1}] = \text{Im}(A[x_1, \dots, x_{n+1}] \xrightarrow{x_i \mapsto b_i} B)$
 $B = \underbrace{(A[b_1, \dots, b_n])}_{\text{fin.gen. come } A\text{-modulo}} [b_{n+1}] \Rightarrow$ finita su $A[b_1, \dots, b_n]$
 $\Rightarrow A \subseteq A[b_1, \dots, b_{n+1}]$ è finita per (1).

(4) $c \in C$. Siccome C/B è intero, $\exists b_1, \dots, b_n \in B$ t.c. $c^n + b_1 c^{n-1} + \dots + b_n = 0$

$A \subseteq \underbrace{A[b_1, \dots, b_n]}_{\subseteq B} \subseteq \underbrace{A[b_1, \dots, b_n][c]}_{\subseteq C}$
 intero + fin.gen. come A -algebra $\Rightarrow$ finita

$\Rightarrow$ esiste un sottoanello di C che contiene c ed è fin.gen. come A -mod
 $\Rightarrow c$ è intero su $A \Rightarrow C/A$ intera.

□

corollario $A \subseteq B$ est. anelli, $C := \{b \in B \mid b \text{ è intero su } A\}$.
Questo C è detto la chiusura intera di A dentro B .
Allora C è un anello.

DIMOSTRAZIONE

$$c_1, c_2 \in C$$

$A \subseteq A[c_1, c_2]$: è un'est. finita che contiene $c_1 \pm c_2, c_1 c_2$

Allora questi elementi sono interi su A . □

def. Un dominio A è integralmente chiuso se coincide con la sua chiusura intera in $\text{Frac}(A)$

esempio $\mathbb{Z}$ è integralmente chiuso:

$$\text{sia } p/q \in \mathbb{Q} \text{ intero su } \mathbb{Z} \Rightarrow (p/q)^n + a_{n-1}(p/q)^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow p \mid a_0, q \mid a_n = 1 \Rightarrow p/q \in \mathbb{Z}$$

esempio $\mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ non è integralmente chiuso:

considero $t := \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ che annulla $x^2 - x - 1$

$t \in \text{Frac}(A) \setminus A$ è intero su A .

Lemma A UFD $\Rightarrow A$ integralmente chiuso.

DIMOSTRAZIONE

Prendiamo $p/q \in \text{Frac}(A)$, con p, q coprimi.

$$(p/q)^n + a_{n-1}(p/q)^{n-1} + \dots + a_0 = 0, a_0 \neq 0$$

Moltiplicando per q^n :

$$p^n + a_{n-1}p^{n-1}q + \dots + a_0q^n = 0$$

ma $p^n = -(a_{n-1}p^{n-1}q + \dots + a_0q^n)$ è divisibile per q $\nmid$

Se q non ha fattori primi, è un'unità $\Rightarrow p/q \in A$ □

Lemma $A \subseteq B$ estensione di anelli.

C chiusura intera di A in B , D chiusura intera di C in B .

Allora $D = C$.

DIMOSTRAZIONE

($\Rightarrow$) ok

($\Leftarrow$) $d \in D$ è intero su C : $\exists c_1, \dots, c_n$ t.c. $d^n + c_1 d^{n-1} + \dots + c_n = 0$

Ora c_i è intero su A $\forall i \Rightarrow A \subseteq \underbrace{A[c_1, \dots, c_n]}_{\text{intero}} \subseteq \underbrace{A[c_1, \dots, c_n][d]}_{\text{intero}}$

$\Rightarrow d$ è intero su $A \Rightarrow d \in C$. □

Lemma $A \subseteq B$ estensione intera.

(i) Se S è una parte moltiplicativa di A , $S^{-1}A \subseteq S^{-1}B$ è intera

(ii) Se $\mathcal{Q}$ è un ideale primo di B e $P = \mathcal{Q} \cap A$,
l'estensione $A/P \subseteq B/\mathcal{Q}$ è intera.

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \longrightarrow B/\mathcal{Q} \\ & \searrow & \nearrow \\ & A/P & \end{array}$$

DIMOSTRAZIONE

(i) Prendiamo $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$. Siccome B/A intera,

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

$$\text{Divido per } s^n: \left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_1}{s} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{s^n} = 0$$

trovo che $\frac{b}{s}$ è intero su $S^{-1}A$.

[Più precisamente, uno dovrebbe considerare $x^n + \frac{a_{n-1}}{s}x^{n-1} + \dots + \frac{a_0}{s^n} \in S^{-1}A[x]$]

(ii) $\bar{b} \in B/\mathcal{Q}$ è la classe di $b \in B$. Scrivo $b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0$

$$\text{Riducendo mod } \mathcal{Q}, \text{ trovo } \bar{b}^n + a_{n-1}\bar{b}^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

□

Interpretazione geometrica

$$A \subseteq B \text{ estensione intera} \iff \text{Spec } B \longrightarrow \text{Spec } A$$

"assomiglia a un rivestimento (ramificato)."

esempio $\mathbb{C}[x] \subseteq \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2 - (x+1))} = A[y]$


$$B = A \oplus A = \langle 1, y \rangle_A$$

$$\forall (x,y) \in B \rightsquigarrow \forall (x,y) = f_1(x,y) + y f_2(x)$$

Com'è fatta $\text{Spec } B \longrightarrow \text{Spec } A$?

Ideali primi: in B , c'è $(0) = (y^2 - (x+1))$ e gli ideali primi di $\mathbb{C}[x,y]$ che contengono $y^2 - (x+1)$

$$(x-x_0, y-y_0) \ni y^2 - (x+1) \iff y_0^2 - (x_0+1) = 0$$



Lemma $A \subseteq B$ est. intera tra domini d'integrità.

A è un campo $\iff B$ è un campo

DIMOSTRAZIONE

($\implies$) Sia $b \in B \setminus \{0\}$. Per integralità, $b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0, a_0 \neq 0$

$$-b \cdot (b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \dots + a_1) = +a_0$$

$$A \text{ campo} \implies b \cdot [-a_0^{-1}(b^{n-1} + \dots + a_1)] = 1$$

quindi b è invertibile.

($\impliedby$) Sia $a \in A \setminus \{0\}$. $\exists b \in B$ t.c. $ab = 1$

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0$$

$$\text{Moltiplico per } a^n: b + a_{n-1}a + a_{n-2}a^2 + \dots + a_0a^{n-1} = 0$$

$$\implies b = -a_{n-1}a - a_{n-2}a^2 - \dots - a_0a^{n-1} \in A$$

□

esempio K estensione finita di $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z} \subset K$
 L'anello degli interi di K è la chiusura intera di $\mathbb{Z}$ in K , $\mathcal{O}_K$.
 Mostriamo che $\dim \mathcal{O}_K = 1$
 (0) è primo in $\mathcal{O}_K$. Sia $P \neq (0)$ un primo di $\mathcal{O}_K$.
 Sia $b \in P$ un elemento non nullo
 $b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_0 = 0, a_0 \neq 0$
 $\mathbb{Z} \ni a_0 = -(b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \dots + a_1b) \in P \Rightarrow P \cap \mathbb{Z} \neq (0)$
 $\Rightarrow P \cap \mathbb{Z} = (p)$ è massimale
 $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathcal{O}_K/P$ è intero
 $\mathbb{F}_p$ campo $\Rightarrow \mathcal{O}_K/P$ campo $\Rightarrow P$ massimale
 $\Rightarrow \dim \mathcal{O}_K = 1$

Def. Sia $(A, \mathfrak{m})$ un DVR.
 Un generatore di $\mathfrak{m}$ si dice un uniformizzante.

Lemma A Noetheriano, M A -modulo, $M \neq (0)$.
 Dato $m \in M$, $\text{Ann}(m) = \{a \in A \mid am = 0\}$
 $\text{Ann } M = \{\text{Ann}(m) \mid m \in M, m \neq 0\}$
 (i) Gli ideali in $\text{Ann } M$ sono propri
 (ii) Ogni el. di $\text{Ann } M$ è contenuto in un el. massimale di $\text{Ann } M$.
 (iii) Ogni el. massimale di $\text{Ann } M$ è un ideale primo

DIMOSTRAZIONE

- (i) $1 \cdot m = 0 \Rightarrow m = 0$
- (ii) Per Noetherianità
- (iii) Sia I un el. massimale, $a, b \in I = \text{Ann}(M)$
 Se $am = 0 \Rightarrow a \in I$
 Se $am \neq 0$, considero $\text{Ann}(am) \supseteq (I, b)$
 Per massimalità, $I = \text{Ann}(am) \ni b$ □

teorema Sia A dominio locale Noetheriano di $\dim 1$. Sono equivalenti:
 (i) A è un DVR
 (ii) A è integralmente chiuso.

DIMOSTRAZIONE

- (i) $\Rightarrow$ (ii) $\text{DVR} \Rightarrow \text{PID} \Rightarrow \text{UFD} \Rightarrow$ integralmente chiuso.
- (ii) $\Rightarrow$ (i) Scelgo $t \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{m}^2$ (se $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2 \stackrel{\text{Nak}}{\Rightarrow} \mathfrak{m} = (0) \nmid$)
 Sia P un ideale massimale della famiglia $\text{Ann}(A/(t))$
 Dall'ipotesi $\dim A = 1$ e A locale segue che gli unici ideali primi sono (0) e $\mathfrak{m}$.
 Siccome $\text{Ann}(A/(t)) \ni \text{Ann}(t) \ni t$, (0) non è massimale $\Rightarrow P = \mathfrak{m}$.
 Quindi $\exists \alpha \in A/(t)$ t.c. $\mathfrak{m} = \{r \in A \mid r\alpha = 0 \text{ in } A/(t)\} =$
 $= \{r \in A \mid r\alpha \in (t)\} = \{r \in A \mid r \frac{\alpha}{t} \in A\}$
 Consideriamo $[\frac{\alpha}{t}]: \mathfrak{m} \longrightarrow A$ mappa di A -moduli
 L'immagine è un ideale.

Caso 1 : $\text{Im}[\frac{a}{t}] = A$

$\Rightarrow \exists b \in \mathfrak{m}$ t.c. $b \frac{a}{t} = 1 \Leftrightarrow t = ab$. Allora $a \notin \mathfrak{m}$, altrimenti $t = ab \in \mathfrak{m}^2$. Quindi $a \in A^\times$

$\Rightarrow [\frac{1}{t}] : \mathfrak{m} \rightarrow A \Rightarrow \forall m \in \mathfrak{m} \frac{m}{t} \in A \Rightarrow m \in (t)$.

Caso 2 : $\text{Im}[\frac{a}{t}] \subseteq \mathfrak{m}$

$[\frac{a}{t}] : \mathfrak{m} \rightarrow \mathfrak{m} \Rightarrow [\frac{a}{t}]$ è endom. di un A -mod fin. gen.

$\Rightarrow \frac{a}{t}$ intero su $A \Rightarrow \frac{a}{t} \in \text{chiusura intera} = A$

$\Rightarrow \mathfrak{m} = \{r \in A \mid r \frac{a}{t} \in A\} = A$ $\nmid$



corollario $A \subseteq B$ est. intera, $Q \in \text{Spec } B$, $P = Q \cap A$. Allora P è massimale $\Leftrightarrow Q$ è massimale

DIMOSTRAZIONE

$A/\mathfrak{p} \subseteq B/\mathfrak{q}$ è intera fra domini.

Per il Lemma $A/\mathfrak{p}$ campo $\Leftrightarrow B/\mathfrak{q}$ campo $\square$

$A \subseteq B$ intera $\rightsquigarrow$ $\begin{array}{ccc} \text{Spec } B & \mathfrak{q} & \text{"sta sopra p"} \\ \downarrow & & \\ \text{Spec } A & \mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A & \text{"sta sotto q"} \end{array}$

teorema:
lying over

Sia $A \subseteq B$ un'estensione intera.

La mappa $i^\#$ è surgettiva: $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec } A$

$\exists \mathfrak{q} \in \text{Spec } B$ t.c. $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$.

DIMOSTRAZIONE

$i_\mathfrak{p}(\tilde{\mathfrak{q}})$ è max

$$\begin{array}{ccc} A_\mathfrak{p} & \xrightarrow{i_\mathfrak{p}} & B_\mathfrak{p} = S^{-1}B \text{ con } S = A \setminus \mathfrak{p} \\ g_\mathfrak{p} \uparrow & \hookrightarrow & \uparrow g_\mathfrak{p} \\ A & \xrightarrow{i} & B \end{array}$$

ideale massimale $\tilde{\mathfrak{q}}$

$i_\mathfrak{p}$ intero, $\tilde{\mathfrak{q}}$ massimale $\xRightarrow{\text{an}} i_\mathfrak{p}(\tilde{\mathfrak{q}})$ è massimale
quindi è $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$

Allora $g_\mathfrak{p}^{-1}(i_\mathfrak{p}(\tilde{\mathfrak{q}})) = g_\mathfrak{p}^{-1}(\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$

Ma $g_\mathfrak{p} \circ i = i_\mathfrak{p} \circ g_\mathfrak{p}$

$(i_\mathfrak{p} \circ g_\mathfrak{p})^{-1}(\tilde{\mathfrak{q}}) = \mathfrak{p} = (g_\mathfrak{p} \circ i)^{-1}(\tilde{\mathfrak{q}}) = i^{-1}(\underbrace{g_\mathfrak{p}^{-1}(\tilde{\mathfrak{q}})}_{\mathfrak{q}})$

Ho costruito $\mathfrak{q} = g_\mathfrak{p}^{-1}(\tilde{\mathfrak{q}}) \in \text{Spec } B$ con la proprietà voluta $\square$

**teorema:
going up**

$A \subseteq B$ estensione intera.

$B \quad q_1 \neq \dots \neq q_m$

|

$A \quad p_1 \neq p_2 \neq \dots \neq p_n \quad p_i = q_i \cap A \text{ per } i=1, \dots, m$

Allora esistono $q_{m+1} \neq \dots \neq q_n$ t.c.

(i) $q_m \neq q_{m+1}$

(ii) $q_j \cap A = p_j$ per $j=m+1, \dots, n$

con $m < n$.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione + lying over, basta il caso $n=2, m=1$

Consideriamo l'estensione intera $A/q_1 \cap A \subseteq B/q_1$, cioè $A/p_1 \subseteq B/q_1$.

q_1/q_1

$p_1/p_1 \subseteq p_2/p_1$

Per lying over, esiste un primo $\bar{q}_2$ di B/q_1 da cui contrazione a A/p_1 è p_2/p_1 . Ora $\bar{q}_2 = q_2/q_1$ per un certo $q_2 \in \text{Spec } B$ con $q_2 \supseteq q_1$.

Verifichiamo che $q_2 \cap A = p_2$

$$\begin{array}{c} \text{Ker}(A \longrightarrow B \longrightarrow B/q_2) = q_2 \cap A \\ A \longrightarrow A/p_1 \hookrightarrow B/q_1 \longrightarrow \frac{B/q_1}{q_2/q_1} \simeq B/q_2 \end{array}$$

ha nucleo $A/p_1 \cap \bar{q}_2 = p_2/p_1$

ha nucleo p_2

Le due mappe hanno lo stesso nucleo, quindi $q_2 \cap A = p_2$

Nota: $q_2 \neq q_1$ perché $q_1 \cap A \neq q_2 \cap A$

□

**teorema:
incomparabilità**

$A \subseteq B$ estensione intera, $q_1 \neq q_2$ ideali primi di B .

Allora $q_1 \cap A \neq q_2 \cap A$.

Oss Fissiamo $p \in \text{Spec } A$. Due primi $q_1 \neq q_2$ di B che contraggono a p non possono essere contenuti l'uno dentro l'altro.

DIMOSTRAZIONE

$p := q_1 \cap A$. Consideriamo $A/p \subseteq B/q_1$

Ho due ideali primi $q_1/q_1 = 0$ e $q_2/q_1 \neq 0$ di B/q_1 .

La tesi è che $q_2/q_1 \cap A/p \neq \{0\}$.

Sia $b \in q_2/q_1$, $b \neq 0$. Siccome l'estensione è intera,

$\exists n \exists \bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n \in A/p$ t.c. $b^n + \bar{a}_1 b^{n-1} + \dots + \bar{a}_n = 0$

Siccome B/q_1 è dominio, prendendo n minimale posso supporre $\bar{a}_n \neq 0$

$q_2/q_1 \ni (b) \ni b(b^{n-1} + \bar{a}_1 b^{n-2} + \dots + \bar{a}_{n-1}) = -\bar{a}_n \in A/p$

cioè $\bar{a}_n \in q_2/q_1 \cap A/p \neq \{0\}$, come voluto.

□

teorema $A \subseteq B$ estensione intera.
Allora $\dim A = \dim B$

DIMOSTRAZIONE

Se $p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots \subseteq p_n$ è una catena di primi in A ,
per going up trovo $q_1 \subseteq q_2 \subseteq \dots \subseteq q_n$ in B
 $\Rightarrow \dim B \geq \dim A$

Preso $q_1 \subseteq q_2 \subseteq \dots \subseteq q_n$ catena in B ,
 $q_1 \cap A \subseteq q_2 \cap A \subseteq \dots \subseteq q_n \cap A$ per incomparabilità
 $\Rightarrow \dim B \leq \dim A \quad \Rightarrow \dim A = \dim B$ $\square$

Oss $i: A \hookrightarrow B$ est. intera $\Rightarrow i^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ è una mappa chiusa
(Racciamo solo il caso Noetheriano)

Sia $q \in \text{Spec } B$. $i^* V(q) = V(q \cap A)$

$$i^* V(q) = i^* (\{q' \in \text{Spec } B \mid q' \supseteq q\}) = \{q' \cap A \mid q' \supseteq q\}$$

$$V(q \cap A) = \{p \in \text{Spec } A \mid p \supseteq q \cap A\}$$

L'inclusione $(\subseteq)$ è chiara


Viceversa, dato $p \in V(q \cap A)$,
per going-up $\exists q' \supseteq q$ t.c. $q' \cap A = p$ $\begin{matrix} q & \subseteq & q' \\ | & & | \\ q \cap A & \subseteq & p \end{matrix}$

In generale, $V(I) = \bigcup_{\substack{q \supseteq I \\ q \text{ minimale sopra } I}} V(q) = V(q_1) \cup \dots \cup V(q_n)$

L'insieme dei primi minimi sopra I è finita: corrispondono ai primi minimi di B/I (che sono in n° finito per Noetherianità)
 $i^*(V(I)) = i^*(V(q_1)) \cup \dots \cup i^*(V(q_n)) = V(q_1 \cap A) \cup \dots \cup V(q_n \cap A)$ è unione finita di chiusi, quindi chiuso.

esempio $\mathbb{C}[x] \subseteq \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(xy-1)} = \mathbb{C}[x][\frac{1}{x}]$

Non è intera: i^* non è surgettiva,
in quanto (x) non è la contrazione di
un primo in $\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(xy-1)}$, perché l'unico ideale
che contiene (x) è (1) .



Oss $A \subseteq S^{-1}A$, con A dominio, è intera sse è uguaglianza

DIMOSTRAZIONE

$i^*: \text{Spec } S^{-1}A \rightarrow \text{Spec } A$ è surgettiva
 $\{p \in \text{Spec } A \mid p \cap S = \emptyset\} \rightarrow \{p \in \text{Spec } A\}$

Stiamo dicendo che nessun primo di A interseca S
 $s \in S \Rightarrow s$ non appartiene in alcun massimale $\Rightarrow s \in A^\times$ $\square$

Tomando all'orizzonte
 $\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(xy-1)} \simeq \frac{\mathbb{C}[x, \frac{x}{t}]}{(x(\frac{x}{t}-1))} = \frac{\mathbb{C}[x,t]}{(x^2 - tx + 1)} \underset{\text{intera}}{\supseteq} \mathbb{C}[t]$

Def. $x_1, \dots, x_m$ si dicono algebricamente indipendenti se
 $K[t_1, \dots, t_m] \longrightarrow A$
 $t_i \longmapsto x_i$ è iniettivo

**Teorema di
normalizzazione
di Noether**

Sia K un campo, A K -algebra fin.gen.
 Esistono $x_1, \dots, x_m \in A$ algebricamente indipendenti
 tali che $K[x_1, \dots, x_m] \subseteq A$ sia un'estensione finita.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione sul n° di generatori di A

• $n=0$: $A \cong K$

• $n=1$: $\varphi: K[x] \longrightarrow A$

Se $\text{Ker } \varphi = 0$, $A \cong K[x]$

Se $\text{Ker } \varphi = (\varphi(x))$, posso supporre φ monico

$A \cong K[x]/(\varphi(x)) \supseteq K$ è un'estensione finita

generata dall'elemento x , che soddisfa un polinomio monico.

• $n \geq 2$: Sia $\varphi: K[t_1, \dots, t_n] \longrightarrow A$

Se φ è iniettivo, ho finito.

Se $\text{Ker } \varphi \neq (0)$, considero un polinomio $\varphi(t_1, \dots, t_n) \neq 0$ t.c. $\varphi(x_1, \dots, x_n) = 0$

Poniamo $y_i = x_i - a_i x_n$ per $i=1, \dots, n-1$ dove $a_i \in K^*$

$0 = \varphi(x_1, \dots, x_n) = \varphi(y_1 + a_1 x_n, \dots, y_{n-1} + a_{n-1} x_n, x_n)$

Se $g := \varphi(t_1 + a_1 t_n, \dots, t_{n-1} + a_{n-1} t_n, t_n)$ è monico nella variabile t_n , allora

$A = K[x_1, \dots, x_n] = K[y_1, \dots, y_{n-1}, x_n] = \frac{K[y_1, \dots, y_{n-1}][t_n]}{(g)}$

$K[z_1, \dots, z_m] \subseteq K[y_1, \dots, y_{n-1}] \subseteq A$
finita finita

con $z_1, \dots, z_m$ alg. indep.

Scopo: fissare $a_1, \dots, a_{n-1}$ t.c. $\varphi(t_1 + a_1 t_n, \dots, t_{n-1} + a_{n-1} t_n, t_n)$

abbia come monomio di grado max in t_n un termine
 della forma $C t_n^d$ con $C \in K^*$

Fissiamo un monomio $\gamma t_1^{e_1} \dots t_n^{e_n}$. Sostituendo trovo

$\gamma (t_1 + a_1 t_n)^{e_1} \dots (t_{n-1} + a_{n-1} t_n)^{e_{n-1}} \cdot t_n^{e_n}$

il monomio di grado max in t_n è $\gamma (a_1^{e_1} \dots a_{n-1}^{e_{n-1}}) t_n^{\sum e_i}$

Sommando sui monomi, se φ è di grado tot d e se φ_d è la
 parte omogenea di grado d ,

$\varphi(t_1 + a_1 t_n, \dots, t_{n-1} + a_{n-1} t_n, t_n) = \varphi_d(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) t_n^d + \text{termini con } \deg_n < d$

Se K è infinito, il polinomio φ_d non si annulla identicamente

su $(K^*)^n \Rightarrow$ posso trovare $a_1, \dots, a_{n-1}$ t.c. $\varphi_d(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$

Se K è finito, poniamo $y_i = x_i - x_n^r$, dove r è un intero positivo grande
 Stesso conto:

$\gamma t_1^{e_1} \dots t_n^{e_n} \rightsquigarrow \gamma (t_1 - t_n^r)^{e_1} (t_2 - t_n^r)^{e_2} \dots (t_{n-1} - t_n^r)^{e_{n-1}} t_n^{e_n}$

Il termine di grado max in t_n è
 $\gamma t_n^{e_1 + r e_2 + \dots + r e_{n-1} + e_n}$

Scegliendo $r >$ tutti gli esponenti di tutti i monomi di φ , possiamo
 garantire di avere un unico monomio γt_n^E di grado massimo.



esempio Ancora DVR

$(\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)})_{(x,y)} =: B$ non è DVR

Per la caratterizzazione dei DVR, B non può essere integralmente chiuso

$t := \frac{y}{x} \in \text{Frac}(B)$

• t è intero su B:

$$y^2 = x^3 + x^2 \rightarrow \left(\frac{y}{x}\right)^2 = x + 1$$

cioè t soddisfa $t^2 - (x+1)$

• $t \notin B$: $\frac{y}{x} = t = \frac{a}{b} = \frac{a_1(x) + y a_2(x)}{s_1(x) + y s_2(x)}$ $a \in A, s \in A \setminus (x, y)$

$$\Leftrightarrow s_1(x)y + (x^3+x^2)s_2(x) = a_1(x)x + y a_2(x)x$$

Confrontando i coefficienti di y trovo $s_1(x) = x a_2(x)$

$$\Rightarrow s = x a_2(x) + y s_2(x) \in (x, y)$$

• $i: \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)} \xrightarrow{\text{finito}} \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)} \left[\frac{y}{x}\right] \not\subseteq \text{Frac } A$ ha dim=1


$$t = \frac{y}{x} \quad t^2 = \frac{y^2}{x^2} = \frac{x^3+x^2}{x^2} = x+1 \Rightarrow x = t^2-1, y = tx = t(t^2-1)$$

$$\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)} \left[\frac{y}{x}\right] \cong \mathbb{C}[t]$$

$$i: \frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)} \rightarrow \mathbb{C}[t]$$

$$x \mapsto t^2-1$$

$$y \mapsto t(t^2-1)$$



$$i^*: (t-t_0) \mapsto (x-x_0, y-y_0)$$

$i^*(t-t_0) = (x-x_0, y-y_0)$ vuol dire che $(t-t_0) \cap A = (x-x_0, y-y_0)$

$$(t-t_0) \supseteq (t^2-1-x_0, t(t^2-1)-y_0)$$

$$\text{Quindi } \begin{cases} t_0^2-1-x_0=0 \\ t_0(t_0^2-1)-y_0=0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_0 = t_0^2-1 \\ y_0 = t_0(t_0^2-1) \end{cases}$$

Viceversa, se fisso $M = (x-x_0, y-y_0)$, chi sono i massimali $(t-t_0)$ t.c. $i^*(t-t_0) = M$?

$$\text{Se } x_0 \neq 0, t_0 = \frac{t_0(t_0^2-1)}{t_0^2-1} = \frac{y_0}{x_0}$$

$$\text{Se invece } x_0 = 0, (x, y-y_0) \supseteq (y^2-x^3-x^2) \Leftrightarrow y^2 \in (x, y-y_0) \Leftrightarrow y_0 = 0$$

Per questo ideale, $i^*(t_0-1) = i^*(t_0+1) = (x, y)$

Sia $D = \mathbb{C}[t^2-1, t(t^2-1)] = \{p(t) \in \mathbb{C}[t] \mid p(1) = p(-1)\}$

$$\frac{\mathbb{C}[x,y]}{(y^2-x^3-x^2)} \left[\frac{1}{x}\right] \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}[t] \left[\frac{1}{t}\right]$$

$$\begin{array}{ccc} x & \mapsto & t^2-1 \\ y & \mapsto & t(t^2-1) \\ y/x & \mapsto & 1/t \end{array} \quad \text{è ben def}$$

Lemma K campo, $A = K[x_1, \dots, x_n]$, $I \triangleleft A$ ideale, $I \neq (0)$.
 Esiste un isomorfismo $\varphi: A \rightarrow A$ (come K -algebra)
 tale che $\varphi(I)$ contenga un polinomio monico in x_n .
 Più precisamente, preso $f \neq 0$, $\exists \varphi: A \xrightarrow{\sim} A$ t.c.
 $\varphi(f) = C_d(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^d + \dots + C_0(x_1, \dots, x_{n-1})$ allora
 $C_d(x_1, \dots, x_{n-1}) \in K$.

DIMOSTRAZIONE

φ manda $x_n \mapsto x_n$ e $x_i \mapsto x_i - x_n^r$ dove r è un intero
 sufficientemente grande (inversa: $x_i \mapsto x_i + x_n^r$) □

Oss • A K -algebra fin. gen. da n generatori,
 $K[t_1, \dots, t_m] \subseteq_{\text{finita}} A$
 con $m \leq n$.
 • $\dim A = \dim K[t_1, \dots, t_m] = m$, quindi m è univocamente
 determinato da A

Def. A anello commutativo, $P \in \text{Spec } A$.
 L'altezza di P è la dimensione di A_P , ossia la massima lunghezza
 di una catena di primi che termina con P .

Lemma In un UFD, i primi di altezza 1 sono principali

DIMOSTRAZIONE

Sia P di altezza 1 (cioè l'unico primo strettamente contenuto in P è (0)).

$P \neq (0)$. Scelgo $x \in P$ e lo scrivo

$$P \ni x = u \cdot p_1^{r_1} \cdots p_r^{r_r}$$

Wlog $p_i \in P$, cioè $(0) \subsetneq (p_i) \subseteq P$ e (p_i) è primo

Siccome l'unico primo $\subsetneq P$ è (0) , allora $(p_i) = P$. □

Teorema K campo, $\dim K[x_1, \dots, x_m] = m$.

DIMOSTRAZIONE

• $\dim K[x_1, \dots, x_m] \geq m$: basta considerare $(0) \subsetneq (x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \dots \subsetneq (x_1, \dots, x_m)$.

• $\dim K[x_1, \dots, x_m] \leq m$: per induzione

- $m=0, 1$: chiaro

- $m \geq 2$: prendiamo una catena di primi

$(0) \subsetneq P_1 \subsetneq P_2 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ con P_i principale (come nel Lemma)

Per il Lemma, $P_1 = (f)$. Per il Lemma precedente, esiste un automorfismo

$\varphi: A \xrightarrow{\sim} A$ t.c. $\varphi(f) = Cx_m^d + \dots$

Sostituendo f con $\frac{1}{C}f$, posso supporre $\varphi(f)$ monico in x_m .

Quozientando per P_1 , trovo la catena

$$P_1/P_1 \subsetneq P_2/P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r/P_1$$

di lunghezza $r-1$ in $K[x_1, \dots, x_m]/(\mathfrak{p}) = \frac{K[x_1, \dots, x_{m-1}][x_m]}{(\mathfrak{p})}$
che è un'est. intera di $K[x_1, \dots, x_{m-1}]$

Per hp. ind. $\dim K[x_1, \dots, x_{m-1}] = m-1$

Per est. intera, $\dim K[x_1, \dots, x_{m-1}][x_m]/(\mathfrak{p}) = m-1$

Quindi la catena ha lunghezza $\leq m-1$, cioè

$$r-1 \leq m-1 \Rightarrow r \leq m.$$



Lemma di Zariski

Sia L/K un'estensione di campi con L fin. gen. come K -algebra.
Allora l'estensione è finita.

Oss $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ non è fin. gen. come $\mathbb{Q}$ -algebra
(guardare i denominatori)

DIMOSTRAZIONE

Per Noether, $L \supseteq K[t_1, \dots, t_m]$

$\dim L = 0$ perché L è un campo

$$\Rightarrow \dim K[t_1, \dots, t_m] = 0 \Rightarrow L/K \text{ finita}$$



**corollario:
Nullstellensatz
debole**

K campo, A K -algebra fin. gen.,

M ideale massimale. Allora

(i) A/M è un'est. finita di K .

(ii) Se $K = \bar{K}$, allora $A/M \cong K$.

(iii) Se $K = \bar{K}$ e $A = K[x_1, \dots, x_n]$, ogni M massimale è della forma $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ per certi $a_1, \dots, a_n \in K$.

Oss $\iota: K \hookrightarrow A \longrightarrow A/I$ è ancora iniettiva
a meno che $\text{In } K^* \neq \emptyset$, nel qual caso $I = (1)$.

DIMOSTRAZIONE

(i) $K \subseteq A/M$ è est. di campi, fin. gen.: applico Zariski

(ii) L'unica est. finita di un campo alg. chiuso è lui stesso.

(iii) $\pi: A \longrightarrow A/M \cong \bar{K}$: per costruzione, $x_i - a_i \in \text{Ker } \pi$

$$x_i \longmapsto a_i \Rightarrow (x_i - a_i) \in M \quad \forall i$$

$\Rightarrow (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \subseteq M$ ed è uguaglianza perché
 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ è massimale.



teorema:
going down

$A \subseteq B$ est. intera di domini con A integralmente chiuso.

$B \quad q_1$

|

$A \quad p_1 \neq p_2$

Allora $\exists q_2 \in \text{Spec } B, q_2 \neq q_1$ tale che $q_2 \cap A = p_2$.

Oss Sotto le ipotesi del Teorema, $i: A \rightarrow B$ induce
 $i^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ che è aperta.

Oss $B \quad \text{Frac } B = L$
| $\cup$
 $A \quad \text{Frac } A = K$) Dimosteremo il Teorema sotto l'ipotesi
che L/K sia finita e separabile

Lemma

$A \subseteq B$ est. intera di domini, A e B integralmente chiusi.

Supponiamo $L = \text{Frac } B/K := \text{Frac } A$ sia di Galois, con
 G gruppo finito.

(i) G agisce su $\text{Spec } B$

(ii) Fissiamo $P \in \text{Spec } A$. L'azione precedente è transitiva
sull'insieme $\{Q \in \text{Spec } B \mid Q \cap A = P\}$.

DIMOSTRAZIONE

(i) Sia $b \in B$ e $\sigma \in G$. Voglio dim. che $\sigma(b) \in B$.

$\sigma|_B: B \rightarrow B, \quad \sigma^{-1}|_B: B \rightarrow B$.

b soddisfa un'equazione monica a coeff. in A :

$b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n b + a_n = 0$ con $a_1, \dots, a_n \in A$.

Applicando σ trovo

$$0 = \sigma(0) = \sigma(b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + a_n) = \sigma(b)^n + \sigma(a_1) \sigma(b)^{n-1} + \dots + \sigma(a_n) = \\ = \sigma(b)^n + a_1 \sigma(b)^{n-1} + \dots + a_n$$

$\Rightarrow \sigma(b)$ è intero su $A \Rightarrow \sigma(b) \in \text{Frac } B$ è intero su B .

Poiché B è integralmente chiuso, $\sigma(b) \in B$.

Quindi $\sigma|_B$ è isomorfismo e in part. manda primi in primi.

(ii) Sia $P \in \text{Spec } A$ e $Q \in \text{Spec } B$ t.c. $Q \cap A = P$, $\sigma \in G$.

$$\sigma(Q) \cap A = \sigma(Q) \cap \sigma(A) = \sigma(Q \cap A) = \sigma(P) = P$$

Mostriamo la transitività: sia $Q_2 \in \text{Spec } B$ t.c. $Q_2 \cap A = P$.

Per assurdo non esista $\sigma \in G$ t.c. $\sigma Q = Q_2$.

Allora $\forall \sigma \in G \quad Q_2 \neq \sigma Q$: per incomparabilità, se

valesse $Q_2 = \sigma Q$, poiché $Q_2 \cap A = Q \cap A$, avrei $Q_2 = \sigma Q$.

Quindi $Q_2 \notin \bigcup_{\sigma \in G} \sigma Q$ per scansamento.

Scegliamo $b \in Q_2 - \bigcup_{\sigma \in G} \sigma Q$. Considero $a := \prod_{\sigma \in G} \sigma(b)$

a è un elemento di A :


- (i) $a \in \text{Frac } A \iff \exists a = a \forall t \in G$ (l'est. è di Galois)
 (ii) a è prodotto di elem. di B , ossia prodotto di elem. interi su A
 $\implies a$ è intero su A .

Poiché A è int. chiuso, $a \in A$.


Ora $a \in (b) \subseteq Q_2 \implies a \in Q_2 \cap A = P \subseteq Q$

Allora $\prod_{s \in G} \sigma(b) \in Q \implies \exists \sigma \in G$ t.c. $\sigma(b) \in Q \iff b \in {}^{s^{-1}}Q$
 ma $b \notin {}^s Q \forall s$, assurdo. □

esempio



Dimostrazione



Infatti, sia $l \in \tilde{L}$: è algebrico su K , quindi posso trovare un pol. monico $f(x) \in K[x]$ t.c. $f(l) = 0$.

$$l^n + \frac{a_1}{d_1} l^{n-1} + \dots + \frac{a_n}{d_n} = 0 \text{ con } a_i, d_i \in A$$

Moltiplico per $(d_1 \dots d_n)^n$:

$$(d_1 \dots d_n)^n + a_1 d_2 \dots d_n (d_1 \dots d_n)^{n-1} + \dots + a_n (d_1 \dots d_n)^n d_n^{n-1} = 0$$

Quindi $d_1 \dots d_n l$ è intero su $A \implies d_1 \dots d_n l \in \tilde{B}$

$$l = \frac{d_1 \dots d_n l}{d_1 \dots d_n} \in \text{Frac } \tilde{B}, \text{ perché } d_1 \dots d_n l \in \tilde{B}, d_1 \dots d_n \in A \subseteq \tilde{B}$$

Per going over, $\exists \tilde{q}_1 \in \text{Spec } \tilde{B}$ t.c. $\tilde{q}_1 \cap B = q_1$.

Per going up in $A \subseteq \tilde{B}$ trovo $q_1 \neq q_2$ primi di $\tilde{B}$ t.c. $q_1 \cap A = p_1, q_2 \cap A = p_2$.

Ora $\tilde{q}_1 \cap A = (\tilde{q}_1 \cap B) \cap A = q_1 \cap A = p_1$

Quindi $\tilde{q}_1$ e q_1 sono due ideali primi di $\tilde{B}$ che stanno sopra p_1 .

Per il lemma, $\exists \sigma \in \text{Gal}(\tilde{L}/K)$ t.c. $\sigma(q_1) = \tilde{q}_1$.

Allora $\sigma(q_2) \neq \sigma(q_1) = \tilde{q}_1$. Poniamo $q_2 := \sigma(q_2) \cap B \neq \sigma(q_1) \cap B = \tilde{q}_1 \cap B = q_1$
 e vale $q_2 \cap A = q_2 \cap A = p_2$. □

Oss K campo, A K -algebra fin. gen.

$K[x_1, \dots, x_n] \subseteq A$ $\Rightarrow \dim A = \dim K[x_1, \dots, x_n] = n$ e' finita
In particolare, non ci sono catene discendenti infinite di ideali primi.

esempio $K[x] \subseteq \frac{K[x,y]}{(y^2 - (x+1))} = A$

Def. Sia L/K un'estensione di campi.

Un sottoinsieme di L $\{x_i\}_{i \in I}$ di elementi algebricamente indipendenti e massimale per inclusione e' detto base di trascendenza di L/K .

Proprietà

- (i) $L/K(x_i)_{i \in I}$ e' est. algebrica
 - (ii) una base di trascendenza esiste sempre
 - (iii) due qualsiasi basi di trascendenza hanno la stessa cardinalità
- Il grado di trascendenza di L/K , $\text{trdeg}_K(L)$, e' la cardinalità di una qualsiasi base di trascendenza.

Oss • $L/F/K \Rightarrow \text{trdeg}_K(L) = \text{trdeg}_K(F) + \text{trdeg}_F(L)$
• $K(x_1, \dots, x_n) = \text{Frac } K[x_1, \dots, x_n]$ ha $\text{trdeg}_K(L) = n$.

teorema K campo, A K -algebra fin. gen. che sia un dominio.

- (i) $\dim A = \text{trdeg}_K \text{Frac } A$
- (ii) Ogni catena $0 \subsetneq P_1 \subsetneq P_2 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ massimale ha lunghezza $\dim A$
- (iii) $\forall P \in \text{Spec } A \quad \text{ht}(P) + \dim A/P = \dim A$
- (iv) $\forall P \subseteq Q$ ogni catena massimale $P \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r = Q$ ha lunghezza $\text{ht}(Q) - \text{ht}(P)$

Def. Un anello che soddisfa (iv) si dice catenario

DIMOSTRAZIONE

Fissiamo $A \supseteq_{\text{finita}} K[x_1, \dots, x_n]$, $n = \dim A$

(i) $\text{Frac } A \supseteq K(x_1, \dots, x_n) \Rightarrow \text{trdeg}_K \text{Frac } A = \text{trdeg}_K K(x_1, \dots, x_n) = n = \dim A$

(ii) Per induzione su n .

• $n=0$: A e' un campo

• $n \geq 1$: $0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ catena massimale in A

$0 \subsetneq Q_1 \subsetneq \dots \subsetneq Q_s$ interseca con $K[x_1, \dots, x_n]$

Affermo che Q_1 è minimale fra i primi non nulli:

se avessi $0 \neq Q_0 \subsetneq Q_1$, troverei

$A \quad 0 \neq P_0 \subsetneq P_1$ per going down

$K[x_1, \dots, x_n]$ $Q_0 \subsetneq Q_1$ $K[x_1, \dots, x_n]$ UFD $\Rightarrow$ Int. chiuso

e questo contraddice la massimalità della catena

In particolare, $\text{ht}(Q_1) = 1 \Rightarrow Q_1 = (\mathfrak{p})$ perché $K[x_1, \dots, x_n]$ è UFD.

$A/P_1 \supseteq K[x_1, \dots, x_n]/Q_1$ è ancora intera

quindi $\dim A/P_1 = \dim K[x_1, \dots, x_n]/Q_1$

Inoltre $\dim K[x_1, \dots, x_n]/(\mathfrak{p}) = \dim K[x_1, \dots, x_n]/(q)$

a meno di iso con g monico in x_n

quindi è estensione intera di $K[x_1, \dots, x_{n-1}] \Rightarrow$ ha $\dim n-1$

$\Rightarrow \dim A/P_1 = n-1$ e A/P_1 è una K -alg. fin. gen. e dominio

$\Rightarrow$ per hp. ind., tutte le sue catene massimali hanno lung. $n-1$

$P_1/P_1 \subsetneq P_2/P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r/P_1$ è massimale (per corrispondenza)

$\Rightarrow r-1 = n-1 \Rightarrow r = n$

(iii) $\text{ht}(P)$: max. lung. di una catena $(0) \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r = P$

$\dim A/p$: max. lung. di una catena $P = Q_0 \subsetneq Q_1 \subsetneq \dots \subsetneq Q_s$

La catena $0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P \subsetneq Q_1 \subsetneq \dots \subsetneq Q_s$ ha quindi lung. $n = r + s$

(iv) $(0) \subsetneq \dots \subsetneq P = P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_n = Q \subsetneq \dots \subsetneq Q_{n+s}$

catena massimale

catena massimale in A/Q : $\text{lung.} = \dim A/Q$

di lung. $\text{ht}(P)$

$= \dim A - \text{ht}(Q)$

$\Rightarrow \text{ht}(P) + \text{lung.}(P \rightarrow Q) + \dim A - \text{ht}(Q) = \dim A$

$\Rightarrow \text{lung.}(P \rightarrow Q) = \text{ht}(Q) - \text{ht}(P)$

□

Oss $\dim A = \text{ht}(P) + \dim A/p$

(i) $\text{ht}(P) = \dim A - \dim A/p = \text{codim } V(P)$

$\text{Spec}(A/p) =$ chiuso di $\text{Spec} A$ dato dai p.ti che soddisfano le eq. in $P = V(P)$

(ii) è sempre vero che $\dim A \geq \text{ht}(P) + \dim(A/p)$ concatenando

$(0) \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r = P$ e $P = Q_0 \subsetneq Q_1 \subsetneq \dots \subsetneq Q_s$ trovo una catena in A

di $\text{lung.} \leq \dim A$

esempio $R = \mathbb{D}[R]$ con uniformizzante π (ad es. $R = \mathbb{Z}_{(p)}$)

$A = R[t]$, $P = (1 - \pi t)$

$\dim A \geq 2$: c'è la catena $(0) \subsetneq (t) \subsetneq (t, \pi)$

$\dim A/p = \dim R[\frac{1}{\pi}] = \dim \text{Frac} R = 0$

$\text{ht}(P) \leq 1$: $\dim A_p \leq \dim A[\frac{1}{\pi}] = \dim \text{Frac} R[t] = 1$

A_p è una localizzazione di $A[\frac{1}{\pi}]$

(In effetti, $\text{ht}(P) = 1$: $(0) \subsetneq P$

$\dim A/p + \text{ht} P < \dim A$

(iii) Se A non è dominio, non è detto che tutte le catene massimali

abbiano la stessa lunghezza

$\text{Spec}(A = \frac{\mathbb{Q}[x, y, z]}{(x^2, y^2)})$

$(z) \subsetneq (z, x) \subsetneq (z, x, y)$

$(x, y) \subsetneq (x, y, z)$

**teorema:
Hauptidealsatz**

Sia A un anello Noetheriano, $\varphi \in A$, P un primo minimale tra quelli che contengono (φ) . Allora $\text{ht}(P) \leq 1$.

Oss è falso se manca l'ipotesi A Noetheriano.

Interpretazione geometrica

Se A è una k -alg. fin. gen. che è un dominio e $\varphi \in A \setminus \{0\}$,

$$V(\varphi) = \text{l'insieme di zeri di } \varphi \longleftrightarrow \text{Spec } A/(\varphi)$$

$$\text{primi minimali su } (\varphi) \longleftrightarrow \text{componenti irriducibili di Spec } A/(\varphi)$$

$$\dim V(P) = \dim A/P = \dim A - \text{ht}(P) \geq \dim A - 1.$$

Imporre un eq.ne fa calare la dimensione al più di 1

**corollario
di Krull**

A Noeth., $\varphi \in A$, φ non divisore di 0, P un primo minimale sopra $\varphi \Rightarrow \text{ht}(P) = 1$.

esempio $A = \frac{\mathbb{C}[x,y,z]}{(x^2, y^2)}$, $\varphi = z$, $P = (z)$ è primo ma $\text{ht}(P) = 0$.
(non cala la dimensione ma il n° di componenti irriducibili)

**teorema
dell'altezza**

A anello Noetheriano, $\varphi_1, \dots, \varphi_r \in A$, P primo minimale sopra $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$. Allora $\text{ht}(P) \leq r$.

Lemma

A anello, $Q \in \text{Spec } A$. Per $n \geq 1$ poniamo

$Q^{(n)} = \text{contrazione in } A \text{ dell'ideale } (QA_Q)^n$

è detto n -esima potenza simbolica di Q .

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad Q^{(n)} &= \{a \in A \mid \varphi = \frac{q}{s} \text{ con } q_n \in Q^n, s \notin Q\} = \\ &= \{a \in A \mid \exists q_n \in Q^n, \exists s, s' \notin Q \text{ t.c. } s'(sa - q_n) = 0\} = \\ &= \{a \in A \mid \exists q_n \in Q^n, \exists s' \notin Q \text{ t.c. } s'a = q_n\} \end{aligned}$$

$$\text{(ii)} \quad Q^{(n)} A_Q = (QA_Q)^n$$

Lemma

(A, P) Noetheriano locale. Sono equivalenti:
 $\dim A = 0 \iff A$ Artiniano $\iff P$ nilpotente

DIMOSTRAZIONE

$$\implies P \supseteq P^2 \supseteq \dots \text{ stabilizza } \implies \exists n \text{ t.c. } P^n = P^{n+1}$$

Per Nakayama, $P^n = 0$.

$$\impliedby \text{ Basta mostrare che non ci sono catene di length } 1$$

Per ass.: $Q \neq P$. In A/Q ho P/Q che è nilpotente in un dominio

$$\implies P/Q = 0 \implies P = Q \quad \text{!}$$

□

DIMOSTRAZIONE

Sia $\mathfrak{f} \in A$, P minimale sopra $(\mathfrak{f})$

Localizzando in P , posso supporre P massimale

Per assurdo, sia $\text{ht}(P) \geq 2$: ho una catena

$$P_0 \subsetneq Q \subsetneq P \implies \mathfrak{f} \notin Q, P_0$$

Quozientando per P_0 , siamo nel dominio A/P_0 :

P/P_0 è minimale sopra $(\mathfrak{f})$.

Basta lavorare in un dominio e mostrare che se P è minimale sopra $\mathfrak{f}$, non esiste un primo Q strett. compreso tra (0) e P .

Consideriamo la catena discendente $(Q^{(n)}, \mathfrak{f}) \supseteq (Q^{(n+1)}, \mathfrak{f}) \supseteq \dots$, che posso vedere in $A/(\mathfrak{f})$

Oss $A/(\mathfrak{f})$ è Artiniano: $P/(\mathfrak{f})$ è minimale e massimale $\implies$ è di dim 0.

Siccome $A/(\mathfrak{f})$ è Artiniano, la catena stabilizza:

$$\exists n \text{ t.c. } (Q^{(n)}, \mathfrak{f}) = (Q^{(n+1)}, \mathfrak{f}) \quad (\text{interessante: } \subseteq)$$

Preso $x \in Q^{(n)} \subseteq (Q^{(n)}, \mathfrak{f})$: $\exists q_{n+1} \in Q^{(n+1)}$, $\exists a \in A$ t.c. $x = q_{n+1} + a\mathfrak{f}$

Affermo che $a \in Q^{(n)}$: $Q^{(n)} \ni x - q_{n+1} = a\mathfrak{f}$

In particolare, $\exists s \notin Q$ t.c. $s(x - q_{n+1}) = (s\mathfrak{f})a$
 $Q^{(n)}$ prodotto di due el. $\notin Q$: non sta in Q

Per il lemma, $a \in Q^{(n)}$

$$\implies x \in Q^{(n+1)} + Q^{(n)} \cdot \mathfrak{f} \subseteq Q^{(n+1)} + PQ^{(n)}$$

$$\implies Q^{(n)} \subseteq Q^{(n+1)} + PQ^{(n)}$$

$$\frac{Q^{(n)}}{Q^{(n+1)}} \subseteq P \frac{Q^{(n)}}{Q^{(n+1)}} \xrightarrow{\text{Nak}} Q^{(n)} = Q^{(n+1)}$$

Ritornando alla localizzazione, $(QA_Q)^{(n)} = (QA_Q)^{(n+1)}$

$$\xrightarrow{\text{Nak}} (QA_Q)^{(n)} = 0$$

$$A \hookrightarrow A_Q$$

$$Q \hookrightarrow QA_Q$$

$$Q^{(n)} \hookrightarrow (QA_Q)^{(n)} = 0$$

$$\text{Allora } Q^{(n)} = 0 \xrightarrow{\text{A dominio}} Q = 0 \quad \downarrow$$

□

Lemma A anello Noetheriano, P un primo di altezza 0.
 Ogni elemento di P è un divisore di 0.

DIMOSTRAZIONE

A_P è un anello Noetheriano di dimensione 0, quindi è Artiniano.

Per il lemma, $(PA_P)^n = 0$ per qualche $n \geq 1$

Sia $\mathfrak{f} \in P \setminus \{0\}$: $\frac{\mathfrak{f}^n}{1} = 0$ in A_P , cioè $\exists s \notin P$ t.c. $s\mathfrak{f}^n = 0$.

Se $s\mathfrak{f}^{n-1} \neq 0$, $(s\mathfrak{f}^{n-1})\mathfrak{f} = 0 \implies \mathfrak{f}$ è div. di 0.

Se $s\mathfrak{f}^n = 0$, $n \geq 2$ e $(s\mathfrak{f}^{n-2})\mathfrak{f} = 0$

Ho finché trovo $s\mathfrak{f}^k \neq 0$ e $(s\mathfrak{f}^k)\mathfrak{f} = 0$

□

DIMOSTRAZIONE Cor(Krull)

$\text{ht}(P) \leq 1$ per il Hauptsatz.

Se $\text{ht}(P) = 0$, tutti gli el. di P sono divisori di 0
 ma $\mathfrak{f} \notin P$ e non è divisore di 0 $\downarrow$

□

ES A dominio Noetheriano (A non un campo) è UFD
se e solo se ogni primo di altezza 1 è principale.

DIMOSTRAZIONE

($\Rightarrow$) fatta

($\Leftarrow$) Le catene di divisibilità stabilizzano

Sia p irriducibile, Q primo minimale sopra (p) .

$ht(Q)=1$ per il Corollario di Krull $\Rightarrow Q=(q)$ per ipotesi

$(p) \subseteq (q) : \exists a \in A \text{ t.c. } p=aq$, ma p è irriducibile.

Quindi uno fra a e q è un'unità:

se $q \in A^\times$, $Q=(1) \nmid$

se $a \in A^\times$, $(p)=(q)=Q$, cioè p genera un ideale primo $\Rightarrow p$ primo $\square$

un po' di teoria dei numeri

ES A dominio Noetheriano, $\dim A=1$, $x \in A \setminus \{0\}$.

Esistono primi primi che contengono x .

SOL Equivalente: $\text{Spec } A/(x)$ ha primi primi

$\dim A/(x) = 0$ perché le uniche catene in A sono $(0) \subsetneq P$ e $(x) \not\subseteq (0)$.

$\Rightarrow A/(x)$ Artiniano $\Rightarrow A/(x) \cong$ prodotto finito di anelli Artiniani locali
 $\Rightarrow$ primi ideali primi

ES A dominio integralmente chiuso, $S \subseteq A$ parte moltiplicativa $\Rightarrow S^{-1}A$ è integralmente chiuso

SOL $\left(\frac{p}{q}\right)^n + \frac{a_1}{s_1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + \frac{a_n}{s_n} = 0 \quad a_i \in A, s_i \in S$

Moltiplico per $(s_1 \dots s_n)^n$:

$$\left(\frac{s_1 \dots s_n p}{q}\right)^n + a_1 s_2 \dots s_n \left(\frac{s_1 \dots s_n p}{q}\right)^{n-1} + \dots + (s_1 \dots s_{n-1})^n s_n^{n-1} a_n = 0$$

A int. chiuso $\Rightarrow \frac{s_1 \dots s_n p}{q} \in A \Rightarrow \frac{p}{q} \in S^{-1}A$

ES A anello, I_1, I_2 ideali. Se $\forall P$ primo (resp. $\forall M$ massimale)

$I_1 A_P = I_2 A_P$, allora $I_1 = I_2$

DEF Un dominio di Dedekind è un dominio Noetheriano di $\dim 1$ integralmente chiuso.

teorema A dominio di Dedekind, $I \neq (0)$ ideale.

Allora esistono unici $P_1, \dots, P_r$ ideali primi e $e_1, \dots, e_r \geq 1$ t.c.
 $I = P_1^{e_1} \dots P_r^{e_r}$

DIMOSTRAZIONE

$I \ni x \neq 0 \Rightarrow x$ è contenuto in un n° finito di ideali primi $P_1, \dots, P_r$

$\Rightarrow I$ è contenuto in un n° finito di primi $P_1, \dots, P_r$

Per ogni P_i , A_{P_i} è un DVR (dominio Noeth. locale int. chiuso di dim 1)

$IA_{P_i} = (P_i A_{P_i})^{e_i}$ (in un DVR ogni ideale è potenza dell' massimale).

Mostriamo $I = \prod_{i=1}^r P_i^{e_i} =: J$

Nelle localizzazioni.

• $IA_{P_i} = (P_i A_{P_i})^{e_i}$, $JA_{P_i} = (P_i A_{P_i})^{e_i}$ perché $P_j A_{P_i} = (1)$

• per $P \notin \{P_1, \dots, P_r\}$, $IA_P = (1)$ e $JA_P = (1)$

Unicità: $I = P_1^{e_1} \dots P_r^{e_r} = P_1^{f_1} \dots P_r^{f_r}$ (ammettendo esponenti nulli)

$IA_{P_i} = (P_i A_{P_i})^{e_i} = (P_i A_{P_i})^{f_i} \Rightarrow e_i = f_i$

□

def. $P \in \text{Spec}(A)$, $x \in A \setminus \{0\}$. $(x)A_P = (PA_P)^{e_P}$

$v_P(x) := e_P$ valutazione P -adica

Dato $\frac{a}{s} \in \text{Frac}(A)$, $v_P(\frac{a}{s}) = v_P(a) - v_P(s)$

Traccia e norma in est. di campi

$\begin{matrix} L \ni \alpha \\ \uparrow \\ K(\alpha) \\ \uparrow \\ K \end{matrix}$ finita

$\text{tr}_{L/K}(\alpha) := \text{tr}_K(\cdot \alpha : L \rightarrow L)$

$N_{L/K}(\alpha) := \det_K(\cdot \alpha : L \rightarrow L)$

Considero $\cdot \alpha : L \rightarrow L$ è K -lineare

$K(\alpha) = K[x]/(\mu_\alpha(x))$ con $\mu_\alpha(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$ pol. minimo

$L = K(\alpha) \cdot 1 \oplus \dots \oplus K(\alpha) \cdot \alpha^{n-1}$ dove $m = [L : K(\alpha)]$, $n = [K(\alpha) : K]$

Scriviamo $\cdot \alpha : K(\alpha) \rightarrow K(\alpha)$

$\alpha^n = -a_{n-1}\alpha^{n-1} - \dots - a_0$

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & -a_1 \\ 0 & 1 & \dots & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 - a_{n-1} \end{pmatrix} = M_\alpha$ matrice compagna

$\text{tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = -a_{n-1}$ $N_{K(\alpha)/K}(\alpha) = (-1)^n a_0$

Scriviamo $\cdot \alpha : L \rightarrow L$

$\begin{pmatrix} M_\alpha & & & \\ & M_\alpha & & \\ & & \ddots & \\ & & & M_\alpha \end{pmatrix}$

$\text{tr}_{L/K}(\alpha) = -m \cdot a_{n-1}$ $N_{L/K}(\alpha) = ((-1)^n a_0)^m$

$\mu_\alpha(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n) = x^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n)x^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$

$\text{tr}_{K(\alpha)/K}(\alpha) = \text{somma radici pol. min.}$

$N_{K(\alpha)/K}(\alpha) = \text{prod. radici pol. min.}$

Se L/K è di Galois con gruppo G

$\text{tr}_{L/K}(\alpha) = \sum_{g \in G} g(\alpha)$, $N_{L/K}(\alpha) = \prod_{g \in G} g(\alpha)$

Chiamiamo $H = \text{Gal}(L/K(\alpha))$, $\#H = m$.

allora $\sum_{g \in G} g(\alpha) = \sum_{\substack{\text{gruppi} \\ \text{di } G/H}} \sum_{h \in H} (g'h)(\alpha) = m \sum_{g'} g'(\alpha) = m (\text{somma radici pol. min.}) = \text{tr}_{L/K}(\alpha)$

proposizione

$K/\mathbb{Q}$ est. finita, $\mathcal{O}_K$ chiusa intera di $\mathbb{Z}$ in K .

Allora $\mathcal{O}_K$ è Noetheriano; in effetti, $\mathcal{O}_K$ è un $\mathbb{Z}$ -modulo libero di rango finito.

DIMOSTRAZIONE

- Sostituendo K con la sua chiusa di Galois $\tilde{K}$, posso supporre $K = \tilde{K}$ ($\mathcal{O}_K \subseteq \mathcal{O}_{\tilde{K}} \simeq \mathbb{Z}^n \Rightarrow \mathcal{O}_K \simeq \mathbb{Z}^n$)
- $K = \mathbb{Q}(\alpha)$ per il Teo. dell'elemento primitivo
- α soddisfa $\alpha^n + b_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + b_0 = 0$ con $b_i \in \mathbb{Q}$
Se $b_i = a_i/s_i$ con $a_i, s_i \in \mathbb{Z}$, $s_1 \dots s_n \alpha$ è intero su $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}[\alpha] \subseteq \mathcal{O}_K$ $\mathbb{Z}^n \subseteq \mathcal{O}_K$
 $\frac{|\mathbb{Z}[\alpha]|}{|\mu_n(\alpha)|}$

- (Truccone) $\text{tr}: K \times K \rightarrow \mathbb{Q}$

$$(x, y) \mapsto \text{tr}_{K/\mathbb{Q}}(xy) = \sum_{g \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})} g(xy)$$

è una forma $\mathbb{Q}$ -bilineare simmetrica

è non degenera

Scegliamo la matrice in base $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$

$$[\text{tr}]_{i,j} = \text{tr}(\alpha^i \alpha^j) = \sum_{g \in G} g(\alpha^i \alpha^j) = \sum_{g \in G} g(\alpha)^i g(\alpha)^j$$

$\#G = [L:K] = n$, li chiamo $g_0, \dots, g_{n-1}$ e pongo $\alpha_k = g_k(\alpha)$

$$[\text{tr}]_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} g_k(\alpha)^i g_k(\alpha)^j = \sum_{k=0}^{n-1} M_{ik} {}^t M_{kj} \quad \text{dove } M_{ik} = \alpha_k^i$$

$$= (M \cdot {}^t M)_{ij}$$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \dots & \alpha_{n-1} \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \dots & \alpha_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \alpha_0^{n-1} & \alpha_1^{n-1} & \dots & \alpha_{n-1}^{n-1} \end{pmatrix}$$

$$\det[\text{tr}] = (\det M)^2 = \prod_{i,j} (\alpha_j - \alpha_i)^2 \neq 0$$

Quindi tr è non degenera

$\Rightarrow \exists r_0, \dots, r_{n-1}$ base di K come $\mathbb{Q}$ -sp. vett. t.c. $\text{tr}(\alpha^i r_j) = \delta_{ij}$

Esiste $N \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ t.c. $Nr_0, \dots, Nr_{n-1} \in \mathcal{O}_K$

Claim: $\mathcal{O}_K \subseteq \frac{1}{N} \mathbb{Z}[\alpha] \simeq \mathbb{Z}^n$

Dato $\beta \in \mathcal{O}_K$, lo scrivo $\beta = \beta_0 + \beta_1 \alpha + \beta_2 \alpha^2 + \dots + \beta_{n-1} \alpha^{n-1}$

$$\text{e calcolo } N \text{tr}(\beta r_j) = \sum_{i=0}^{n-1} \text{tr}(N \beta_i \alpha^i r_j) = \sum_{i=0}^{n-1} \beta_i \text{tr}(\alpha^i N r_j) = N \beta_j$$

$$\mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \beta_j \in \frac{1}{N} \mathbb{Z}$$

□

Oss $\mathcal{O}_K \simeq \mathbb{Z}^{[K:\mathbb{Q}]}$ sempre

Oss $\text{tr}(\mathcal{O}_K) \subseteq \mathbb{Z}$

$$x \in \mathcal{O}_K, \text{tr}_{K/\mathbb{Q}}(x) = \sum_{g \in G} g(x) \in \mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q}$$

$$\mathcal{O}_K \cap \mathbb{Q} = \{\text{di } \mathbb{Q} \text{ interi su } \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

ES $A = \mathbb{C}[a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3]$

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} \quad I = (a_1 b_2 - a_2 b_1, a_1 b_3 - a_3 b_1)$$

Studiamo i primi minimali sopra I

$$\forall(I) \ni (a_1 - \tilde{a}_1, \dots, b_3 - \tilde{b}_3) \text{ t.c. } \tilde{a}_1 \tilde{b}_2 - \tilde{a}_2 \tilde{b}_1 = 0, \tilde{a}_1 \tilde{b}_3 - \tilde{a}_3 \tilde{b}_1 = 0$$

(1) Trovare i primi minimali sopra I e calcolarne l'altezza

$$P_1 = (a_1, b_1) \quad P_2 = (a_1 b_2 - a_2 b_1, a_1 b_3 - a_3 b_1, a_2 b_3 - a_3 b_2)$$

$$P \ni I \ni a_3(a_1 b_2 - a_2 b_1) - a_2(a_1 b_3 - a_3 b_1) = a_1(a_3 b_2 - a_2 b_3)$$

$$a_1 \in P \quad \text{opp.} \quad a_3 b_2 - a_2 b_3 \in P$$

$$P_2 \subseteq P$$

Ammettendo che P_2 primo, P minimale $\Rightarrow P = P_2$.

$$(a_1, a_2 b_1, a_3 b_1) \subseteq P$$

$$(a_1, b_1) \subseteq P$$

$$(a_1, a_2, a_3) \subseteq P$$

non è minimale perché contiene P_2
oppure per il Teo. dell'altezza

$$\text{ht}(a_1, a_2, a_3) = 3 = \dim A - \dim A/(a_1, a_2, a_3)$$

$$\text{ht}(P_1) = 2 \quad \text{ht}(P_2) = 2$$

$$\text{ht}(P_2) = \dim A - \dim A/P_2 \Rightarrow \dim A/P_2 = 4$$

$$\dim(A/P_2) = \text{tr deg}_{\mathbb{C}} \text{Frac}(A/P_2)$$

classi in A/P_2

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0 \rightarrow \bar{b}_2 = \bar{a}_2 / \bar{a}_1 \bar{b}_1$$

$$a_1 b_3 - a_3 b_1 = 0 \rightarrow \bar{b}_3 = \bar{a}_3 / \bar{a}_1 \bar{b}_1$$

$$a_2 b_3 - a_3 b_2 = 0 \rightarrow \bar{a}_2 \bar{a}_3 / \bar{a}_1 \bar{b}_1 - \bar{a}_3 \bar{a}_2 / \bar{a}_1 \bar{b}_1 = 0$$

Dimostriamo che P_2 non si genera con 2 generatori

$$\mathcal{M} = (a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3) \quad \mathbb{C} \cong \mathcal{M} \times_{P_2 \cap \mathcal{M}^3} P_2 \xrightarrow{\quad} P_2 / P_2 \cap \mathcal{M}^3$$

Se P_2 si generasse con 2 polinomi, il $\mathbb{C}$ -sp. vett. $P_2 / P_2 \cap \mathcal{M}^3$

avrebbe $\dim \leq 3$, ma i 3 generatori che abbiamo sono lin. indep.

$$\lambda_1(a_1 b_2 - a_2 b_1) + \lambda_2(a_1 b_3 - a_3 b_1) + \lambda_3(a_2 b_3 - a_3 b_2) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Il fatto che ci siano 2 primi minimali sopra I dice che I non è primo.

$$\left(\begin{array}{l} P_2 \text{ primo: } A^2 \times A^3 \rightarrow V(P_2) \\ \quad \quad \quad \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{pmatrix} \\ A^5 \text{ irr.} \Rightarrow V(P_2) \text{ irr.} \Rightarrow P_2 \text{ primo} \end{array} \right)$$

ES A dominio in cui ogni ideale primo è principale.
Allora A è PID

ES $A = \mathbb{R}[x, y]/(x^2 + y^2 + 1)$ è PID (ma non Euclideo)

sol $\dim A = 1$, A è est. intera di $\mathbb{R}[x]$

è dominio, perché $x^2 + y^2 + 1$ è irr

I primi $\neq (0)$ sono massimali

Sia $P \neq (0)$ primo. A/P è

- un campo
- $\mathbb{R}$ -algebra fin. gen.

$\Rightarrow A/P$ è est. finita di $\mathbb{R}$

$\Rightarrow A/P \cong \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$

x, y sono lin. dep in $A/P \Rightarrow \exists a, b, c \in \mathbb{R} \neq (0,0)$ t.c.

$a \cdot x + b \cdot y + c = 0$ in $A/P \Rightarrow a + bx + cy \in P$

$$\bullet \frac{\mathbb{R}[x, y]}{(x^2 + y^2 + 1, a + bx + cy)} \underset{b \neq 0}{\cong} \frac{\mathbb{R}[x, y]}{(x + \frac{a}{b} + \frac{c}{b}y, (-\frac{a}{b} - \frac{c}{b}y)^2 + x^2 + 1)} \cong \frac{\mathbb{R}[x, y]/(x + \frac{a}{b} + \frac{c}{b}y)}{((- \frac{a}{b} - \frac{c}{b}y)^2 + y^2 + 1)} \cong \frac{\mathbb{R}[y]}{(\dots)} \cong \mathbb{C}$$

Quindi $(a + bx + cy) = P$

teorema dell'altezza

A anello Noetheriano, $I = (\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n)$, P primo minimale sopra I . Allora $\text{ht}(P) \leq n$.

Lemma

(A, P) anello Noetheriano locale, $x_1, \dots, x_n \in P$.

P è minimale sopra $(x_1, \dots, x_n) \iff \exists N \geq 1$ t.c. $P^N \subseteq (x_1, \dots, x_n)$

Dimostrazione

Se P è minimale, $P/(x_1, \dots, x_n)$ in $A/(x_1, \dots, x_n)$ è sia massimale sia minimale

Quindi $\dim A/(x_1, \dots, x_n) = 0 \implies$ è Artiniano locale

$\implies P/(x_1, \dots, x_n)$ è nilpotente, quindi $\exists N \geq 1$ t.c. $(P/(x_1, \dots, x_n))^N = 0$
cioè $P^N \subseteq (x_1, \dots, x_n)$

Viceversa, se $P^N \subseteq (x_1, \dots, x_n)$, allora $P/(x_1, \dots, x_n)$ è nilpotente

$\implies$ in $A/(x_1, \dots, x_n)$ l'id. max. è nilpotente: allora

$P/(x_1, \dots, x_n)$ è minimale sopra (0) , e tornando in A segue la tesi $\square$

Dimostrazione

Per induzione su n

• $n=0$: ovvio

• $n=1$: Hauptidealsatz

• $n \geq 2$: sostituiamo A con A_P . Prendiamo un primo $P' \neq P$.

Basta mostrare che $\text{ht}(P') \leq n-1$.

Posso assumere che non esistano ideali primi Q t.c. $P' \subsetneq Q \subsetneq P$:

se ci fosse un tale Q , sostituisco P' con Q e ripeto; il processo termina per Noetherianità.

Per minimalità di P , c'è almeno un x_i (wlog x_n) t.c. $x_i \notin P'$

Dico che $\dim A/(P', x_n) = 0$: prendiamo un primo in questo quoziente

Corrisponde a un primo di A , Q , t.c. $(P', x_n) \subseteq Q \subseteq P \implies Q = P$

o $Q = P'$ ma questo non può essere perché $x_n \in Q$

$\implies Q$ l'unica catena di primi ha lunghezza zero.

$\implies P/(P', x_n)$ è nilpotente

$\forall i=1, \dots, n-1 \quad x_i^N \in (P', x_n) \cdot x_i^N = y_i + a_i x_n$ con $y_i \in P', a_i \in A$

Mostriamo che P' è minimale sopra $y_1, \dots, y_{n-1}$

• $P/(y_1, \dots, y_{n-1}, x_n)$ è nilpotente in $A/(y_1, \dots, y_{n-1}, x_n)$:

$P^N \subseteq (x_1, \dots, x_n)$, $\exists N$ t.c. $(x_1, \dots, x_n)^N \subseteq (y_1, \dots, y_{n-1}, x_n)$

$\implies P^{NN} \subseteq (y_1, \dots, y_{n-1}, x_n)$

• $P/(y_1, \dots, y_{n-1})$ è minimale sopra la classe di x_n in $A/(y_1, \dots, y_{n-1})$

$\implies \text{ht } P/(y_1, \dots, y_{n-1}) \leq 1$

• $P/(y_1, \dots, y_{n-1}) \neq P/(y_1, \dots, y_{n-1})$ perché uno contiene la classe di x_n e l'altro no

$\implies \text{ht } P/(y_1, \dots, y_{n-1}) < \text{ht } P/(y_1, \dots, y_{n-1}, x_n) \leq 1$, cioè P' è minimale sopra $(y_1, \dots, y_{n-1})$ $\square$

teorema A anello Noetheriano, P ideale primo con $\text{ht}(P) = r$.
Allora esistono $x_1, \dots, x_r \in P$ t.c. P è minimale sopra $(x_1, \dots, x_r)$.

DIMOSTRAZIONE

- $r=0$: vero per def.
- $r=1$: voglio $x \in P$ ma x non contenuto in alcun ideale primo di $\text{ht}=0$
Siano $Q_1, \dots, Q_m$ i primi minimali di A (n° finito perché A è Noeth)
Si ha $P \not\subseteq Q_i$ perché $\text{ht } P = 1$ e $\text{ht } Q_i = 0 \Rightarrow P \not\subseteq \bigcup_{i=1}^m Q_i$
Sceglgo $x \in P \setminus \bigcup_{i=1}^m Q_i$
Dico che P è minimale sopra (x) : altrimenti
 $(x) \subseteq Q \subsetneq P \quad \text{ht}(P)=1 \Rightarrow \text{ht}(Q)=0 \Rightarrow Q=Q_i \Rightarrow x \in Q_i \quad \downarrow$
- Caso $r \geq 2$: per ricorrenza, costruisco $x_1, \dots, x_r$ t.c. $\forall k=1, \dots, r$ ogni ideale primo sopra $(x_1, \dots, x_k)$ ha altezza $\geq k$ (e quindi $=k$)
Supponiamo di aver costruito $x_1, \dots, x_k, k < r$
C'è un n° finito di primi minimali sopra $(x_1, \dots, x_k)$ (sono i primi minimali di $A/(x_1, \dots, x_k)$) : $Q_1, \dots, Q_m$. $\text{ht}(Q_i) \geq k$, $\text{ht}(Q_i) \leq k$ per Teo. altezza $\Rightarrow \text{ht}(Q_i) = k$
In particolare, $P \not\subseteq Q_i$ perché $\text{ht } P = r > k \Rightarrow P \not\subseteq \bigcup_{i=1}^m Q_i$
Prendo $x_{k+1} \in P \setminus \bigcup_{i=1}^m Q_i$.
Come prima, ogni primo minimale sopra $(x_1, \dots, x_{k+1})$ ha altezza almeno $k+1$.
Infine, P è minimale sopra $x_1, \dots, x_r$: sappiamo che ogni primo minimale sopra $(x_1, \dots, x_r)$ ha altezza r . Se P non fosse minimale, avrei $(x_1, \dots, x_r) \subseteq Q \subsetneq P$, assurdo. □

corollario A anello Noetheriano. Vale la DCC per gli ideali primi :
ogni catena $P_1 \supseteq P_2 \supseteq \dots$ di ideali primi delle stabilizzare.

DIMOSTRAZIONE

$P_1 = (x_1, \dots, x_r)$ è fin.gen. perché A Noeth., $\text{ht } P \leq r$
Se $P_1 \supsetneq P_2 \supsetneq P_3 \supsetneq \dots$, allora $\text{ht } P_1 > \text{ht } P_2 > \text{ht } P_3 > \dots \quad \downarrow$ □


corollario (A, P) Noetheriano locale. Allora $\dim A = \text{ht } P$ è finita.

**teorema:
dimensione
della Fibra**

Sia $\varphi: A \rightarrow B$ omomorfismo di anelli Noetheriani,
 $Q \in \text{Spec } B$, $P = \varphi^{-1}(Q)$.
 Allora $\text{ht } Q \leq \text{ht } P + \dim(B_{\varphi(P)} / \varphi(P)B_Q)$

DIMOSTRAZIONE

Possiamo localizzare.



$$\text{ht } Q = \dim B_Q, \text{ht } P = \dim A_P$$

Sostituisco $A \rightarrow A_P$, $P \rightarrow PA_P$, $B \rightarrow B_Q$, $Q \rightarrow QB_Q$, $\varphi \rightarrow \varphi_P$

Dovrò dimostrare che $\dim B \leq \dim A + \dim B_{\varphi(P)B}$

Scegliamo $a_1, \dots, a_r \in P$ t.c. P è minimale sopra $(a_1, \dots, a_r)$, $r = \dim A$

Scegliamo $b_1, \dots, b_s \in B_{\varphi(P)B}$ t.c. $B_{\varphi(P)B}$ è minimale sopra $(b_1, \dots, b_s)$, $s = \dim B_{\varphi(P)B}$

$b_1, \dots, b_s \in B$ che rappresentano $b_1, \dots, b_s$

Tesi: $\dim B \leq r+s$

$\dim B = \text{ht } Q$: basta mostrare che Q è minimale sopra un ideale

con $r+s$ generatori: $I = (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_r), b_1, \dots, b_s)$

Sappiamo che $\exists N$ t.c. $P^N \subseteq (a_1, \dots, a_r) \Rightarrow \varphi(P)^N \subseteq (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_r))$

$\exists M$ t.c. $(B_{\varphi(P)B})^M \subseteq (b_1, \dots, b_s)$

ciò $Q^M \subseteq (b_1, \dots, b_s) + \varphi(P)B$

$\Rightarrow \exists T$ t.c. $Q^{MT} \subseteq ((b_1, \dots, b_s) + \varphi(P)B)^T \subseteq (b_1, \dots, b_s) + (\varphi(P)B)^M \subseteq (b_1, \dots, b_s) + (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_r))$. $\square$

Interpretazione geometrica

Stano A, B locali, $\varphi: A \rightarrow B \rightsquigarrow \varphi^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$
 $Q \mapsto P$

Consideriamo le preimmagini di P

$$(\varphi^*)^{-1}(P) = \{R \in \text{Spec } B \mid \varphi^*(R) = P\}$$

$$= \{R \in \text{Spec } B \mid \varphi^{-1}(R) = P\}$$

$$= \{R \in \text{Spec } B \mid \varphi^{-1}(R) \supseteq P\} = \text{Spec } B_{\varphi(P)B}$$

$$\dim B \leq \dim A + \dim (\varphi^*)^{-1}(P)$$

esempio

$$A = \mathbb{C}[x] \xrightarrow{i} B = \frac{\mathbb{C}[x, y]}{(x, y)} \quad \begin{matrix} (x, y), (x-x_0, y-y_0) \\ \text{con } x_0=y_0=0 \end{matrix}$$


$$i^*: \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$$

$$(x-x_0, y-y_0) \mapsto (x-x_0)$$

$$(x) \mapsto (x)$$

$$(y) \mapsto (0)$$

Tes. Allora: $\text{ht } Q \leq \text{ht } P + \dim B_{\varphi(P)B}$



• $Q = (x - x_0, y - y_0)$ con $x_0 \neq 0 \rightsquigarrow P = (x - x_0)$

$\text{ht } Q = 1$

$\text{ht } P = 1$

$$\frac{B_Q}{(x-P)B_Q} = \frac{(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x-x_0,y)}}{(x-x_0)(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x-x_0,y)}} \stackrel{x \text{ è invertito}}{\simeq} \frac{(\mathbb{C}[x,y]/(y))_{(x-x_0,y)}}{(x-x_0)(\mathbb{C}[x,y]/(y))_{(x-x_0,y)}} \simeq \mathbb{C}$$

• $Q = (x, y - y_0) \rightsquigarrow P = (x)$ con $y_0 \neq 0$

$\text{ht } Q = 1, \text{ht } P = 1$

$$\frac{B_Q}{(x-P)B_Q} = \frac{(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x,y-y_0)}}{(x)(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x,y-y_0)}} \simeq (\mathbb{C}[y])_{(y-y_0)}$$

• $Q = (x) \rightsquigarrow P = (x)$

$\text{ht } Q = 0, \text{ht } P = 1$

Fibra: $\frac{B_Q}{(x-P)B_Q} = \frac{(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x)}}{(x)(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(x)}} \simeq \frac{\mathbb{C}[y]_{(0)}}{(0)} = \text{Frac } \mathbb{C}[y]$

• $Q = (y) \rightsquigarrow P = (0)$

$\text{ht } Q = 0, \text{ht } P = 0$

Fibra: $\frac{B_Q}{(x-P)B_Q} = \frac{(\mathbb{C}[x,y]/(xy))_{(y)}}{(0)} \simeq (\mathbb{C}[x,y]/(y))_{(y)} = \text{Frac } \mathbb{C}[x]$

Lemma B anello, I ideale di B , Q ideale massimale, $I \subseteq Q$.

Allora $(B/I)_{Q/I} \simeq B_Q / IB_Q$

DIMOSTRAZIONE

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & B_Q & \longrightarrow & B_Q / IB_Q \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & B/I & & & \\ & & \nearrow I \text{ iso. } \varphi & & \\ & & (B/I)_{Q/I} & & \end{array}$$

φ propr. universale

$$\varphi\left(\frac{b}{s}\right) = \frac{\varphi(b)}{\varphi(s)} \pmod{IB_Q} \quad \begin{matrix} b \notin Q \\ s \notin Q \end{matrix}$$

φ è bigettiva:

• surgettiva: gli el. in B_Q / IB_Q sono classi di $\frac{b}{s}$, $s \notin Q$ e stanno in $\text{Im } \varphi$

• iniettiva: $\varphi(b)/\varphi(s)$ e IB_Q , cioè $\exists i \in I, \exists \frac{c}{t} \in B_Q$ t.c. $\varphi(\frac{b}{s}) = \frac{c}{t} i$

teorema A anello Noetheriano. Allora $\dim A[x] = \dim A + 1$.

DIMOSTRAZIONE

($\geq$) Sia $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ catena in A

$$P_0[x] \subsetneq P_1[x] \subsetneq \dots \subsetneq P_r[x] \subsetneq (P_r, x)$$

$$\frac{A[x]}{P_0[x]} \cong (A/P_0)[x] \text{ dominio}; \quad \frac{A[x]}{(P_r, x)} \cong \frac{A[x]/(x)}{(P_r, x)/(x)} \cong \frac{A}{P_r} \text{ dominio}$$

($\leq$) Sia Q un primo di $A[x]$

Teo. fibra su $\varphi: A \rightarrow A[x], P = \varphi^{-1}(Q)$.

$$\text{ht } Q \leq \text{ht } P + \underbrace{\dim(A[x]_Q / \varphi(P) A[x]_Q)}_{\text{costa} \leq 1}$$

$$A[x]_Q / P A[x]_Q \cong (A[x] / P A[x])_{Q/P A[x]} = (A/P[x])_{Q/P A[x]}$$

Un elemento di A che non sta in P ha una classe in $A[x] / P A[x]$ che non sta in Q


Quindi $(A/P[x])_{Q/P A[x]}$ è una localizzazione di $S^{-1}(A/P[x])$ con $S = (A \setminus P) \bmod P = (\text{Frac } A/P)[x]$ che ha dim. 1 □

Due nozioni di dimensione:

- Krull: $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_n$
- (A, P) locale Noetheriano: $\text{ht } P = \dim A = \min \text{ n}^\circ \text{ di generatori di un ideale } I \text{ t.c. } P \text{ è min. sopra } I \iff \sqrt{I} = P$

Intuizioni geometriche:

- Krull: $V(P_r) \subsetneq V(P_{r-1}) \subsetneq \dots \subsetneq V(P_0)$
- min n° di generatori:



$$P' \in V(I) \iff I \subseteq P'$$

$$\sqrt{I} = P \iff V(I) = V(P) \quad I = (f_1, \dots, f_r)$$

Sto cercando di identificare $\{P\}$ con il minimo n° di equazioni

Localizzazioni

A dominio, S generata da una quantità numerabile di elementi $f_1, f_2, f_3, \dots$

$$S_j = \{f_1^{e_1} \dots f_j^{e_j} \mid e_i, \dots, e_j \geq 0\}$$

$$\text{Frac } A \supseteq S^* A \supseteq \dots \supseteq S_j^* A \supseteq S_{j-1}^* A \supseteq \dots \supseteq S_1^* A \supseteq A$$



$$\circ \quad \text{---} \quad \circ \quad \circ \quad \circ \quad \circ \quad \circ \quad \text{---} \quad \text{Spec } \mathbb{Z}$$

$$\text{Spec } \mathbb{Z}_{(2)} \quad 3, 5, 7, 11, \dots$$

$$\text{Spec}(S^* A) = \text{Spec}(\varprojlim S_j^* A) = \varprojlim S_j^* A$$

└─ intersezione

esempio

$$A = \frac{C[x,y]}{(y^2 - x(x+y))}$$



$A_{x,y}$ è un dominio $\Rightarrow \text{Spec } A_{x,y}$ è irriducibile

Vorremmo costruire una sorta di "intorno infinitesimo" del punto $(0,0)$ che faccia vedere le due componenti irriducibili che percepiamo nel disegno.

spazio tangente algebrico

Def. V varietà su $\mathbb{R}$, $P \in V$.

Una derivazione in P è un funzionale lineare

$$X: C^\infty(V) \rightarrow \mathbb{R} \text{ t.c. } X(fg) = f(P)X(g) + X(f)g(P)$$

Oss $X(1) = 0$

proposizione $\text{Der}(\mathbb{R}^n, 0) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^n$

DIMOSTRAZIONE

Dato $v \in \mathbb{R}^n$, considero $X_v: f \mapsto \sum_{i=1}^n v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$

Viceversa, data $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, posso scrivere

$$f = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) \cdot x_i + \sum_{i=1}^n x_i g_i(x) \text{ con } g_i(0) = 0 \quad (*)$$

$$X(f) = X(f(0)) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) X(x_i) + \sum_{i=1}^n (x_i(0) X(g_i) + X(x_i) g_i(0)) =$$

$$f(0) X(1) = 0 \quad \quad \quad = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) \cdot X(x_i) \longrightarrow v = \begin{pmatrix} X(x_1) \\ \vdots \\ X(x_n) \end{pmatrix} \quad \square$$

Oss Se ripartiamo da (*) e deriviamo in x_i :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) + g_i(0) + \sum_{j=1}^n x_j(0) \frac{\partial g_j}{\partial x_i}(0)$$

Algebrizziamo questa descrizione.

• valutazione: $\mathfrak{m} \subset C^\infty(V)$ con $\mathfrak{m} = \{f \in C^\infty(V) \mid f(P) = 0\}$

$$C^\infty/\mathfrak{m} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$$

$$f(x) \mapsto f(P)$$

$$f(x) = (f(x) - f(P)) + f(P)$$

$$f(x) = f(0) + \underbrace{\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) \cdot x_i}_{\in \mathfrak{m}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n x_i g_i(0)}_{\in \mathfrak{m}^2}$$

• Cos'è una derivazione? È un'applicazione $\mathbb{R}$ -lineare $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Def. A anello, $\mathfrak{m}$ un ideale massimale.

Lo spazio tangente ad A in $\mathfrak{m}$ è

$$\{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow A/\mathfrak{m}\} = \text{Hom}_{A(\mathfrak{m})}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, A/\mathfrak{m})$$

Oss $dx_1, \dots, dx_n \in \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ sono le classi di $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}$ nel quoziente $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$

$$f = f(P) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) x_i + \text{qualcosa in } \mathfrak{m}^2$$

$$g = g(P) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i}(0) x_i + \text{qualcosa in } \mathfrak{m}^2$$

$$fg = f(P)g(P) + \sum_{i=1}^n f(P) \frac{\partial g}{\partial x_i}(0) x_i + \sum_{i=1}^n g(P) \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) x_i + \text{qualcosa in } \mathfrak{m}^2$$

$$\Rightarrow X(fg) = f(P)X(g) + X(f)g(P)$$

esempio $A = \frac{\mathbb{R}[x,y,z]}{(y^2+x^4+3x-2y+z)}$ $\mathfrak{M} = (x,y,z)$
 $\text{Hom}(\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2, A/\mathfrak{M}) \quad \nabla f\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad df\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (3, -2, 1)$

$\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 = (x,y,z)/(x^2,y^2,z^2,xy,yz,3x-2y+z) \simeq \langle x,y,z \rangle_{\mathbb{R}} / \langle 3x-2y+z \rangle_{\mathbb{R}}$
 $\text{Hom}(\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2, \mathbb{R}) = \{ \text{appl. lineari } \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \text{ che si annullano in } \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \} = \langle \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle^{\perp}$

def. Un anello locale Noetheriano $(A, \mathfrak{M})$ si dice regolare se
 $\dim_{A/\mathfrak{M}} \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 = \dim A = \text{ht } \mathfrak{M}$
 Equivalentemente, $(A, \mathfrak{M})$ regolare $\iff \mathfrak{M}$ generato da $\text{ht } \mathfrak{M}$ generatori

- $\dim_{A/\mathfrak{M}} \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2$ ← Nakayama
- $\min$ n° di generatori di $\mathfrak{M}$
- $\text{ht } \mathfrak{M}$ ← Teo. altezza

def. A anello Noetheriano si dice regolare se ogni localizzazione ad un ideale massimale lo è.

Teorema: Auslander-Buchsbaum-serre

A regolare, P primo $\implies A_P$ regolare.

Approssimazioni superiori

$\frac{\mathbb{R}[x,y]}{(y^2-x^2(x+y))} \supset \mathfrak{M} = (x,y) \quad f(x)+y g(x)$

$\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 = (x,y)/(x^2,xy) \quad \text{ha dim. 2 con base } x,y$
 $\text{ht } \mathfrak{M} = 1$

$\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^3 = \{ f(x)+y g(x) \mid f(0)=0 \} / (x^3, x^2y, xy^2, y^3) = \frac{\{ f(x)+y g(x) \mid f(0)=0 \}}{(x^3, x^2y)}$

$\dim \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^3 = 2+2=4$

$\dim \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^n = (n-1) + (n-1) = 2(n-1)$

Oss Confrontiamo con $\mathbb{C}[x,y] \supset \mathfrak{M} = (x,y)$
 $\dim \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^n = \text{monomi di deg tot } \geq 1 \text{ e } \leq n-1$
 $= \dim \mathbb{C} \langle x^a y^b \mid 1 \leq a+b \leq n-1 \rangle = \binom{n+1}{2} - 1$

esempio $A = K[x_1, \dots, x_r]$, $\mathfrak{M} = (x_1, \dots, x_r)$
 $\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^n \longleftrightarrow \{ p(x_1, \dots, x_r) \in K[x_1, \dots, x_r] \mid p(0)=0, \text{ ogni monomio ha deg } \leq n-1 \}$

$\dim \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^n = \binom{n-1+r}{r} - 1 \sim \frac{n^r}{r!}$

teorema $(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano.

- 1) la funzione $n \mapsto \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$ coincide con un polinomio per $n \gg 0$.
- 2) Questo polinomio è asintotico a $C^{\text{reg}}/d!$, $C \in \mathbb{Z}_0$, $d = \text{ht } \mathfrak{m} = \dim A$.

Completamenti

A Noetheriano, $\mathfrak{m}$ ideale

$$\varphi \in A \mapsto \bar{\varphi} \in A/\mathfrak{m}, \bar{\varphi} \in A/\mathfrak{m}^2, \bar{\varphi} \in A/\mathfrak{m}^3, \dots$$

def. Il completamento di A in $\mathfrak{m}$ è

$$\{(\varphi_i)_{i \in \mathbb{N}} \mid \varphi_i \in A/\mathfrak{m}^i, \varphi_i \equiv \varphi_j \pmod{\mathfrak{m}^j} \forall i \geq j\}$$

esempio • $A = K[x_1, \dots, x_n]$, $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)$

$$A/\mathfrak{m} \quad 1$$

$$A/\mathfrak{m}^2 \quad 1 + x_1 - x_2$$

$$A/\mathfrak{m}^3 \quad 1 + x_1 - x_2 + x_1^2$$

⋮

$$\hat{A} = K[[x_1, \dots, x_n]]$$

$$\bullet A = \left(\frac{\mathbb{C}[x, y]}{(y^2 - x^2(1+x))} \right)_{(x, y)} \quad \mathfrak{m} = (x, y)$$

$$\hat{A} = \frac{\mathbb{C}[[x, y]]}{(y^2 - x^2(1+x))}$$

Oss $\mathbb{C}[[x, y]]$ è locale con id. massimale (x, y)

$$\frac{1}{1+g(x,y)} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n g(x,y)^n \in \mathbb{C}[[x, y]]$$

$$\hat{A} = \frac{\mathbb{C}[[x, y]]}{(y - xg(x))(y + xg(x))}$$

$$g(x) = \sqrt{1+x} = \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} x^n \in \mathbb{C}[[x, y]]$$

Oss $\binom{x}{n} = \frac{x(x-1)(x-2) \dots (x-n+1)}{n!}$

$$\text{Spec}(\hat{A}) \supset V(y - g(x)x), V(y + g(x)x)$$

Questi completamenti corrispondono a prendere "intorni infinitesimi" intorno ad $\mathfrak{m}$.

Anelli regolari

def. $(A, \mathfrak{m})$ locale regolare.

Un sistema regolare di parametri è un insieme di generatori $x_1, \dots, x_r$ di $\mathfrak{m}$ con $r = \text{ht } \mathfrak{m}$

proposizione A Noetheriano, P primo minimale sopra $(x_1, \dots, x_r)$, $\text{ht } P = r$.
Allora per ogni $i=1, \dots, r$ l'ideale $P/(x_1, \dots, x_i)$ ha altezza $r-i$ in $A/(x_1, \dots, x_i)$

DIMOSTRAZIONE

Sia $\bar{P} := P/(x_1, \dots, x_i)$ è minimale sopra $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r)$

quindi $\text{ht } \bar{P} \leq r-i$.

Viceversa, se $h := \text{ht } \bar{P}$, allora $\bar{P}$ è minimale sopra $(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_h)$

$\Rightarrow P$ è minimale sopra $(x_1, \dots, x_i, y_1, \dots, y_h)$

$\Rightarrow \text{ht } P = r \leq i + h \Rightarrow \text{ht } \bar{P} \geq r-i$ □

corollario (A, P) locale regolare, $x_1, \dots, x_r$ sistema regolare di parametri
Allora $A/(x_1, \dots, x_i)$ è regolare, con sistema regolare di parametri $(x_{i+1}, \dots, x_r)$ per ogni $i=1, \dots, r$

DIMOSTRAZIONE

$\text{ht } P/(x_1, \dots, x_i) = r-i$ ed è generato da $\bar{x}_{i+1}, \dots, \bar{x}_r$ □

teorema Sia (A, P) locale regolare.
Allora A è un dominio.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione su $\dim A$

• $\dim A = 0$: P è generato da 0 elementi $\Rightarrow P = (0)$
 $\Rightarrow (0)$ è massimale $\Rightarrow A$ campo

• $\dim A = d \geq 1$: prendiamo $x \in P$ che non sia nell'unione dei primi minimali e nemmeno in P^2 .

$P \setminus (\bigcup_{i=1}^d Q_i \cup P^2) \neq \emptyset$? (Q_i primi minimali)

$\iff P \not\subseteq \bigcup_{i=1}^d Q_i \cup P^2$ Se $P \subseteq \bigcup_{i=1}^d Q_i \cup P^2$ avremmo

o $P \subseteq Q_i$: impossibile perché $1 \leq \text{ht } P \leq \text{ht } Q_i = 0$

o $P \subseteq P^2$: allora $P = P^2 \xrightarrow{\text{Nak}} P = (0)$

$\bar{x} \in P/P^2$ non è zero, e posso completarlo ad una base dell' A/P -spazio vettoriale P/P^2 , diciamo $\bar{x}, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_r$.

Sottraendo a $x, x_2, \dots, x_r \in P$, ho un sistema locale di parametri

Considero $A/(x)$, che è regolare con sist. reg. di par. le classi di $x_2, \dots, x_r$ in $A/(x)$

Per ipotesi induttiva, è un dominio, cioè (x) è primo, di altezza

$\text{ht}(x) \leq 1$ per Hauptidealsatz, e $\text{ht}(x) \neq 0$ perché $x \notin Q_i$

Prendiamo ora $Q \neq (x)$ ideale primo.

Sia $b \in Q$: allora $b = ax$, con $a \in A$, $x \notin Q \Rightarrow a \in Q$

$\Rightarrow Q = (x)Q = PQ \xrightarrow{\text{Nak}} Q = (0) \Rightarrow (0)$ è primo e A è dominio. □

Teorema:
Auslander-
Buchsbaum

Sia $(A, \mathcal{P})$ locale regolare.
Allora A è UFD.

Oss A locale regolare di $\dim 1 \iff A$ è DVR

teorema K campo, $A = K[x_1, \dots, x_r]$. Allora tutti gli ideali massimali di A sono generati da $r = \dim A$ elementi
(ricorda che $\text{ht } \mathfrak{m} = \dim A$ per ogni massimale $\mathfrak{m}$)
In particolare, A è regolare.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione su r

• $r=0$: A è un campo

• $r=1$: $K[x]$ è PID.

• Sia $r \geq 2$, $\mathfrak{m}$ ideale massimale. Sia $\neq \in \mathfrak{m} \setminus \{0\}$.

A meno di automorfismo di A , posso supporre $\neq$ monico in x_r .

Ora $K[x_1, \dots, x_r]/(\neq)$ è intero su $K[x_1, \dots, x_{r-1}]$

Sia $N := \mathfrak{m}/(\neq) \cap K[x_1, \dots, x_{r-1}]$

Ora $\overline{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/(\neq)$ è un ideale massimale di $K[x_1, \dots, x_r]/(\neq)$,
e quindi N è un ideale massimale

Per ipotesi induttiva, N è generato da $r-1$ elementi $\neq_1, \dots, \neq_{r-1}$

Pensando $\neq_1, \dots, \neq_{r-1}$ come elementi di $K[x_1, \dots, x_{r-1}] \subset A$

abbiamo $(\neq_1, \dots, \neq_{r-1}) \subset \mathfrak{m}$. Allora $\mathfrak{m}$ corrisponde ad
un ideale di $\frac{K[x_1, \dots, x_r]}{N[x_r]} = \frac{K[x_1, \dots, x_{r-1}][x_r]}{N[x_r]} \simeq \left(\frac{K[x_1, \dots, x_{r-1}]}{N} \right)[x_r]$,

che è l'anello di polinomi in 1 variabile sul campo $K[x_1, \dots, x_{r-1}]/N$

Allora $\mathfrak{m}/N$ è generato da 1 elemento $\neq_r$, quindi

$\mathfrak{m} = (\neq_1, \dots, \neq_r)$.

□

Ex K campo non necess. alg. chiuso, $\mathfrak{m} \subset K[x_1, \dots, x_r]$ ideale massimale
Esiste $(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \in \overline{K}^r$ f.c. $\mathfrak{m} = \{ p(x_1, \dots, x_r) \in K[x_1, \dots, x_r] \mid p(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = 0 \}$

completamenti

Def. Un gruppo topologico è un gruppo G munito di una topologia t.c. $m: G \times G \longrightarrow G$ e $i: G \longrightarrow G$ siano continue.

Oss. i è un omeomorfismo: i^{-1} esiste ed è continua.

- Per ogni $g \in G$, la funzione $L_g: G \longrightarrow G$

$$g \longmapsto g \cdot g$$
 è un omeomorfismo.
- $\{U_i\}_{i \in I}$ SFI di $\{e\} \Rightarrow \{xU_i\}_{i \in I}$ è SFI di x
- Se U è intorno aperto di e , allora U^{-1} è intorno aperto di e
 $\Rightarrow U \cap U^{-1}$ è intorno aperto di e

Lemma Sia $H := \bigcap_{\substack{e \in U \\ U \text{ aperto}}} U$. Allora.

- $H \triangleleft G$.
- $H = \overline{\{e\}}$
- la top. su G è $T_2 \iff H = \{e\}$
- G/H è T_2 .

DIMOSTRAZIONE

(i) $h_1, h_2 \in H$. $m: G \times G \longrightarrow G$

$h_1, h_2 \in H \iff h_1, h_2 \in U$ per ogni aperto $U \ni e$

$m^{-1}(U) \ni (e, e) \Rightarrow m^{-1}(U)$ contiene $U_1 \times U_2$ con U_1, U_2 intorni aperti di e
 $\Rightarrow h_1 \in U_1, h_2 \in U_2 \Rightarrow h_1 h_2 \in m^{-1}(U) \Rightarrow m(h_1, h_2) \in U$

Per l'inverso è analogo

Per la normalità: $G \longrightarrow G$
 $x \longmapsto g x g^{-1}$ è omeomorfismo,

quindi manda gli int. aperti negli int. aperti

(ii) Sia $x \in \overline{\{e\}}$: x è contenuto in tutti i chiusi che contengono e

Se $x \notin H$, $\exists U$ intorno di e t.c. $x \notin U$. Posso supporre $U = U^{-1}$

$x \notin U \iff e \notin xU^{-1} = xU$. Passando al complementare:

$e \in (xU)^c$ chiuso e $x \notin (xU)^c \nmid$

Viceversa, sia $x \in H$: se $x \notin \overline{\{e\}}$, $\exists C$ chiuso con $e \in C, x \notin C \iff e \notin xC^{-1}$
 $\Rightarrow e \in (xC^{-1})^c$ aperto, ma $x \notin (xC^{-1})^c \Rightarrow x \notin H \nmid$.

(iii) Se G è T_2 , $\overline{\{e\}} = H = \{e\}$.

Viceversa, se $H = \{e\}$, considero $f: G \times G \longrightarrow G$

Ora $\{e\}$ è chiuso, $f^{-1}(e)$ è un chiuso $(g_1, g_2) \longmapsto g_1^{-1} g_2$

cioè la diagonale è chiusa in $G \times G \Rightarrow G$ T_2 .

(iv) G/H è $T_2 \iff H = \bigcap_{\substack{U \ni H \\ U \text{ aperto}}} U/H = \{\bar{e}\}$



D'ora in poi: G abeliano, esiste una base numerabile di intorni aperti dell'identità che sono anche sottogruppi, $\{G^n\}_{n \in \mathbb{N}}$

Oss $G^0, G^1 \leadsto G^0 \cap G^1, G^2 \leadsto G^2 \cap G^1 \cap G^0, \dots$
 Posso supporre $G^n \supseteq G^{n+1}$

Def. Una successione di Cauchy in G è una successione $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in G$ t.c.
 $\forall m \exists n_0 = n_0(m)$ t.c. $\forall n_1, n_2 \geq n_0$ vale $g_{n_1} - g_{n_2} \in G^m$

Due successioni di Cauchy g_n, h_n sono equivalenti se

$g_n - h_n \rightarrow 0$, cioè $\forall m \exists n_0(m)$ t.c. $g_n - h_n \in G^m \forall n \geq n_0$

Il completamento di G rispetto alla topologia indotta da G^m è

$\hat{G} = \{\text{successioni di Cauchy}\} / \text{equivalenza}$

È un gruppo (la somma si fa termine a termine; è compatibile con l'equivalenza) topologico:

come base di intorni dell'identità

$\hat{G}^n = \{\text{classi di equiv. di suc. di Cauchy ogni cui rapp. } \{g_k\} \text{ ha la proprietà che } g_k \in G^n \text{ per ogni } k \gg 0\}$

Oss Sia $\pi_n: G \rightarrow G_n := G/G^n$ la proiezione canonica
 Se $\{g_i\}$ è di Cauchy, $\{\pi_n(g_i)\}$ è def. costante (per $i \rightarrow +\infty, n$ fissato).
 Chiamiamo $\pi_n(g_\infty)$ il valore a cui si stabilizza.

$\varphi: \hat{G} \rightarrow \prod G_n = \prod G/G^n$
 $\{g_i\} \mapsto (\pi_n(g_\infty))_n$

È ben definita e iniettiva

Se una collezione $(\xi_n) \in \prod G_n$ sta in $\text{Im } \varphi$, allora

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow{\quad} & \xi_n \\ G/G^{n+1} & \longrightarrow & G/G^n \end{array}$$

Def. Una sequenza compatibile è un elemento $(\xi_n) \in \prod G/G^n$
 tale che $\xi_{n+1} \bmod G^n = \xi_n \quad \forall n \geq 0$.

L'immagine di φ è l'insieme delle successioni compatibili,
 che denoteremo $\varprojlim G/G^n$

Infatti, se (ξ_n) è compatibile, scelgo $\tilde{\xi}_n \in G$ t.c. $\tilde{\xi}_n \equiv \xi_n \bmod G^n$

Dico che $(\tilde{\xi}_n)$ è di Cauchy: $\tilde{\xi}_n - \tilde{\xi}_m \equiv \xi_n - \xi_m \equiv 0 \bmod G^n \quad m \geq n$

proposizione

$\hat{G} \cong \varprojlim G/G^n$ come gruppo topologico, dove
 la topologia su $\varprojlim G/G^n$ è quella di sottospazio
 (chiuso) del prodotto $\prod G/G^n$

Oss Gli aperti in $\varprojlim G/G^n$: una base di intorni dell'identità è
 data da $\{\text{Ker } \pi_k: \varprojlim G/G^n \rightarrow G_k/k\}$

Def. A anello, M A -modulo.

Una filtrazione su M è una successione $M^0 \supseteq M^1 \supseteq M^2 \supseteq \dots$ di sottomoduli di M . Si dice esauritiva se $\bigcup M^i = M$ e separata se $\bigcap M^i = \{0\}$.

$$\text{Poniamo } M_n := M/M^n, \quad \phi_n: M/M^{n+1} \longrightarrow M/M^n$$

$$M \longrightarrow \hat{M} \cong \varprojlim M_n$$

$$m \longmapsto (m \bmod M^n)_n$$

Il nucleo di $M \rightarrow \hat{M}$ è $\bigcap M^n$, quindi è iniettiva $\iff \bigcap M^n = \{0\} \iff$ la top. è T_2 .
Se $M \rightarrow \hat{M}$ è un isomorfismo, si dice che M è completo.

$$M^n = I^n M \text{ topologia } I\text{-adica}$$

Oss. $\hat{M}$ ha una topologia con intorni aperti

$$\hat{M}^n := \ker(\hat{M} \rightarrow M_n)$$

$$\bullet \hat{M}^n \supset \hat{M}^{n+1} \quad \forall n \quad \text{e} \quad \hat{M}/\hat{M}^n \cong M/M^n$$

$\text{Im}(\hat{M} \rightarrow M_n)$, che è surgettiva perché
dato $\bar{m} \in M_n$, trovo $m \in M$ che si proietta su $\bar{m}$ e
prendo la succ. costante m

$$\bullet \hat{M} = \varprojlim \hat{M}/\hat{M}^n = \varprojlim M/M^n = \hat{M}$$

• A anello: $\hat{A} = \varprojlim A/I^n \cong \text{TC } A/I$ è un anello

esempio • $A = R[x_1, x_2, \dots, x_r]$

$A^n = (x_1, \dots, x_r)^n$, A/A^n polinomi in $R[x_1, \dots, x_r]$ di grado $\leq n-1$

$$\varprojlim A/A^n \ni \sum_{i_1, \dots, i_r=0}^{\infty} C_{i_1, \dots, i_r} x_1^{i_1} \dots x_r^{i_r}$$

da interpretare come $(\sum_{i_1, \dots, i_r=0}^{\infty} C_{i_1, \dots, i_r} x_1^{i_1} \dots x_r^{i_r})_n$

• Se A è un anello completo rispetto ad $\{A^n\}$, risolveremo
 $\sum_{i=0}^{\infty} a_i$ con l'ipotesi che tutti gli a_n salvo un n° finito stanno in A^n
per indicare la successione coerente $(\sum_{i \in \mathbb{N}} a_i)_{n \in \mathbb{N}}$

• A anello, I ideale di A , M A -modulo, $M^n = I^n M$

$\hat{M} = \varprojlim M/M^n$ è detto il completamento I -adico di M

$A = M = \mathbb{Z}$, $I = (p) \rightarrow \hat{A} \cong \mathbb{Z}_p$ è l'anello degli interi p -adici

$A = M = \mathbb{Z}$, $M^n = 2\mathbb{Z} \rightarrow \hat{A} = \varprojlim \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

proposizione

M^n, N^n filtrazioni su M . Supponiamo che

$\forall m \geq 0 \exists n_0(m) \text{ t.c. } N^n \subseteq M^m \quad \forall n \geq n_0$ e

$\forall n \geq 0 \exists m_0(n) \text{ t.c. } M^m \subseteq N^n \quad \forall m \geq m_0$.

Allora i completamenti rispetto M^n e N^n sono isomorfi.

Dimostrazione

L'ipotesi significa che le topologie indotte sono la stessa,
e il completamento dipende solo dalla topologia. $\square$

Oss Fissiamo A anello, I ideale. Su ogni A -modulo M c'è la topologia I -adica.

Siano M, N due A -moduli, $\varphi: M \rightarrow N$ omomorfismo

$$\varphi(I^n M) \subseteq I^n \varphi(M) \subseteq I^n N$$

Allora possiamo definire una mappa $\hat{\varphi}: \hat{M} \rightarrow \hat{N}$
 $(\xi_n) \mapsto (\varphi_n(\xi_n))$

$\varphi_n: M/I^n M \rightarrow N/I^n N$ è ben definita ed è un omomorfismo di moduli
 Inoltre la successione $(\varphi_n(\xi_n))$ è coerente:

$$\varphi_n(\xi_{n+1}) \equiv \varphi_n(\xi_n) \pmod{I^n N}$$

$$\varphi_{n+1}(\xi_n + I^n M) \subseteq \varphi_{n+1}(\xi_n) + I^n N$$

Quindi $M \mapsto \hat{M}$, $\varphi \mapsto \hat{\varphi}$ è un funtore sulla categoria degli A -moduli.

teorema A anello Noetheriano, I ideale di A . Se la successione

$$0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{\alpha} M_2 \xrightarrow{\beta} M_3 \rightarrow 0$$

è esatta e M_1, M_2, M_3 sono finitamente generati, allora

$$0 \rightarrow \hat{M}_1 \xrightarrow{\hat{\alpha}} \hat{M}_2 \xrightarrow{\hat{\beta}} \hat{M}_3 \rightarrow 0$$

è esatta.

corollario A Noeth, I ideale

(i) Il completamento di I^n/I^{n+1} è $I^n/I^{n+1} \forall n \geq 0$

(ii) $\hat{A}/\hat{I} \cong A/I$ e $\hat{I}^n/\hat{I}^{n+1} \cong I^n/I^{n+1} \forall n \geq 0$.

Dimostrazione

$$(i) M := I^n/I^{n+1} \quad M^{(i)} = I^i I^n/I^{n+1} = 0 \quad \forall i \geq 1$$

$$\varprojlim M/M^{(i)} = \text{succ. coerenti in } (0) \times \prod_{i=1}^{\infty} M = \{(m_i) \mid m_{i+1} = m_i\} \cong I^n/I^{n+1}$$

$$(ii) \quad 0 \rightarrow I^{n+1} \rightarrow I^n \rightarrow I^n/I^{n+1} \rightarrow 0 \text{ esatta}$$

$$\Rightarrow 0 \rightarrow \widehat{I^{n+1}} \rightarrow \widehat{I^n} \rightarrow \widehat{I^n/I^{n+1}} \rightarrow 0 \text{ esatta, quindi}$$

$$\widehat{I^n/I^{n+1}} = \widehat{I^n}/\widehat{I^{n+1}} = \hat{I}^n/\hat{I}^{n+1}$$

□

Lemma $\hat{\hat{A}} \cong \hat{A}$

Dimostrazione

$$\hat{\hat{A}} = \varprojlim (A^n/I^n A^n) = \varprojlim (A/I^n)^n = \hat{\hat{A}}$$

□

proposizione A Noetheriano, I ideale rispetto a cui $\hat{A}$ completo, J ideale.

- $\hat{J}$ = ideale generato da J in $\hat{A} =: J\hat{A}$
- In particolare, $\hat{A/J} \cong \hat{A}/J\hat{A}$

DIMOSTRAZIONE

• A Noeth $\Rightarrow J$ fin gen, $J = (x_1, \dots, x_n)$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & K & \xrightarrow{\quad} & A^n & \xrightarrow{\quad} & J \rightarrow 0 \quad \text{esatta} \\ & & \text{Körp} & & (a_1, \dots, a_n) \mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i & & \iota: A \rightarrow \hat{A} \\ \Rightarrow & 0 & \rightarrow & R & \xrightarrow{\quad} & \hat{A}^n & \xrightarrow{\quad} \hat{J} \rightarrow 0 \quad \text{è esatta} \\ & & & & (\hat{a}_1, \dots, \hat{a}_n) \mapsto \sum_{i=1}^n \hat{a}_i \iota(x_i) & & \end{array}$$

$$\Rightarrow \hat{J} = (\iota(x_1), \dots, \iota(x_n)) \hat{A}$$

• Per def ho $0 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow A/J \rightarrow 0$ esatta

$$\Rightarrow 0 \rightarrow \hat{J} \rightarrow \hat{A} \rightarrow \hat{A/J} \rightarrow 0 \quad \text{è esatta}$$

$$\Rightarrow \hat{A/J} \cong \hat{A}/J\hat{A}$$

□

esempio $A = K[x, y]$, $I = (x, y)$, $J = (y^2 - x^3 - x^2)$
 $\hat{A/J} \cong \hat{A}/J\hat{A} = K[[x, y]]/(y^2 - x^3 - x^2)$

proposizione A Noetheriano. Allora $A[[x]]$ è Noetheriano.

DIMOSTRAZIONE

Chiamiamo $v(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i) = \min \{i : a_i \neq 0\}$ e $lc(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i) = a_{v(\sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i)}$

Sia I un ideale di $A[[x]]$: mostriamo che è fin.gen.

Sia $I_r = \{lc(f) \mid f \in I, v(f) = r\} \cup \{0\}$

(Sono ideali: se $i, l_2 \in I_r$, allora $i_1 = lc(f_1), i_2 = lc(f_2)$ e

$0 \leq i_1 + i_2 = 0 \leq i_1 + i_2 = lc(f_1 + f_2)$ che ha $v(f_1 + f_2) = r$.

Se $i \in I_r, i = lc(f)$, allora $\forall a \in A$ o $a \cdot i = 0$ o $a \cdot i = lc(a \cdot f)$

$I_r \subseteq I_{r+1}$: se $i \in I_r, i = lc(f), v(f) = r$ e $i = lc(xf)$ con $v(xf) = r+1$

A Noeth $\Rightarrow I_r$ stabilizza a n_0 : $I_n = I_{n_0} \forall n \geq n_0$

Prendo a_{ij} generatori di I_i per $i=1, \dots, n_0$ con $1 \leq j \leq l(i) < \infty$

e $f_{ij} \in I$ con $v(f_{ij}) = i$ e $lc(f_{ij}) = a_{ij}$.

Dimostriamo che gli f_{ij} generano I

Dato $f \in I, f \neq 0$, e scrivo $f = a_r x^r + a_{r+1} x^{r+1} + \dots$

• Se $r \leq n_0, a_r \in I_r = (a_{r,1}, \dots, a_{r,l(r)})$

Scrivo $a_r = \sum_{j=1}^{l(r)} c_j a_{r,j} \xrightarrow{(f_{r,j})} lc(\sum_{j=1}^{l(r)} c_j f_{r,j}) = a_r$

$f - \sum_{j=1}^{l(r)} c_j f_{r,j} = a_{r+1} x^{r+1} + a_{r+2} x^{r+2} + \dots$

• Se $r > n_0, a_r \in I_r = I_{n_0}$: scrivo $a_r = \sum_{j=1}^{l(n_0)} c_j a_{n_0,j}$

e $f - \sum_{j=1}^{l(n_0)} c_j x^{r-n_0} f_{n_0,j} = a_{r+1} x^{r+1} + \dots$

Quindi posso trovare iterativamente dei $c_j^{(n)} \in A$ t.c.

$f - \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{l(r)} c_j^{(r)} f_{r,j} - \sum_{r=n_0+1}^{\infty} \sum_{j=1}^{l(n_0)} c_j^{(r)} x^{r-n_0} f_{n_0,j} = 0$

$\Rightarrow f = \sum_{r=0}^{\infty} \sum_{j=1}^{l(r)} c_j^{(r)} f_{r,j} + \sum_{j=1}^{l(n_0)} \underbrace{\left(\sum_{r=n_0+1}^{\infty} c_j^{(r)} x^{r-n_0} \right)}_{\in A[[x]]} f_{n_0,j}$

$\Rightarrow I = (f_{r,j})$ è fin.gen. □

proposizione A Noetheriano, $I = (a_1, \dots, a_n)$. Allora

(i) $\hat{A} \cong A[[x_1, \dots, x_n]] / (x_i - a_i \mid i=1, \dots, n)$

(ii) $\hat{A}$ è Noetheriano.

DIMOSTRAZIONE

$B := A[x_1, \dots, x_n] \xrightarrow{\varphi} A$

$I = (x_1, \dots, x_n)$

$x_i \mapsto a_i$

$J = \text{Ker } \varphi = (x_i - a_i \mid i=1, \dots, n)$

$f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 - a_1)g_1 + h(x_2, \dots, x_n) = (x_1 - a_1)g_1 + \dots + (x_n - a_n)g_n + a$

$0 = \varphi(f(x_1, \dots, x_n)) = a \Rightarrow f \in (x_i - a_i \mid i=1, \dots, n)$

Ho la succ. esatta $0 \rightarrow J \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow 0$ di B-moduli

$\Rightarrow 0 \rightarrow \hat{J} = J\hat{B} \rightarrow \hat{B} \rightarrow \hat{A} \rightarrow 0$ è esatta

$\Rightarrow \hat{A} \cong \hat{B}/J\hat{B} \cong K[[x_1, \dots, x_n]] / (x_i - a_i \mid i=1, \dots, n)$

(ii) Per induzione, $A[[x_1, \dots, x_n]]$ è Noeth $\Rightarrow \hat{A}$ è Noeth □

Oss Se R è completo rispetto alla topologia m -adica, dove m è massimale, allora R è locale

DIMOSTRAZIONE

$$R = \hat{R} = \varprojlim R/m^n$$

Dimostriamo che gli el. di $R \setminus m$ sono invertibili.

Sia $a \in R \setminus m$. La classe $\bar{a} \in R/m$ è invertibile:

Sia $b \in R$ t.c. $ab \in 1+m$. Scrivo $ab = 1+m$ con $m \in m$.

Basta dim. che $1-m$ è invertibile. il suo inverso è $1+m+m^2+m^3+\dots = \sum_{i=0}^{\infty} m^i$

Basta vedere che $(1-m) \sum_{i=0}^{n-1} m^i \equiv 1$ in $R/m^n \forall n$

Sugli interi p-adici

p primo, $\mathbb{Z}_p$ completamente p -adico di $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \longleftarrow \dots$$

$$\rightarrow \mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i \text{ con } a_i \in \{0, \dots, p-1\} \right\} = \mathbb{Z}[[x]]/(x-p)$$

esempio $p=5$ $(2+p)(3+p) = 6+5p+p^2 = 1+6p+p^2 = 1+p+2p^2$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[[x]]/(x-p) & \longrightarrow & \mathbb{Z}_p \\ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n & \longmapsto & \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n \end{array}$$

esempio $p=2$ "Quanto fa" $1+2+4+\dots = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n$ in $\mathbb{Z}_2$
 $\frac{1}{1-2} = -1$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z}[[x]]/(x-2) & \xrightarrow{\phi} & \mathbb{Z}_2 \\ \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n & \longrightarrow & \sum 2^n = \phi\left(\frac{1}{1-x}\right) = -1 \end{array}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n = -1 \iff \underbrace{1+1+2+4+8+16+\dots}_\equiv 0 \pmod{2^n} \forall n = 0$$

Valutazione

$$v_p\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n\right) = \min\{n \mid a_n \neq 0\}$$

$$a_n \in \{0, \dots, p-1\}$$

$$\bullet v(ab) = v(a) + v(b) \implies \mathbb{Z}_p \text{ è dominio}$$

$$\bullet v(a+b) \geq \min\{v(a), v(b)\}, \text{ con } = \text{ se } v(a) \neq v(b)$$

$\mathbb{Z}_p$ è locale, Noetheriano, il suo ideale massimale è (p)

$\mathbb{Z}_p$ è un DVR

Lemma $f(x) \in R[x]$. Allora $\exists g(x,t) \in R[x,t]$ t.c.
 $f(x+t) = f(x) + f'(x)t + t^2 g(x,t)$

DIMOSTRAZIONE

Per linearità, basta $f = C_n x^n$

$$C_n(x+t)^n = C_n(x^n + n \cdot t x^{n-1} + t^2 \sum_{j=2}^n \binom{n}{j} t^{j-2} x^{n-j}) \quad \square$$

Lemma di Hensel

R anello completo rispetto alla topologia data da un ideale massimale m , $f(x) \in R[x]$, $a_1 \in R$ t.c. $f(a_1) \equiv 0 \pmod{m}$. Supponiamo $f'(a_1) \notin m$. Allora $\exists! a \in R$ t.c. $f(a) = 0$ e $a \equiv a_1 \pmod{m}$.

DIMOSTRAZIONE

$$R = \hat{R} = \varprojlim R/m^n, \quad a = (a_n)$$

$$f(a) = 0 \implies f(a) \equiv 0 \pmod{m^2} \implies f(a_2) \equiv 0 \pmod{m^2}$$

Dovrò scegliere $a_2 = a_1 + m$ per qualche $m \in m$

$$0 \equiv f(a_2) \equiv f(a_1 + m) \equiv f(a_1) + m f'(a_1) + m^2 g(a, m) \equiv f(a_1) + m f'(a_1) \pmod{m^2}$$

Dovrò prendere $m \equiv -f(a_1)/f'(a_1) \pmod{m^2}$
 $\searrow \notin m$, quindi invertibile

$$\text{In generale, prendiamo } a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$$

$$\text{Allora } f(a_{n+1}) = f\left(a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}\right) = f(a_n) - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)} f'(a_n) + \left(-\frac{f(a_n)}{f'(a_n)}\right)^2 (\dots)$$

$$\text{Se } f(a_n) \equiv 0 \pmod{m^n} \implies f(a_{n+1}) \equiv 0 \pmod{m^{n+1}}$$

Per induzione

- $f(a_n) \in m^n$
- $a_{n+1} \equiv a_n \pmod{m^n}$
- $f'(a_n) \equiv f'(a_1) \notin m$ ed è invertibile

$\implies$ la successione $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è compatibile e $f(a) = 0$.

Siano $a \neq b$ due soluzioni di $f(x) = 0$ con $a \equiv b \equiv a_1 \pmod{m}$

$\exists n$ t.c. $a - b \in m^n \setminus m^{n+1}$ (altrimenti $a = b$ in ogni $R/m^{n+1} \implies a = b$)

$$0 = f(a) = f(b + (a-b)) = f(b) + f'(b)(a-b) + (a-b)^2 g(a,b)$$

$$\implies -f'(b)(a-b) = (a-b)^2 g(a,b)$$

$$\underbrace{m \nmid f'(a_1)}_{m^n, m^{n+1}} \underbrace{m^n}_{m^{2n}} \underbrace{m^{2n}}_{m^{2n}}$$

Siccome $n \geq 1$, questo è impossibile. □

Def. Sia $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di gruppi, muniti di omomorfismi $\phi_n: G_{n+1} \rightarrow G_n$: questo si chiama sistema inverso di gruppi, e ϕ_n sono le mappe di transizione.
 Il limite inverso (o limite proiettivo) è $\varprojlim G_n = \{ (g_n) \in \prod G_n \mid \phi_n(g_{n+1}) = g_n \forall n \}$

Proposizione Siano $(A_n), (B_n), (C_n)$ tre sistemi inversi di gruppi abeliani e $0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$ una successione esatta, cioè un insieme di diagramma commutativi esatto $\forall n$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A_n & \xrightarrow{\alpha_n} & B_n & \xrightarrow{\beta_n} & C_n \rightarrow 0 \\ & & \uparrow \phi_n^A & \subset & \uparrow \phi_n^B & \subset & \uparrow \phi_n^C \\ 0 & \rightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & B_{n+1} & \xrightarrow{\beta_{n+1}} & C_{n+1} \rightarrow 0 \end{array}$$

(i) C'è una successione esatta

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \xrightarrow{\hat{\alpha}} \varprojlim B_n \xrightarrow{\hat{\beta}} \varprojlim C_n$$

(ii) Se inoltre ϕ_n^A è surgettiva, allora è esatta anche

$$0 \rightarrow \varprojlim A_n \xrightarrow{\hat{\alpha}} \varprojlim B_n \xrightarrow{\hat{\beta}} \varprojlim C_n \rightarrow 0$$

Dimostrazione

(i) Iniettività di $\hat{\alpha}$: se $\hat{\alpha}((a_n)) = 0$, allora $(\alpha_n(a_n)) = 0 \Rightarrow \forall n \alpha_n(a_n) = 0$, ma α_n è iniettiva $\Rightarrow a_n = 0 \forall n \Rightarrow (a_n) = 0$

Esattezza in $\varprojlim B_n$: $\text{Ker } \hat{\beta} = \text{Im } \hat{\alpha}$

Sia $(b_n) \in \text{Ker } \hat{\beta}$. Allora $\beta_n(b_n) = 0 \forall n$, e quindi

$\forall n \exists a_n \in A_n$ con $b_n = \alpha_n(a_n)$. Vorrei dire $(b_n) = \hat{\alpha}((a_n))$:

(a_n) è compatibile, infatti $\phi_n^A(a_{n+1}) \stackrel{?}{=} a_n \forall n$

$$\stackrel{\alpha_n \text{ iniettiva}}{\iff} \alpha_n \circ \phi_n^A(a_{n+1}) \stackrel{?}{=} \alpha_n(a_n) = b_n \iff \phi_n^B \circ \alpha_{n+1}(a_{n+1}) \stackrel{?}{=} b_n$$

$$\iff \phi_{n+1}^B(b_{n+1}) = b_n, \text{ vero poiché } (b_n) \text{ è compatibile}$$

(ii) Sia $(c_n) \in \varprojlim C_n$. Per ogni n , β_n è surgettiva

$$\Rightarrow \exists b_n \in B_n \text{ t.c. } c_n = \beta_n(b_n).$$

Non è detto che (b_n) sia compatibile, ma possiamo renderla tale.

$$\phi_n^B(b_{n+1}) \stackrel{?}{=} b_n$$

$$\text{So che } \beta_n \circ \phi_n^B(b_{n+1}) = \phi_n^C \circ \beta_{n+1}(b_{n+1}) = \phi_n^C(c_{n+1}) = c_n = \beta_n(c_n)$$

$$\Rightarrow \phi_n^B(b_{n+1}) - b_n \in \text{Ker } \beta_n = \text{Im } \alpha_n \Rightarrow \exists! a_n \in A_n \text{ t.c. } \phi_n^B(b_{n+1}) - \alpha_n(a_n) = b_n$$

Per ipotesi, $\exists a_{n+1} \in A_{n+1}$ t.c. $a_n = \phi_n^A(a_{n+1})$, e allora

$$\alpha_n(a_n) = \alpha_n \circ \phi_n^A(a_{n+1}) = \phi_{n+1}^B \circ \alpha_{n+1}(a_{n+1})$$

$$\text{Quindi } \phi_n^B(b_{n+1} - \alpha_{n+1}(a_{n+1})) = b_n$$

$$\text{Infine } \beta_{n+1}(b_{n+1} - \alpha_{n+1}(a_{n+1})) = c_{n+1} - \beta_{n+1} \circ \alpha_{n+1}(a_{n+1}) = c_{n+1}$$

Iterativamente, posso rendere (b_n) compatibile

senza cambiare il fatto che $\hat{\beta}((b_n)) = (c_n) \Rightarrow \hat{\beta}$ è surgettiva. □

teorema

A anello Noetheriano, I ideale di A . Se la successione

$$0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{\alpha} M_2 \xrightarrow{\beta} M_3 \rightarrow 0$$

è esatta e M_1, M_2, M_3 sono finitamente generati, allora

$$0 \rightarrow \hat{M}_1 \xrightarrow{\hat{\alpha}} \hat{M}_2 \xrightarrow{\hat{\beta}} \hat{M}_3 \rightarrow 0$$

è esatta.

Lemma di Artin-Rees

A anello Noetheriano, $M_1 \subseteq M_2$ A -moduli fin. gen.

La filtrazione $I^n M_2 \cap M_1$ induce la stessa topologia su M_1 della filtrazione $I^n M_1$.

Dimostrazione (Tuo)

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & M_1 & \rightarrow & M_2 & \xrightarrow{\beta} & M_3 \rightarrow 0 \text{ esatta} \\ \Downarrow \otimes A/I^n & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & M_1/I^n M_1 & \rightarrow & M_2/I^n M_2 & \xrightarrow{\beta_n} & M_3/I^n M_3 \rightarrow 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} M_2 & \rightarrow & M_3 & \rightarrow & M_3/I^n M_3 \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & M_2/I^n M_2 & & \end{array}$$

Dico che $\text{Ker}(M_2/I^n M_2 \xrightarrow{\beta_n} M_3/I^n M_3)$ è $\frac{M_1 + I^n M_2}{I^n M_2}$

Se $m_2 + I^n M_2 \in \text{Ker } \beta_n$, allora $\beta(m_2) \in I^n M_3$

$\Rightarrow$ posso scrivere $\beta(m_2) = \sum \alpha_i m_3$ con $\alpha_i \in I^n, m_3 \in M_3$
 $= \sum \alpha_i \beta(m'_2)$ $m'_2 \in M_2$

$$\Rightarrow \beta(m_2 - \sum \alpha_i m'_2) = 0$$

$$\Rightarrow m_2 - \sum \alpha_i m'_2 \in M_1 \Rightarrow m_2 \in M_1 + I^n M_2$$

Se ho $m_1 + \sum \alpha_i m_2$ è applico β , trovo

$\beta(m_1) + \sum \alpha_i \beta(m_2) = \sum \alpha_i \beta(m_2) \in I^n M_3$ e passando al quoziente trovo 0.

Ho quindi

$$0 \rightarrow \frac{M_1 + I^n M_2}{I^n M_2} \rightarrow M_2/I^n M_2 \rightarrow M_3/I^n M_3 \rightarrow 0 \text{ esatta } \forall n$$

$$0 \rightarrow \frac{\overset{M_1}{\downarrow} \downarrow}{M_1 \cap I^n M_2} \rightarrow M_2/I^n M_2 \rightarrow M_3/I^n M_3 \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \frac{\uparrow \downarrow}{M_1 \cap I^{n+1} M_2} \rightarrow M_2/I^{n+1} M_2 \rightarrow M_3/I^{n+1} M_3 \rightarrow 0$$

La proposizione fornisce

$$0 \rightarrow \varprojlim \frac{M_1}{M_1 \cap I^n M_2} \xrightarrow{\parallel \text{ Artin-Rees}} \varprojlim M_2/I^n M_2 \rightarrow \varprojlim M_3/I^n M_3 \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \hat{M}_1 \rightarrow \hat{M}_2 \rightarrow \hat{M}_3 \rightarrow 0$$

□

Def.

A anello, M modulo, $M = M^0 \supset M^1 \supset M^2 \supset \dots$ una filtrazione.

Diciamo che $\{M^n\}$ è

• una I -filtrazione se $I M^n \subseteq M^{n+1} \forall n \geq 0$

• una I -filtrazione stabile se inoltre $\exists n_0 \geq 0$ t.c. $\forall n \geq 0$

$$M^{n_0+n} = I^n M^{n_0}$$

Due filtrazioni M^n, N^n hanno differenze limitate se

$$\exists n_0 \text{ t.c. } M^{m+n_0} \subseteq N^m \forall m \text{ e } N^{n+n_0} \subseteq M^n \forall n$$

Lemma Se M^*, N^* sono due filtrazioni I -stabili, allora hanno differenze limitate.

DIMOSTRAZIONE

$\exists n_0$ t.c. $\forall r \geq 0 \quad M^{n_0+r} = I^r M^{n_0}$ e $N^{n_0+r} = I^r N^{n_0}$
 $M^{n_0+r} = I^r M^{n_0} \subseteq I^r M^0 = I^r N^0 \subseteq N^r$
 e viceversa.

□

Lemma di Artin-Rees

Sia A anello Noetheriano, I ideale di A , M A -modulo fin.gen, M^* una I -filtrazione stabile, $M' \subseteq M$ un sottomodulo.

(i) $M^* \cap M'$ è una I -filtrazione stabile di M'

(ii) $\exists k \geq 0$ t.c. $\forall n \geq k$ vale

$$I^n M \cap M' = I^{n-k} (I^k M \cap M')$$

(iii) $\{I^n M'\}$ e $\{I^n M \cap M'\}$ inducono la stessa topologia su M' .

Anelli graduati

Def. Un anello graduato è un anello A munito di una decomposizione $A \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} A_n$ come gruppo additivo, tale che $\forall a_m \in A_m \quad \forall a_n \in A_n \quad a_n a_m \in A_{n+m}$

esempio $A = K[x_1, \dots, x_n] = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$, $A_n = \{ \text{pol. omogenei di grado } n \}$

Oss $A_+ := \bigoplus_{n \geq 1} A_n$ è un ideale:
 $(a_0 + \bigoplus_{n \geq 1} a_n)(b_0 + \bigoplus_{m \geq 1} b_m) \in A_+$

Def. Un modulo graduato su $A \cong \bigoplus A_n$ è un A -modulo M con una decomposizione $M \cong \bigoplus_{n \geq 0} M_n$, in cui ogni M_n è un sotto- A_0 -modulo, con la proprietà: $\forall a \in A_d, \forall m \in M_n$ si ha $am \in M_{n+d}$.
 Gli elementi $m \in M_n$ si chiamano omogenei di grado n .
 In generale, ogni $m \in M$ si scrive in modo unico come

$$m = m_{d_1} + \dots + m_{d_k}$$

$\bigoplus_{M_{d_1}} \quad \quad \quad \bigoplus_{M_{d_k}}$

e gli m_{d_i} si chiamano le componenti omogenee di m

proposizione

A anello graduato Sono equivalenti:

(i) A Noetheriano

(ii) A_0 Noetheriano, A fin.gen. come A_0 -algebra

DIMOSTRAZIONE

$$(ii) \Rightarrow (i): A_0[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow A$$

Noetheriano per Teo. base di Hilbert $\Rightarrow$ A Noetheriano

$$(i) \Rightarrow (ii): A_0 \cong A/A_+ \text{ è Noetheriano}$$

$A_+ \triangleleft A$ Noeth $\Rightarrow A_+ = (x_1, \dots, x_n)$ (come ideale di A)

Scevro ogni $x_i = \sum y_{ij}$ con y_{ij} omogeneo di $\deg > 0$

$$\longrightarrow A_+ = (y_{ij})$$

Quindi wlog posso supporre x_i omogenei di grado di

Consideriamo $\varphi: A_0[t_1, \dots, t_n] \longrightarrow A$: voglio dire che è surg.

$$t_i \longmapsto x_i$$

Si come $A \cong \bigoplus_{d \geq 0} A_d$, basta mostrare $A_d \subseteq \text{Im } \varphi \forall d \geq 0$.

Per induzione:

• $d=0$: $A_0 = \varphi(\text{polinomi costanti})$

• $d \geq 1$: sia $a \in A_{d+1} \subseteq A_+ = (x_1, \dots, x_n)$.

In A posso scrivere $a = \sum_{i=1}^n a_i x_i$

$$\Rightarrow [a]_{d+1} = \sum_{i=1}^n [a_i x_i]_{d+1} = \sum_{i=1}^n [a_i]_{d+1-d_i} x_i$$

$$a_i = a_{i,0} + \dots + a_{i,k} \quad \text{comp. omog.}$$

$$\Rightarrow a_i x_i = a_{i,0} x_i + a_{i,1} x_i + \dots + a_{i,k} x_i \quad \text{comp. omog.}$$

Per ipotesi induttiva, $[a_i]_{d+1-d_i} \in \text{Im } \varphi$

$$\Rightarrow a = [a]_{d+1} \in \text{Im } \varphi$$

$$\Rightarrow A_{d+1} \subseteq \text{Im } \varphi$$

def.

Sia A anello, I ideale di A, M A-modulo con una I-ritrazione M^n l'algebra di blow-up (o algebra di Rees) è

$$B_I A := \bigoplus_{n \geq 0} I^n = A \oplus I \oplus I^2 \oplus \dots \quad (= \bigoplus_{n \geq 0} t^n I^n)$$

$$\text{e } B_I(M) = \bigoplus_{n \geq 0} M^n$$

Oss • $B_I A$ è un anello graduato e $B_I(M)$ è un modulo graduato su $B_I A$:

$I^m \times M^n \longrightarrow M^{m+n}$ ha senso perché, per def. di I-ritrazione, $I^m M^n \subseteq M^{m+n}$

• A Noetheriano, allora $B_I A$ è Noetheriano:

$(B_I A)_0 = A$ è Noetheriano e $B_I A$ è generato come

A-algebra da $\{t_j\}_{j=1, \dots, m}$ dove $(t_1, \dots, t_m) = I$.

esempio

• $A = K[x]$, $I = (x)$

$$B_I A = K[x] \oplus (x)t \oplus (x)^2 t^2 \oplus \dots \cong K[x, tx] \cong K[x, y]$$

• $A = K[x, y]$, $I = (x, y)$

$$B_I A \cong K[x, y] \oplus (x, y)t \oplus (x, y)^2 t^2 \oplus \dots \cong$$

Siamo $w = xt$, $z = yt$: soddisfamo $yw = xz$

$$\Rightarrow B_I A \cong K[x, y, z, w] / (xz - yw)$$

Hauptidealsatz per varietà

ES K campo, $A = K[x_1, \dots, x_n]$, $f \in A$ irriducibile
 $L = \text{Frac}(A/(f))$. Dimostrare che
 $\text{trdeg}_K L = n-1$

SOL $\text{wlog } \deg_{x_n}(f) > 0$

Considero le classi di $x_1, \dots, x_{n-1}$ in L .

- Sono alg. indipendenti: per assurdo, siano dipendenti

Allora $\exists p(t_1, \dots, t_{n-1}) \in K[t_1, \dots, t_{n-1}]$ t.c. $p(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}) = 0$ in L ,
cioè $p(x_1, \dots, x_{n-1}) \in (f)$ ma i multipli non banali di
 f dipendono da x_n , assurdo

- $K \subseteq K(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}) \subseteq L$

↖ algebrica: è generata da x_n , che è algebrico
su $K(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1})$

$$\Rightarrow \text{trdeg}_K L = \text{trdeg}_K K(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_{n-1}) = n-1$$

ES $A = K[x_1, \dots, x_n]$, $f \neq 0$: $f = u p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$.

- I primi minimali sopra f sono $P_1 = (p_1), \dots, P_r = (p_r)$.
- $\text{ht } P_i = 1 \quad \forall i=1, \dots, r$

SOL Se P primo contiene f , contiene uno dei p_i e quindi $P \supseteq P_i$.

Siccome p_i irrid. $\Rightarrow p_i$ primo (in UFD), i P_i sono i primi minimali.

$$\text{ht } P_i = \dim K[x_1, \dots, x_n] - \dim(K[x_1, \dots, x_n]_{P_i}) = n - \text{trdeg}_K \text{Frac}(K[x_1, \dots, x_n]_{P_i}) = n - (n-1) = 1$$

($\text{trdeg}_K \text{Frac } B = \dim B$, $\text{ht } P = \dim B_P = \dim B - \dim(B/P)$)

ES K campo, A K -alg. fin. gen dominio,

$B \cong K[x_1, \dots, x_n] \cong A$ finita, $f \in A \setminus \{0\}$.

- C'è un numero finito di primi minimali sopra f .
Fissiamone uno P .

- Dimostrare che $\exists g \in A \setminus \{0\}$ t.c. PA_g è l'unico primo minimale sopra $(f)A_g$

Questo succede $g \in P_2, \dots, P_r$ (altri primi minimali) e $g \notin P$

$g_2 \in P_2 \setminus P$ (se non esistesse $P_2 \subseteq P$, assurdo per minimalità)

$g_i \in P_i \setminus P$ e prendiamo $g = \prod_{i=2}^r g_i \notin P$

$[A_g = \text{aperto } D(g) = "g \neq 0"$ non contiene $P_2, \dots, P_r]$

- Supponiamo che in A_g , $\text{ht } PA_g = 1$. Allora $\text{ht } P = 1$

$A_P = (A_g)_{PA_g}$ perché $g \notin P$.

$$\Rightarrow \text{ht } P = \dim A_P = \dim (A_g)_{PA_g} = \text{ht } PA_g = 1$$

- $(f) \subseteq P$ e P è l'unico primo minimale $\Rightarrow \sqrt{(f)} = P$
perché $\sqrt{(f)} = \bigcap_{f \in Q} Q = P$

$$\begin{array}{ccc} A & \text{Frac } A = L & \neq \\ | & | & \\ B & \text{Frac } B = F & N_{L/F}(\neq) =: \neq_0 \end{array}$$

Dimostriamo che $\neq_0 \in B$.

Polinomio minimo di $\neq$: c'è un polinomio monico a coeff. in B che annulla $\neq$, $\neq^n + \tilde{b}_{n-1} \neq^{n-1} + \dots + \tilde{b}_0 = 0$

$$q(t) = t^n + \tilde{b}_{n-1} t^{n-1} + \dots + \tilde{b}_0 \in B[t]$$

Poiché B è UFD, fattorizzo il polinomio $q(t) = q_1(t) \dots q_h(t)$

con q_i monico. $0 = q(\neq) = q_1(\neq) \dots q_h(\neq) \Rightarrow$ c'è un polinomio monico in $B[t]$ irriducibile che si annulla in $\neq$

$$\neq_0 = N_{L/F}(\neq) = [(-1)^n \tilde{b}_0]^{[L:F(\neq)]} \in B \quad t^n + \tilde{b}_{n-1} t^{n-1} + \dots + \tilde{b}_0$$

• Chiamiamo $Q = P \cap B$. Dimostriamo che $Q = \sqrt{(\neq_0)}$

* Mostriamo che $\neq_0 \in B$. Basta $b_0 \in Q$

$$B \ni b_0 = -\neq^n - \tilde{b}_{n-1} \neq^{n-1} - \dots - \tilde{b}_0 \in (\neq) \subseteq P \Rightarrow b_0 \in Q \\ \Rightarrow \sqrt{(\neq_0)} \subseteq Q$$

* Viceversa, se $y \in Q \subseteq P = \sqrt{(\neq)}$, posso scrivere $y^n = \neq \cdot h$ per qualche $n \geq 1, h \in A$

$$\Rightarrow N_{L/F}(y)^n = N_{L/F}(\neq) N_{L/F}(h) \in (\neq_0)$$

$$\begin{array}{ccc} y \in \sqrt{(\neq_0)} & \Rightarrow & Q \subseteq \sqrt{(\neq_0)} \\ \text{per } y \in \sqrt{(\neq_0)} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \dim A/P = \dim B/Q & \text{perché sono in un'est. intera} & \\ \dim A - \text{ht } P & \dim B - \text{ht } Q & B \subseteq A \text{ intera} \\ n & n-1 & \end{array}$$

$$\text{Quindi } \text{ht } P = 1$$

Hensel e i p-adici

$$\textcircled{1} \sqrt{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} x^n = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \dots$$

Hensel: $R = K[[x]]$ K campo, $\text{char } K \neq 2$

completamento di $K[x]$ rispetto a $I = (x)$

Mi chiedo se in R c'è una radice di $p(t) = t^2 - (1+x)$

Hensel: se c'è $r_0 \in R$ t.c. $p(r_0) \in (x)$ e $p'(r_0) \notin (x)$,

allora $\exists r \in R$ t.c. $p(r) = 0$ e $r \equiv r_0 \pmod{(x)}$

Se prendo $r_0 = 1$, $p(r_0) = -x \in (x)$, $p'(r_0) = 2 \notin (x)$ (perché $2 \neq 0$)

$$r_0 = 1, r_1 = r_0 - p(r_0)/p'(r_0) = 1 - (-x)/2 = 1 + \frac{x}{2}$$

$$r_2 = 1 + \frac{x}{2} - \frac{p(1+\frac{x}{2})}{p'(1+\frac{x}{2})} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1+x+\frac{x^2}{4} - (1+x)}{2(1+\frac{x}{2})} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}} = \\ = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} (1 - \frac{x}{2} + O(x^2)) \equiv 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} \pmod{(x)^4}$$

② Se $\text{char } K = 2$, $1+x = \neq^2(x)$ non ha soluzione:

$$\text{se } \neq(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad \text{ho } \neq(x)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} c_n^2 x^{2n} \text{ ha solo potenze pari di } x$$

③ L'ipotesi $f'(x_0) \notin \mathfrak{M}$ è necessaria

• Unicità: $R = \mathbb{Z}_p$, $\mathfrak{M} = (p)$, $f(x) = x(x-p)$, $x_0 = 0$
 $f(x)$ ha due radici congrue fra loro mod p
 $f'(x) = 2x - p$, $f'(0) = -p \in \mathfrak{M}$

• Esistenza: $R = \mathbb{Z}_p$, $\mathfrak{M} = (p)$, $f(x) = x^2 - p$, $x_0 = 0$
 $f(x)$ non ha radici in $\mathbb{Z}_p$: $\forall y \in \mathbb{Z}_p$ $v(y^2) = 2v(y)$ è pari
 quindi $y \neq p$ perché $v(p) = 1$
 $f'(0) = 0 \in \mathfrak{M}$

④ Dimostreremo che $(\frac{1}{2}) \in \mathbb{Q}$ ha denominatore una potenza di 2

(formulaz. alternativa: $\forall p \neq 2$, $v_p(\frac{1}{2}) \geq 0$)

Consideriamo $(\frac{1}{n}) : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, dove $\mathbb{Q}_p = \text{Frac } \mathbb{Z}_p$, $\text{char } \mathbb{Q}_p = 0$

Vediamo che i polinomi $\in \mathbb{Q}_p[x]$ danno funzioni continue

Gli intorno di 0 in $\mathbb{Z}_p$ sono $\{x \in \mathbb{Z}_p \mid v(x) \geq n\} = \{\text{Ker} : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p/(p^n)\}$

Dato $q \in \mathbb{Q}_p$, una base di intorno è $\{q+x \mid x \in \mathbb{Z}_p, v(x) \geq n\}$

Questa topologia è indotta da una metrica

$$d(q_1, q_2) = p^{-v(q_1 - q_2)}$$

$$B(0, r) = \{x \mid d(x, 0) < r\} = \{x \mid p^{-v(x)} < r\} = \{x \mid -v(x) \log p < \log r\} \\ = \{x \mid v(x) > -\frac{\log r}{\log p}\}$$

Prendiamo ora $h(x) = \frac{\sum_{i=0}^n a_i x^i}{p^k}$ con $a_i \in \mathbb{Z}_p$

$\mathbb{Z}_p$ è un DVR con id. mass $(p) \rightarrow \text{Frac } \mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$

Sia $x_0 \in \mathbb{Q}_p$, un intorno $V = \{y \mid v(y - h(x_0)) \geq N\}$ dell'immagine.

Devo costruire un intorno U di x_0 t.c. $h(U) \subseteq V$

Prendo $U = \{z \mid v(z - x_0) \geq N+k\}$: allora $\forall u \in U$

$$\sum_{i=0}^n a_i u^i \equiv \sum_{i=0}^n a_i x_0^i \pmod{p^{N+k}}$$

$$\Rightarrow p^k h(u) \equiv p^k h(x_0) \pmod{p^{N+k}}$$

$$\Leftrightarrow v(p^k(h(u) - h(x_0))) \geq N+k \Leftrightarrow k + v(h(u) - h(x_0)) \geq N+k \Leftrightarrow h(u) \in V$$

Oss $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$ è denso, cioè $\forall x \in \mathbb{Z}_p \forall N \exists n \in \mathbb{Z}$ t.c.

$$n \in \{y \mid v(x-y) \geq N\} \Leftrightarrow v(x-n) \geq N \Leftrightarrow x \equiv n \pmod{p^N}$$

Dato x , calcolando $x \in \mathbb{Z}_p/p^N \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^N \mathbb{Z}$, allora c'è un n con la stessa classe di resto.

CSS $v_p : \mathbb{Q}_p \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}$ è continua

$$x \in \mathbb{Q}_p \setminus \{0\}, v_p(x) = n \quad v_p(x + p^n \mathbb{Z}_p) = n$$

Dim che $v_p(\frac{1}{2}) \geq 0 \quad \forall p \neq 2$

$$p \neq 2 \Rightarrow \frac{1}{2} \in \mathbb{Z}_p$$

Per densità, $\exists (x_k) \subset \mathbb{Z}$ t.c. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \frac{1}{2}$. Allora

$$v_p(\frac{1}{2}) = v_p(\lim_{k \rightarrow \infty} (\frac{x_k}{2})) = \lim_{k \rightarrow \infty} v_p(\frac{x_k}{2}) \geq 0$$

perché $v_k(\text{intero}) \geq 0$

Oss Se $q \in \mathbb{Q}$, $v_p(q) \geq 0 \Rightarrow v_p(\frac{q}{n}) \geq 0$

⑤ Sollevamento di Teichmüller

$$\mathbb{Z}_p \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}_p/(p) \cong \mathbb{F}_p$$

ES Esiste un unico omomorfismo $\omega: \mathbb{F}_p^\times \longrightarrow \mathbb{Z}_p^\times$
tale che $\pi \circ \omega = \text{id}_{\mathbb{F}_p}$

SOL Oss $\text{Im}(\omega) = \{x \in \mathbb{Z}_p^\times \mid x^{p-1} = 1\}$

Sia $f(x) = x^{p-1} - 1$. Cerco delle radici in $\mathbb{Z}_p$ applicando Hensel.

Dato $\bar{a} \in \mathbb{F}_p^\times$ e $a \in \mathbb{Z}_p$ t.c. $\pi(a) = \bar{a}$

$$a^{p-1} - 1 \in (p) \iff \bar{a}^{p-1} - 1 = 0, \text{ che è sempre vero}$$

Si ha $f'(a) = (p-1)a^{p-2} \notin (p)$

Per Hensel, $\exists! \omega(a) \in \mathbb{Z}_p$ t.c. $f(\omega(a)) = 0$, $\omega(a) \equiv \bar{a} \pmod{p}$

Questa costruzione non dipende dalla scelta di a che solleva $\bar{a}$

Oss $f(x)$ ha esattamente $p-1$ radici in $\mathbb{Z}_p$, a 2 a 2 distinte mod p

Siano ora $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{F}_p^\times$

$$\begin{cases} \omega(\bar{a}\bar{b}) \equiv \bar{a}\bar{b} \pmod{p} \\ \omega(\bar{a}\bar{b})^{p-1} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \omega(\bar{a})\omega(\bar{b}) \equiv \bar{a}\bar{b} \pmod{p} \\ \omega(\bar{a})^{p-1}\omega(\bar{b})^{p-1} = 1 \end{cases}$$

$$\implies \omega(\bar{a}\bar{b}) = \omega(\bar{a})\omega(\bar{b})$$

⑥ Un giochino

Sia $S_k = \sum_{n=1}^k 2^n/n$. Dimostrare che $v_2(S_k) \longrightarrow +\infty$

FATTO $-\log_p(1-x) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ converge $\forall x \in p\mathbb{Z}_p$

$$\text{Inoltre } \log(ab) = \log(a) + \log(b)$$

$$\log_p((1-x)(1-y)) = \log_p(1-x) + \log_p(1-y) \quad \forall x, y \in p\mathbb{Z}_p$$

Prendo $p=2$, $x=y=2$ e trovo

$$0 = \log_2(1) = \log_2(-1) + \log_2(-1) \implies \log_2(-1) = 0$$

$$-\log_2(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n/n = 0 \implies \text{somme parziali tendono a } 0$$

$$\implies v_2(S_k) \longrightarrow +\infty$$

Lemma A anello Noetheriano, M A -mod fin.gen, $I \triangleleft A$, M^n I -filtrazione.
Sono equivalenti:
(i) $B(M)$ è fin.gen. come $B_I A$ -mod
(ii) M^n è I -stabile.

DIMOSTRAZIONE

Oss • M^n è fin.gen su A (A Noeth, M fin.gen.)

• Poniamo

$$M_n^* = M^0 \oplus M^1 \oplus \dots \oplus M^n \oplus I M^n \oplus I^2 M^n \oplus \dots \subseteq B(M)$$

è un sotto- $B_I A$ -mod:

$$I^k (M_n^*)_d \subseteq (M_n^*)_{k+d}$$

$$\text{se } k+d \leq n, (M_n^*)_{k+d} = M^{k+d}$$

$$\text{se } k+d > n, (M_n^*)_{k+d} = I^{k+d-n} M^n$$

$$\text{se } d > n \quad I^k (M_n^*)_d = I^k (I^{d-n} M^n)$$

$$\text{se } d \leq n \quad I^k M^d \subseteq I^{k+d-n} M^n \text{ segue dalla def.}$$

$$\text{di } I\text{-filtrazione: } I^k M^d = I^{k+d-n} I^{n-d} M^d \subseteq I^{k+d-n} M^n = (M_n^*)_{k+d}$$

Inoltre M_n^* è fin.gen. come $B_I A$ -mod, prendendo come generatori quelli di $M^0, \dots, M^n$ come A -mod.

$$(B_I A \cdot M^n \supseteq I^k M^n = M^{n+k})$$

$$\text{Abbiamo anche } \bigcup_{n \geq 0} M_n^* = B(M)$$

• La successione M_n^* stabilizza $\iff$ la filtrazione è I -stabile:

$$M_{n_0+r}^* = M_{n_0}^* \quad \forall r \geq 0 \iff \forall r \quad \forall i=1, \dots, r \text{ vale } M^{n_0+i} = I^i M^{n_0}$$

$$M_{n_0}^* = M^0 \oplus \dots \oplus M^{n_0} \oplus I M^{n_0} \oplus \dots \oplus I^r M^{n_0} \oplus \dots$$

$$M_{n_0+r}^* = M^0 \oplus \dots \oplus M^{n_0} \oplus M^{n_0+1} \oplus \dots \oplus M^{n_0+r} \oplus I M^{n_0+r} \oplus \dots$$

(i) $\implies$ (ii) Se $B(M)$ è fin.gen su $B_I A$, che è Noeth siccome A è Noeth, $B(M)$ è Noeth $\implies \{M_n^*\}$ stabilizza $\implies$ la filtrazione è stabile

(ii) $\implies$ (i) Se la filtrazione è I -stabile, $\{M_n^*\}$ stabilizza e quindi $B(M) = \bigcup_{n \geq 0} M_n^* = M_{n_0}^*$ che è fin.gen. come $B_I A$ -mod. □

DIMOSTRAZIONE (A-R)

(i) $M' \cap M^n$ è una I -filtrazione:

$$I(M' \cap M^n) \subseteq I M' \cap I M^n \subseteq M' \cap M^{n+1}$$

Inoltre $B(M') = \bigoplus_{n \geq 0} (M' \cap M^n) \subseteq \bigoplus M^n = B(M)$ è un sotto- $B_I A$ -mod:

siccome M^n è I -stabile, $B(M)$ è fin.gen su $B_I A$ Noeth

$\implies B(M')$ è fin.gen $\implies$ la filtrazione su M' è I -stabile

(ii) Prendiamo $M^n = I^n M$. Per (i), $I^n M \cap M'$ è I -stabile, cioè

$$\exists n_0 \text{ t.c. } I^r (I^{n_0} M \cap M') = I^{n_0+r} M \cap M' \quad \forall r \geq 0$$

(iii) $I^n M \cap M'$ e $I^n M'$ sono I -stabili: quindi hanno differenza limitata e in particolare inducono la stessa topologia. □

teorema dell'intersezione di Krull

Sia (A, P) Noetheriano locale, $I \triangleleft A$, $I \neq (1)$, M A -mod fin. gen.
 Vale $\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{0\}$, e in particolare $M \rightarrow \hat{M}$ è iniettiva.

DIMOSTRAZIONE

Sia $N := \bigcap_{n \geq 0} I^n M$: è un A -sottomod di M

Per Artin-Rees, $\exists n_0$ t.c. $I^{n+r} M \cap N = I^n (I^r M \cap N) \quad \forall r \geq 0$,
 cioè $N = I^n N$: prendo $r=1$, osservo $I \subseteq P$ e applico Nakayama



Lunghezza

Def. A anello commut, M A -mod

- M è semplice se non ammette sottomoduli non banali ($M \neq \{0\}$)
- M è di lunghezza finita se è Noetheriano e Artiniano.

Equivalentemente, se esiste una filtrazione finita

$(*) \ 0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \dots \subsetneq M_n = M \quad \text{t.c.} \ M_i/M_{i-1} \text{ sia semplice}$

- In tal caso, $(*)$ si dice serie di composizione per M e i quozienti semplici M_i/M_{i-1} si dicono fattori di composizione o costituenti di Jordan-Hölder.

teorema di Jordan-Hölder

Date due serie di composizione

$$0 = M_0 \subsetneq M_1 \subsetneq \dots \subsetneq M_m = M$$

$$0 = N_0 \subsetneq N_1 \subsetneq \dots \subsetneq N_n = M$$

si ha $m=n$ e $\{M_i/M_{i-1}\} = \{N_j/N_{j-1}\}$ (insiemi con molteplicità)

esempio

- $A = K$ campo: lunghezza = dimensione
- $A = \mathbb{Z}$, gruppi abeliani finiti. I moduli semplici sono $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ per p primo

$$0 \subsetneq \underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}} \subsetneq \underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}}$$

$$0 \subsetneq \underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}} \subsetneq \underbrace{\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}}_{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}$$

$$|M| = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r} \rightarrow \ell(M) = e_1 + \dots + e_r$$

- $A = K[x]$. Un A -mod M è un K -spazio vettoriale + un endomorfismo come K -s.v.
 $K[x] \rightarrow \text{End}(M)$

$M = K^2$, x agisce tramite $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$0 \subsetneq \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle \subsetneq M$, entrambi i quozienti sono K con l'endom. identità

- Gruppi non abeliani. se G è un grp finito, c'è

$\{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft G_2 \triangleleft \dots \triangleleft G_n = G$ con G_i/G_{i-1} semplici

Vale JH: la lunghezza e i quozienti G_i/G_{i-1} non dipendono dalla serie di composizione.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione sul minimo m f.c. M ammetta una serie di decomposizione di lungh. m

(• $m=0$: $M=\{0\}$)

• $m=1$: $0=M_0 \neq M_1=M$ con $M=M_1/M_0$ semplice

Ogni serie deve essere $\{0\} \neq M$

• $m \geq 2$: distinguo due casi : $M_{m-1} = N_{m-1}$ o $M_{m-1} \neq N_{m-1}$

Se $M_{m-1} = N_{m-1}$,

$0=M_0 \neq M_1 \neq \dots \neq M_{m-1}$ è una serie di comp. per M_{m-1} di lung $m-1$

Allora per hp. ind.

$0=N_0 \neq N_1 \neq \dots \neq N_{m-1}=M_{m-1}$ deve valere $n-1=m-1 \Rightarrow n=m$

e avere $\{N_j/N_{j-1}\}_{j=1, \dots, m-1} \cup \{M/N_{m-1}\} = \{M_i/M_{i-1}\}_{i=1, \dots, m-1} \cup \{M/M_{m-1}\}$

Se $M_{m-1} \neq N_{m-1}$: Sia M_{m-1} sia N_{m-1} sono sottomoduli massimali,

quindi $M_{m-1} + N_{m-1} = M$. Sia $K = M_{m-1} \cap N_{m-1}$

$M/M_{m-1} = M_{m-1} + N_{m-1} / M_{m-1} \cong N_{m-1} / M_{m-1} \cap N_{m-1} = N_{m-1} / K$

e similmente $M/N_{m-1} \cong M_{m-1} / K$

Inoltre N_{m-1}/K e M_{m-1}/K sono semplici

Fissiamo una serie di composiz. per K

$0=K_0 \neq K_1 \neq \dots \neq K_r=K \neq M_{m-1}$

$0=K_0 \neq K_1 \neq \dots \neq K_r=K \neq N_{m-1}$

Siccome M_{m-1} ammette una serie di compos. di lungh. $m-1$,

tutte hanno lungh. $m-1 \Rightarrow r+1=m-1 \Rightarrow r=m-2$

Guardando la seconda, è una serie di lungh. $r+1=m-1$

Riapplicando l'ipotesi induttiva, $n-1=r+1=m-1 \Rightarrow m=n$

Ogni serie di comp. per N_{m-1} ha gli stessi fattori semplici,

che sono $K_1/K_0, K_2/K_1, \dots, K_r/K_{r-1}, N_{m-1}/K$.

Allo stesso modo, quelli di M_{m-1} sono

$K_1/K_0, K_2/K_1, \dots, K_r/K_{r-1}, M_{m-1}/K$

Le due serie di comp. hanno fattori semplici

$K_1/K_0, K_2/K_1, \dots, K_r/K_{r-1}, M_{m-1}/K, M/N_{m-1}$

$K_1/K_0, K_2/K_1, \dots, K_r/K_{r-1}, N_{m-1}/K, M/N_{m-1}$



COROLLARIO

(1) Per ogni succ. esatta corta di moduli di lungh. finita

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

allora $\ell(M_2) = \ell(M_1) + \ell(M_3)$

(2) In particolare, $\ell(M_1 \oplus M_2) = \ell(M_1) + \ell(M_2)$

(3) Per ogni succ. esatta lunga

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow M_n \longrightarrow 0$$

$$\text{vale } \sum_{i=1}^n (-1)^i \ell(M_i) = 0$$

DIMOSTRAZIONE

- (1) Sia $0 = M_{1,0} \subsetneq \dots \subsetneq M_{1,l_1} = M_1$ una serie di comp. per M_1
 $0 = M_{3,0} \subsetneq \dots \subsetneq M_{3,l_3} = M_3$ una serie di comp. per M_3
 Allora $0 = M_{1,0} \subsetneq \dots \subsetneq M_{1,l_1} = \pi^{-1}(M_{3,0}) \subsetneq \pi^{-1}(M_{3,1}) \subsetneq \dots \subsetneq \pi^{-1}(M_{3,l_3})$
 è una serie di comp. per M_2 di lung. $l_1 + l_3$

(2) $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_1 \oplus M_2 \rightarrow M_2 \rightarrow 0$ è esatta

(3) $0 \rightarrow M_1 \xrightarrow{\alpha_1} M_2 \xrightarrow{\alpha_2} M_3 \xrightarrow{\alpha_3} M_4 \rightarrow 0$

$$\begin{cases} 0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \xrightarrow{\alpha_2} \alpha_2(M_2) \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow \alpha_2(M_2) \rightarrow M_3 \rightarrow M_4 \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} & l(M_1) - l(M_2) + l(\alpha_2(M_2)) = 0 \\ & -l(\alpha_2(M_2)) + l(M_3) - l(M_4) = 0 \end{aligned}$$

Per induzione su n



Funzioni di Hilbert

$A = \bigoplus_{n \geq 0} A_n$ anello graduato Noetheriano, con A_0 artiniano

- esempio • $A = K[x_1, \dots, x_n]$ con la gradazione standard
 • $(B, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano, $\mathfrak{q}$ ideale $\mathfrak{m}$ -primario (cioè $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$)

$\text{Gr}_{\mathfrak{q}} B = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{q}^n / \mathfrak{q}^{n+1}$

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{q}^a / \mathfrak{q}^{a+1} \times \mathfrak{q}^b / \mathfrak{q}^{b+1} & \xrightarrow{\quad} & \mathfrak{q}^{a+b} / \mathfrak{q}^{a+b+1} \\ \mathfrak{q}^a \times \mathfrak{q}^b & \xrightarrow{\quad} & \mathfrak{q}^{a+b} & \xrightarrow{\quad} & \mathfrak{q}^{a+b} / \mathfrak{q}^{a+b+1} \\ & \searrow & \mathfrak{q}^a / \mathfrak{q}^{a+1} \times \mathfrak{q}^b / \mathfrak{q}^{b+1} & \nearrow & \end{array}$$

$\text{Gr}_{\mathfrak{q}} B$ è Noetheriano

e $(\text{Gr}_{\mathfrak{q}} B)_0 = B/\mathfrak{q}$ è Artiniano perché è locale e $\mathfrak{m}/\mathfrak{q}$ è nilpotente

$$l(B/\mathfrak{q}^n) = l(B/\mathfrak{q}) + l(\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2) + \dots + l(\mathfrak{q}^{n-1}/\mathfrak{q}^n)$$

def Sia $M = \bigoplus M_n$ un modulo fin. gen. su $A = \bigoplus A_n$
 la serie di Poincaré di M è

$$P_M(t) = \sum_{n \geq 0} l_{A_0}(M_n) t^n \in \mathbb{Z}[[t]]$$

ex Ogni singolo M_n è un A_0 -mod fin. gen.

ES Ideali massimali delle $\mathbb{Z}$ -alg. fin.gen.

(i) Sia K un campo e una $\mathbb{Z}$ -alg. fin.gen. Allora $\text{char} K > 0$

- Per assurdo, sia $\text{char} K = 0$ e $\varphi: \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n] \rightarrow K$
 Siccome $\text{char} K = 0$, $\mathbb{Q} \subset K$ e quindi φ si estende a $\psi: \mathbb{Q}[t_1, \dots, t_n] \rightarrow K$
 Per Zariski, siccome K è $\mathbb{Q}$ -alg. fin.gen, $K/\mathbb{Q}$ è un'est. finita.
 Siano $\alpha_i = \varphi(t_i)$: generano $K/\mathbb{Q}$ e sono algebrici su $\mathbb{Q}$, quindi ci sono
 dei polinomi $p_i \in \mathbb{Q}[x]$ monici e irr., t.c. $p_i(\alpha_i) = 0$
 Ho un n° finito di polinomi con un n° finito di coefficienti
 $\Rightarrow \exists N \geq 1$ t.c. $N p_i \in \mathbb{Z}[x] \forall i \Rightarrow p_i \in \mathbb{Z}[\frac{1}{N}][x]$
 Quindi $K = \mathbb{Z}[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, e ogni α_i è intero su $\mathbb{Z}[\frac{1}{N}] \subseteq \mathbb{Q} \subseteq K$
 $\underbrace{\mathbb{Z}[\frac{1}{N}] \subseteq \mathbb{Q}}_{\text{intera}}$
 $\Rightarrow 1 \leq \dim \mathbb{Z}[\frac{1}{N}] = \dim K = 0 \quad \text{!}$
 fin.gen come algebra
 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset K \quad \uparrow ?$
 fin.gen come algebra

Lemma di Artin-Tate

Siano $R \subset A \subset B$ con

- R Noetheriano
- B fin.gen. come R -algebra
- B fin.gen. come A -modulo.

Allora A è fin.gen. come R -algebra.

DIMOSTRAZIONE

Fissiamo generatori $\{b_j\}_{j=1, \dots, m}$ di B come A -modulo
 e generatori $\{c_i\}$ di B come R -algebra

Scriviamo $C_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} b_j$ con $a_{ij} \in A$

$b_i b_j = \sum_{k=1}^m a_{ijk} b_k$ con $a_{ijk} \in A$ (incluso $i=j$)

Sia $A' := R[a_{ij}, a_{ijk}] \subseteq A$ è un R -alg. fin.gen.

Considero poi $B' := \frac{A'[T_1, \dots, T_m]}{(T_i T_j - \sum_{k=1}^m a_{ijk} T_k / c_{i,j})} \ni \bar{1}, \bar{T}_1, \dots, \bar{T}_m$

$$\begin{array}{ccccc} R & \hookrightarrow & A & \hookrightarrow & B \\ & & \uparrow & & \uparrow \text{(da dim)} \\ & & A' & \hookrightarrow & B' \end{array}$$

B' è un'est. finita (da dim)

Per induzione sul grado del polinomio, si mostra che ogni elemento

$P(\bar{T}_1, \dots, \bar{T}_m) \in B'$ si scrive come comb. lineare di $\bar{1}, \bar{T}_1, \dots, \bar{T}_m$ a coeff. in A'

$\Rightarrow B'/A'$ est. finita

Posso definire $\psi: B' \rightarrow B$, che è surgettiva perché
 $\bar{T}_i \mapsto b_i$

L'immagine di ψ è una A' -algebra ($\Rightarrow R$ -algebra) che contiene $b_1, \dots, b_m$

e quindi anche $C_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} b_j$

$\Rightarrow \text{Im} \psi \supseteq R[C_1, \dots, C_n] = B$

Segue che B è un A' -mod fin.gen e A' è Noetheriano (perché R -alg. fin.gen.)

$A' \subset A \subset B \Rightarrow A$ è fin.gen come A' -modulo
 fin.gen come modulo

$\Rightarrow A$ è fin.gen. come A' -alg

$\Rightarrow A$ è fin.gen. come R -alg.



esempio

$$K \subset K[x, y^n | n \geq 1] \subset K[x, y]$$

R
A
B

A non è una R-alg. fin. gen.: se lo fosse, da certi polinomi

$$p_1(x, y), \dots, p_r(x, y)$$

$$q_i(x, y, x y^2, \dots, x y^n)$$

$$N = \max(n_1, \dots, n_r) \rightarrow p_i = q_i(x, y, \dots, x y^N)$$

Ma i generatori sono $x, y, x y^2, \dots, x y^N$

Però $x y^{N+1} \notin K[x, y, x y^2, \dots, x y^N]$

Se fosse $x y^{N+1} = q(x, y, \dots, x y^N)$, almeno un monomio di q , valutato in $(x, y, \dots, x y^N)$ dovrebbe essere $x y^{N+1}$, ma nessun monomio funziona

Oss A non è neppure Noetheriano: ha la catena

$$(x, y) \subsetneq (x, y, x y^2) \subsetneq \dots \subsetneq (x, y, x y^2, \dots, x y^n) \subsetneq \dots$$

(ii) Sia M un id. mass. di una $\mathbb{Z}$ -alg. fin. gen. A.

Allora A/M è un campo finito

Per (i), $\text{char } A/M = p > 0$

$M' = \text{Ker}(Z[t_1, \dots, t_n] \twoheadrightarrow A \twoheadrightarrow A/M)$ è un id. mass. di $Z[t_1, \dots, t_n]$ per corrisp.

Siccome $p=0$ in $Z[t_1, \dots, t_n]/M' \cong A/M$, $p \in M'$

Gli ideali di $Z[t_1, \dots, t_n]$ che contengono (p) sono in biiez.

con quelli di $Z[t_1, \dots, t_n]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t_1, \dots, t_n]$

In particolare, A/M è un quoziente di $\mathbb{F}_p[t_1, \dots, t_n]$

$\Rightarrow A/M$ è una $\mathbb{F}_p$ -alg. fin. gen. e campo

$\Rightarrow A/M$ è un'est. finita di $\mathbb{F}_p \Rightarrow$ è un campo finito

Oss $B = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ è un anello regolare

• $\dim B = n+1$

• id. mass. sono l'immagine inversa in $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ di un

id. mass. in $\mathbb{F}_p[x_1, \dots, x_n] \supset \overline{M} = (\overline{f}_1, \dots, \overline{f}_n)$

$$\text{ht } \overline{M} = n$$

$\Rightarrow m = (p, f_1, \dots, f_n)$ ha $n+1$ generatori

$$\text{ht } m = n+1$$

che è più forte che essere regolare

ES $A = \mathbb{R}[x,y]/(x^2+y^2+1)$ è PID ma non euclideo

SOL Per assurdo, sia Euclideo con grado d.

- Gli sl. di grado min. sono le unità $A^\times$
- Fra gli sl. di grado $>$ del minimo, questo "2° minimo" è realizzato da un sl. irr. p
- Divisione euclidea per p : $\forall a \in A \exists q \in A, r \in A \text{ t.c. } a = pq + r$
con $r = 0$ o $\deg(r) < \deg(p)$

La condizione $\deg(r) < \deg(p)$ vuol dire $r \in A^\times$

$\Rightarrow A/(p) = \text{immagine di } A^\times \cup \{0\} \text{ in } A/(p)$

- Abbiamo visto $p = ax + by + c$ con $(a,b) \neq (0,0)$
e che $A/(p) \cong \mathbb{C}$
- Per concludere, basta mostrare che $A^\times = \mathbb{R}^\times$, perché $\mathbb{R}^\times \cup \{0\}$ non si surietta su $\mathbb{C}$
- Prendiamo $u = u_0 + y u_1 \in A^\times$

$$u_0(x) + y u_1(x)$$

$$\begin{array}{c} A \\ | \\ \mathbb{R}[x] \end{array}$$

Osservo che $\sigma : A \rightarrow A$ ("generatore del grp. Galois")
 $\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\sigma} & -x \\ y & \xrightarrow{\sigma} & -y \end{array}$

è un automorfismo. Allora $\sigma(u) \in A^\times$

quindi $u \cdot \sigma(u) = N_{A/(p)/\mathbb{R}(x)}(u) \in A^\times$

$$(u_0 + y u_1)(u_0 - y u_1) = u_0^2 - y^2 u_1^2 = \underbrace{u_0^2 - (-x^2 - 1) u_1^2}_{\nu(x)} \in A^\times$$

$$\nu(x) \cdot [u_0(x) + y u_1(x)] = 1 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \nu(x) \cdot u_0(x) = 1 \\ \nu(x) \cdot y u_1(x) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \nu(x) \in \mathbb{R}[x]^\times = \mathbb{R}^\times \quad \Rightarrow \quad \deg u_0 = 0, u_1 = 0$$

Quozienti di anelli graduati

$A = \bigoplus A_n$ graduato.

Un ideale $I \triangleleft A$ si dice omogeneo se $I = \bigoplus_{i \geq 0} (I \cap A_i)$
o equivalentemente se è generato da el. omogenei.

In tal caso

$$A/I \cong \bigoplus A_n/I \cong \bigoplus (A_n / A_n \cap I) \text{ è graduato.}$$

se chiamo $\bar{A}_n = A_n / A_n \cap I$, ho $A/I \cong \bigoplus \bar{A}_n$

e $\bar{A}_n \times \bar{A}_m \longrightarrow \bar{A}_{n+m}$ (si controlla risalendo in A)

teorema Sia $A_+ = (x_1, \dots, x_s)$ l'ideale positivo, con gli x_i omogenei, $\deg x_i = k_i$.

Esiste $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ t.c.

$$p_M(t) = \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^s (1-t^{k_i})} \in \mathbb{Z}[[t]]$$

Dimostrazione

Per induzione su s

• $s=0$. $A_+ = (0)$, cioè $A = A_0$ è Artiniano

$M = \bigoplus M_n$ è fin gen su $A = A_0$ da el. omogenei

Se questi generatori sono tutti di grado $\leq N$, $M = \bigoplus_{n \leq N} M_n$

$\Rightarrow p_M(t) \in \mathbb{Z}[t]$ è una somma finita

• $s \geq 1$: consideriamo la mult. per x_s :

(*) $0 \longrightarrow K_n \longrightarrow M_n \xrightarrow{\cdot x_s} M_{n+k_s} \longrightarrow L_{n+k_s} \longrightarrow 0$ è esatta
con $K_n = \text{Ker}(\cdot x_s)$ e $L_{n+k_s} = \text{Coker}(\cdot x_s)$, che sono A_0 -moduli

Sia $K = \bigoplus_{n \geq 0} K_n$ e $L = \bigoplus_{n \geq 0} L_n$, che sono A -moduli

Da (*), otteniamo $\forall n$

$$\ell(K_n) t^{n+k_s} + \ell(M_{n+k_s}) t^{n+k_s} = \ell(M_n) t^{n+k_s} + \ell(L_{n+k_s}) t^{n+k_s}$$

Sommando su $n \in \mathbb{Z}$ trovo:

$$t^{k_s} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} \ell(K_n) t^n \right) + p_M(t) = t^{k_s} p_M(t) + p_L(t)$$

$$\Rightarrow (1-t^{k_s}) p_M(t) = p_L(t) - t^{k_s} p_K(t)$$

Oss chiave • $x_s \in 0$ su K , è 0 su L perché

$$\underbrace{M_{n+k_s} / x_s M_n}_{L_{n+k_s}} \xrightarrow{\cdot x_s} \underbrace{M_{n+2k_s} / x_s M_{n+k_s}}_{L_{n+2k_s}} \text{ è zero}$$

Quindi K, L sono $A/(x_s)$ -moduli, che è graduato con ideale positivo gen da $(x_1, \dots, x_{s-1})$.

Per induzione, $p_L(t) = \frac{f_L(t)}{\prod_{i=1}^{s-1} (1-t^{k_i})}$ e $p_K(t) = \frac{f_K(t)}{\prod_{i=1}^{s-1} (1-t^{k_i})}$ dove $f_L, f_K \in \mathbb{Z}[t]$

$$p_M(t) = \frac{p_L(t) - t^{k_s} p_K(t)}{(1-t^{k_s})} = \frac{f_M(t)}{\prod_{i=1}^s (1-t^{k_i})}$$



def $d(M)$ = ordine di polo di $p_M(t)$ in $t=1$ =
 $= \inf \{ k \geq 0 \mid \lim_{t \rightarrow 1} (1-t)^k p_M(t) < +\infty \}$

Oss $d(M) \leq s$: infatti

$$\lim_{t \rightarrow 1} (1-t)^s \frac{f(t)}{\prod_{i=1}^s (1-t^{k_i})} < +\infty$$

Oss Se $x_s \in A_{k_s}$ è un el. omogeneo di grado k_s e se $\cdot x_s$ è iniettiva, allora

$$P_M(t) = P_{M/x_s M}(t) / (1-t^{k_s})$$

corollario A graduato Noetheriano, A Artiniano,
 M A-mod graduato fin gen, $A_+ = (x_1, \dots, x_s)$, $\deg x_i = 1$.
 Allora la funzione $n \mapsto l(M_n)$ coincide, per $n \gg 1$,
 con un polinomio di grado $d(M)-1$.

DIMOSTRAZIONE

$$\sum_{n \geq 0} l(M_n) t^n = \frac{f(t)}{(1-t)^{d(M)}} = \frac{g(t)}{(1-t)^{d(M)}} \quad \text{dove } g(t) \in \mathbb{Z}[t], g(1) \neq 0$$

Sceivo $g(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_k t^k$

Sviluppiamo $(1-t)^{-d(M)} = \sum_{n \geq 0} \binom{-d}{n} (-t)^n$

$$\binom{-d}{n} = \frac{(-d)(-d-1)\dots(-d-(n-1))}{n!} = (-1)^n \frac{(d+n-1)\dots(d)}{n!} = (-1)^n \binom{d+n-1}{n} = (-1)^n \binom{d+n-1}{d-1}$$

Quindi $\sum_{n \geq 0} l(M_n) t^n = (a_0 + \dots + a_k t^k) \sum_{n \geq 0} \binom{d+n-1}{d-1} t^n$

$$l(M_n) = \sum_{h=0}^n a_h \binom{d+n-h-1}{d-1} = \sum_{h=0}^n a_h \binom{d+n-h-1}{d-1}$$

 è un polinomio, di grado $\leq d-1$.

Per controllare che il grado sia $d-1$, calcoliamo il coeff. di n^{d-1} :

$$\sum_{h=0}^k a_h \cdot \frac{1}{(d-1)!} = \frac{1}{(d-1)!} g(1) \neq 0$$

□

Oss Il polinomio che dà $l(M_n)$ è a coefficienti razionali

def. La funzione di Hilbert di M è la funzione $n \mapsto l(M_n)$
 Il polinomio di Hilbert è il polinomio che coincide con questa per n grande.

Oss $\text{Int}(\mathbb{Z}) = \{p(x) \in \mathbb{Q}[x] \mid p(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}\}$

I polinomi $\binom{x}{n}$ sono in $\text{Int}(\mathbb{Z})$:

$\text{Int}(\mathbb{Z})$ è uno $\mathbb{Z}$ -modulo libero e $\{\binom{x}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ ne è una base.

• Sia $\Delta: \text{Int}(\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Int}(\mathbb{Z})$ la derivata discreta

$$p(x) \mapsto p(x+1) - p(x)$$

che fa calcolare il grado di 1

$$\Delta \binom{x}{n} = \binom{x+1}{n} - \binom{x}{n} = \binom{x}{n-1} \quad \text{se } x \in \mathbb{N}$$

• $\{\binom{x}{n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ sono una base di $\mathbb{Q}[x]$, perché sono triangolari rispetto alle potenze di x

• $p(x) \in \text{Int}(\mathbb{Z})$: $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i \binom{x}{i}$, $a_i \in \mathbb{Q}$
 $a_0 = p(0) \in \mathbb{Z}$

$$\Delta p(x) = \sum_{i=0}^n a_i \Delta \binom{x}{i} = \sum_{i=0}^n a_i \binom{x}{i-1} \quad a_1 = (\Delta p(x))(0) \in \mathbb{Z}$$

e in generale $a_i = (\Delta^i p(x))(0) \in \mathbb{Z}$

• Trovare formula per $\sum_{i=0}^n i^2 = q(n)$

$$q(n+1) - q(n) = (n+1)^2$$

$$(\Delta q)(n) = (n+1)^2 = 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{1} + \binom{n}{0}$$

$$\Rightarrow q(n) = 2\binom{n}{3} + 3\binom{n}{2} + \binom{n}{1}$$

Teoria della dimensione via Funzioni di Hilbert

Sia $(A, \mathfrak{m})$ Noetheriano Locale, $\mathfrak{q}$ un ideale $\mathfrak{m}$ -primario
(cioè $\sqrt{\mathfrak{q}} = \mathfrak{m}$, cioè $\exists r \geq 0$ t.c. $\mathfrak{q}^r \subseteq \mathfrak{m}$, cioè $\mathfrak{m}$ è minimale sopra $\mathfrak{q}$)
 $\text{Gr}_{\mathfrak{m}} A = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$, $\text{Gr}_{\mathfrak{q}} A = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{q}^n / \mathfrak{q}^{n+1}$

Ci interessa $\ell(A/\mathfrak{m}^n) = \ell(A/\mathfrak{m}) + \ell(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) + \dots + \ell(\mathfrak{m}^{n-1}/\mathfrak{m}^n)$

Oss $0 \longrightarrow \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow A / \mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow A / \mathfrak{m}^n \longrightarrow 0$ esatta
 $\ell(A/\mathfrak{m}^{n+1}) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) + \ell(\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1})$

Come mai le lunghezze sono finite?

- $A/\mathfrak{m} = A\text{-mod}$ su cui $\mathfrak{m}$ agisce banalmente
 $= (A/\mathfrak{m})\text{-mod}$: come $(A/\mathfrak{m})\text{-mod}$ è di lungh. finita
 $\{\text{sotto-} A\text{-mod di } A/\mathfrak{m}\} = \{\text{sotto-} A/\mathfrak{m}\text{-mod di } A/\mathfrak{m}\}$
- $\mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$ è un $A\text{-mod}$ su cui $\mathfrak{m}$ agisce banalmente
 $= A/\mathfrak{m}\text{-mod} = A/\mathfrak{m}\text{-sp. vett. di dim. finita}$
 perché $\mathfrak{m}^n$ ha un n° finito di generatori

teorema

Sia M un $A\text{-mod}$ fin.gen e $\{M^n\}$ una $\mathfrak{q}$ -filtrazione stabile su M .

(i) $M/\mathfrak{m}^n$ ha lunghezza finita $\forall n$

(ii) $\ell(M/\mathfrak{m}^n)$ coincide con un polinomio $g(n)$ per ogni $n \gg 0$
e $\deg g(n) \leq \# \text{generatori dell'ideale } \mathfrak{q}$.

(iii) Il grado e il termine di testa di g non dipendono dalla filtrazione.

DIMOSTRAZIONE

$\text{Gr}(M) := \bigoplus_{n \geq 0} M^n / M^{n+1}$ è un mod graduato su $\text{Gr}_{\mathfrak{q}} A$
(perché M^n è una $\mathfrak{q}$ -filtrazione)

Vediamo che è fin.gen: siccome la filtrazione è stabile,

$\exists n_0$ t.c. $M^{n_0+r} = \mathfrak{q}^r M^{n_0} \forall r \geq 0$ e in particolare

$$\mathfrak{q}^r \times M^{n_0} \longrightarrow M^{n_0+r} \longrightarrow M^{n_0+r} / M^{n_0+r+1}$$

ed inoltre $\mathfrak{q}^{r+1} \cdot M^{n_0} = M^{n_0+r+1}$ va in 0

$$\mathfrak{q}^r \cdot M^{n_0+1} = M^{n_0+r+1} \text{ va in } 0$$

$$\rightarrow \text{ho } \mathfrak{q}^r / \mathfrak{q}^{r+1} \times M^{n_0} / M^{n_0+1} \longrightarrow M^{n_0+r} / M^{n_0+r+1}$$

$$\Rightarrow \bigoplus_{n \geq n_0} M^n / M^{n+1} \text{ genera } \bigoplus_{n \geq 0} M^n / M^{n+1} \text{ su } \text{Gr}_{\mathfrak{q}} A$$

Ogni M^n è fin.gen (sottomod di M , fin.gen su A Noeth).

Le classi dei generatori di $M^0, M^1, \dots, M^{n_0}$ in $M^0/\mathfrak{m}, M^1/\mathfrak{m}^2, \dots, M^{n_0}/\mathfrak{m}^{n_0+1}$
sono una famiglia finita di generatori del modulo $\text{Gr}(M)$

Inoltre M^n / M^{n+1} è fin.gen su $A/\mathfrak{q}$ (ex),

quindi è fin.gen su $\text{Gr}_{\mathfrak{q}} A$

- (i) $\ell(M/\mu^n) = \ell(M/\mu^n) + \ell(M'/\mu^n) + \dots + \ell(M^{n-1}/\mu^n)$ è finita
 (ii) $\ell(M/\mu^n) = \sum_{i=0}^{n-1} \ell(M^i/\mu^{i+1})$, e sappiamo che $\exists i_0$ e un polinomio $h(i) \in \mathbb{Q}[i]$ t.c. $\ell(M^i/\mu^{i+1}) = h(i), \forall i \geq i_0$

Allora $\ell(M/\mu^n) = \underbrace{\sum_{i=0}^{i_0-1} (\ell(M^i/\mu^{i+1}) - h(i))}_{\text{costante in } n} + \sum_{i=i_0}^{n-1} h(i)$
 è un pol. in n con $\deg = \deg h + 1$

$\deg h \leq (\# \text{generatori dell'ideale positivo di } \text{Gr}_q(A)) - 1$

$\text{Gr}_q A = A/q \oplus q/q^2 \oplus q^2/q^3 \oplus \dots$

$(\text{Gr}_q(A))_+$, generato da q/q^2 : per generare q/q^2 bastano le classi dei generatori di q (di grado 1)

$\Rightarrow \ell(M/\mu^n)$ è un polinomio per $n \geq i_0$ di grado $\leq \# \text{generatori di } q$

- (iii) Sia N^n un'altra filtrazione stabile: $\exists n_0$ t.c.

$M^{r+2n_0} \subseteq N^{r+n_0} \subseteq M^r$

$\Rightarrow M/\mu^n \leftarrow M/N^{r+n_0} \leftarrow M/\mu^{r+2n_0}$

$\ell(M/\mu^n) \leq \ell(M/N^{r+n_0}) \leq \ell(M/\mu^{r+2n_0})$

$g_M(r) \leq g_M(r+n_0) \leq g_M(r+2n_0)$

Dividendo per $r \deg g_M$, passando al limite per $r \rightarrow +\infty$

coeff. dom di $g_M \leq \text{coeff. dom di } g_N \leq \text{coeff. dom di } g_M$

□

ES A dominio Noetheriano, $p \in A$ primo.

Se $A[\frac{1}{p}] = B$ è un UFD, allora A è un UFD.

SOL Sia $x \in A$ irriducibile. Vediamo che $x \in B$ è un'unità o irr.

Se $\frac{x}{1} = \frac{a}{p^m} \cdot \frac{b}{p^m} \Rightarrow p^{2m} x = ab \Rightarrow p|a : a = pa_1$

$\frac{x}{1} = \frac{a_1}{p^{m-1}} \cdot \frac{b}{p^m}, \dots$ Iterando, trovo $x = a_n b_m$ con $a_n, b_m \in A$

$\Rightarrow a_n$ o b_m è un'unità in A

• Se $\frac{x}{1}$ è un'unità: $\exists \frac{a}{p^n}$ t.c. $x \frac{a}{p^n} = 1$ in $B \Rightarrow p^n = xa$

Se $p|x$, allora p e x sono associati

Se $p \nmid x$, $a = pa_1 \Rightarrow p^{n-1} = a_1 x \Rightarrow 1 = a_n x$

$\Rightarrow x$ è associato a $p \Rightarrow x$ è primo

• Se $\frac{x}{1}$ è irr $\Rightarrow \frac{x}{1}$ è primo: $ab = xc$ in A

$\xRightarrow{B \text{ UFD}} \frac{x}{1} | \frac{a}{1} \text{ o } \frac{x}{1} | \frac{b}{1} : \frac{a}{1} = \frac{x}{1} \cdot \frac{b}{p^n} \quad p^n a = x b$
 $\Rightarrow a = b'x$

□

ES A K -alg fin gen dominio, $f \in A \setminus \{0\}$

$\dim A[\frac{1}{f}] = \dim A$

SOL ($\Leftarrow$): La Localizzazione per' solo far cambiare la dimensione

($\Rightarrow$): Sia m un ideale massimale di A , $(0) \subsetneq \dots \subsetneq P_{\dim A} = m$

Corrisponde a una catena in $A[\frac{1}{f}] \iff m \cap S = \emptyset \iff f \notin m$

$\bigcap_{m \in \text{Spec} \text{Max } A} m = (0)$

Modo 2 $A[\frac{1}{f}] \simeq \frac{A[t]}{(tf-1)}$ è una K -alg fin gen.

$\dim(\frac{A[t]}{(tf-1)}) = \dim A[t] - \text{ht}(tf-1) = \dim A + 1 - 1 = \dim A$

□

ES $A = \frac{\mathbb{Q}[x, y, z]}{(x^2 + y^3 - z^7)}$, $\mathfrak{M} = (x, y, z)$ $A_{\mathfrak{M}}$
 Mostrare che $A_{\mathfrak{M}}$ è dominio Noetheriano locale UFD, ma non è regolare
 [In dim 1. UFD $\Rightarrow$ Int. chiuso $\Rightarrow$ DVR $\Rightarrow$ regolare]

$$\dim A = \dim \mathbb{Q}[x, y, z] - \text{ht}(x^2 + y^3 - z^7) = 3 - 1 = 2$$

Oss $(x^2 + y^3 - z^7)$ è un ideale primo

$p_1(x, y, z) p_2(x, y, z)$ non è possibile

$\dim A_{\mathfrak{M}} = 2$: in A , una catena massimale da (0) a $\mathfrak{M}$ ha lung = $\dim A = 2$

$$\frac{\mathfrak{M} A_{\mathfrak{M}}}{(\mathfrak{M} A_{\mathfrak{M}})^2} \simeq \frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{M}^2} \simeq \frac{(x, y, z) + (x^2 + y^3 - z^7)}{(x, y, z)^2 + (x^2 + y^3 - z^7)} = \frac{(x, y, z)}{(x, y, z)^2} \text{ ha } \dim_{\mathbb{Q}} = 3, \text{ con base } x, y, z$$

Quindi $A_{\mathfrak{M}}$ non è regolare

UFD: basta mostrare A UFD

Applico Nagata con elemento $p = z$

$$A/(z) \simeq \mathbb{Q}[x, y, z]/(x^2 + y^3 - z^7, z) \simeq \mathbb{Q}[x, y]/(x^2 + y^3) \text{ è un dominio}$$

Nagata: basta dim che $A[\frac{1}{z}]$ è UFD

$$a := \frac{x}{z^2}, b := \frac{y}{z^2} \quad a^2 + b^3 = \frac{x^2 + y^3}{z^6} = \frac{z^7}{z^6} = z$$

$$A = \mathbb{Q}[x, y, z] \subseteq \mathbb{Q}[a, b] \subseteq A[\frac{1}{z}]$$

$$\Rightarrow A[\frac{1}{z}] \subseteq \mathbb{Q}[a, b][\frac{1}{z}] \subseteq A[\frac{1}{z}] \Rightarrow A[\frac{1}{z}] = \mathbb{Q}[a, b][\frac{1}{z}]$$

$$\text{Oss } \dim A[\frac{1}{z}] = \dim A = 2 = \dim \mathbb{Q}[a, b][\frac{1}{z}] = \dim \mathbb{Q}[a, b] = \text{trdeg } \mathbb{Q}(a, b)$$

$$\Rightarrow a, b \text{ sono alg. indipendenti} \Rightarrow \mathbb{Q}[a, b] \text{ è l'anello dei pol. in 2 variabili}$$

$$\Rightarrow A[\frac{1}{z}] \simeq \mathbb{Q}[a, b][\frac{1}{z}] \text{ è UFD}$$

ES $(A, \mathfrak{M})$ locale, $I \triangleleft A$ ideale proprio, $k = A/\mathfrak{M}$, $N = \mathfrak{M}/I$

C'è una successione esatta di k -spazi vettoriali

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{M}^2 + I}{\mathfrak{M}^2} \longrightarrow \frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{M}^2} \xrightarrow{\pi} \frac{N}{N^2} \longrightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{M} & \twoheadrightarrow & N & \twoheadrightarrow & N/N^2 \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \\ & & \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 & & \end{array}$$

$$x \in \mathfrak{M}, \forall x \in \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 \quad \pi(x) = 0 \iff \pi(x) \in N^2, \text{ cioè } \exists i \in I, m \in \mathfrak{M}^2: x = m + i \quad \square$$

$$A = K[x_1, \dots, x_n] \quad \mathfrak{M} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \quad a_i \in K$$

$$I = (F_1, \dots, F_r), I \subset \mathfrak{M} \quad \frac{\mathfrak{M}^2 + I}{\mathfrak{M}^2} \text{ è il ssp di } \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2 \text{ generato da } \left\{ \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a) (x_j - a_j) \right\}_{i=1, \dots, r} =: G$$

$f \in I$. Posso scrivere $f = \sum_{j=1}^n b_j (x_j - a_j) + \text{qualcosa in } \mathfrak{M}^2$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = b_i + 0$$

$$f = g_1 F_1 + \dots + g_r F_r = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(a) (x_j - a_j) + (\text{cosa in } \mathfrak{M}^2) \in \text{Span } G$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} (g_i F_i) = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a) F_i(a) + g_i(a) \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a)$$

$$\text{Quindi: } \dim \left(\frac{\mathfrak{M}^2 + I}{\mathfrak{M}^2} \right) = \text{mk} \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a) \right)$$

Giuseppe Jacobiano $A = k[x_1, \dots, x_n]$, $q = (a_1, \dots, a_n) \in K^n$

$\mathfrak{M} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n) \supseteq I$ ideale. Sia $B = (A/I)_{\mathfrak{M}}$

Scriviamo $I = (F_1, \dots, F_r)$, $J := (\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a))$

$d = \dim B$, $r = \text{rk } J$. Sono equivalenti:

(1) B regolare

(2) $r = n - d$

(3) $r \geq n - d$

DIMOSTRAZIONE

$$(A/I)_{\mathfrak{M}} \simeq A_{\mathfrak{M}}/IA_{\mathfrak{M}} \quad \mathfrak{M}A_{\mathfrak{M}}/(\mathfrak{M}A_{\mathfrak{M}})^2 \simeq \mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2$$

Sia N l'ideale massimale di $(A/I)_{\mathfrak{M}} \simeq A_{\mathfrak{M}}/IA_{\mathfrak{M}}$

$$0 \longrightarrow \frac{IA_{\mathfrak{M}} + (\mathfrak{M}A_{\mathfrak{M}})^2}{(\mathfrak{M}A_{\mathfrak{M}})^2} \longrightarrow \frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{M}^2} \xrightarrow{\pi} \frac{N}{N^2} \longrightarrow 0$$

$$\frac{(I + \mathfrak{M}^2)A_{\mathfrak{M}}}{\mathfrak{M}^2 A_{\mathfrak{M}}} \simeq S^{-1}\left(\frac{I + \mathfrak{M}^2}{\mathfrak{M}^2}\right) = \frac{I + \mathfrak{M}^2}{\mathfrak{M}^2}$$

$$0 \longrightarrow \frac{\mathfrak{M}^2 + I}{\mathfrak{M}^2} \longrightarrow \frac{\mathfrak{M}}{\mathfrak{M}^2} \longrightarrow \frac{N}{N^2} \longrightarrow 0$$

$$n = \dim(\mathfrak{M}/\mathfrak{M}^2) = \dim \frac{I + \mathfrak{M}^2}{\mathfrak{M}^2} + \dim \frac{N}{N^2} \\ = r + \min \text{ n° generatori di } N$$

$$n - r = \min \text{ n° generatori di } N \geq \text{ht } N = \dim(A/I)_{\mathfrak{M}} = d$$

$$\text{Regolare} \iff e \text{ un} \iff n - r = d$$

$r \leq n - d$ vale sempre



corollario

$M = A$, q ideale $\mathfrak{m}$ -primario, $\mathfrak{M}^n = q^n$.

Allora esiste un polinomio $\chi_q(n)$ t.c. $\ell(A/q^n) = \chi_q(n) \quad \forall n \gg 0$
e $\deg \chi_q(n) \leq \# \text{ generatori di } q$.

Lemma

Il grado di $\chi_q(n)$ non dipende dalla scelta dell'ideale $\mathfrak{m}$ -primario q .

DIMOSTRAZIONE

Basta mostrare che $\deg \chi_q = \deg \chi_{\mathfrak{M}}$

Dato q , $\exists r \geq 1$ t.c. $\mathfrak{M}^r \subseteq q \subseteq \mathfrak{M} \implies \mathfrak{M}^{rn} \subseteq q^n \subseteq \mathfrak{M}^n$

$$A/\mathfrak{M}^{rn} \longrightarrow A/q^n \longrightarrow A/\mathfrak{M}^n$$

$$\implies \ell(A/\mathfrak{M}^{rn}) \geq \ell(A/q^n) \geq \ell(A/\mathfrak{M}^n) \quad \forall n \geq 1$$

Quindi $\forall n \gg 0$ ho $\chi_{\mathfrak{M}}(rn) \geq \chi_q(n) \geq \chi_{\mathfrak{M}}(n)$

Siccome $\chi_{\mathfrak{M}}(n)$ e $\chi_{\mathfrak{M}}(rn)$ sono dello stesso grado, anche $\chi_q(n)$ ha lo stesso grado.



Quindi al momento per un anello locale Noetheriano $(A, \mathfrak{m})$ abbiamo 3 invarianti.

- $\dim A = \dim_{K(A)} A$
- $\mathcal{S}(A) = \min \text{ n° generatori di un ideale } \mathfrak{m}\text{-primario } \mathfrak{q} = \min_{\mathfrak{q} \text{ m-prim.}} (\min \text{ n° generatori di } \mathfrak{q})$
- $d(A) = \deg \chi_{\mathfrak{m}} (= d(\text{Gr}_{\mathfrak{m}} A))$

**Teorema
fondamentale della
dimensione**

$$\dim A = \mathcal{S}(A) = d(A)$$

- Oss.
- Il Teo dell'altezza dice $\dim A = \text{ht } \mathfrak{m} \leq \mathcal{S}(A)$
 - Il viceversa del Teo dell'altezza dice $\mathcal{S}(A) \leq \dim A$
 - $d(A) \leq \mathcal{S}(A)$: $\deg \chi_{\mathfrak{m}} = \deg \chi_{\mathfrak{q}} \leq \# \text{ gen. di } \mathfrak{q} \forall \mathfrak{q} \Rightarrow d(A) \leq \mathcal{S}(A)$
 - Se dimostriamo che $\dim A \leq d(A)$, abbiamo finito

Lemma $(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano, $x \in A$ non divisore di 0.
Allora $d(A/(x)) \leq d(A) - 1$

DIMOSTRAZIONE

Sia $B := A/(x)$. Come A -moduli, abbiamo:

$$0 \longrightarrow \frac{(x) + \mathfrak{m}^n}{\mathfrak{m}^n} \longrightarrow A/\mathfrak{m}^n \longrightarrow B/\mathfrak{m}_B^n \longrightarrow 0 \text{ esatta}$$

$$\downarrow \cong$$

$$\frac{(x)}{(x) \cap \mathfrak{m}^n}$$

$$\bullet \ell_B(B/\mathfrak{m}_B^n) = \ell_A(B/\mathfrak{m}_B^n)$$

$$\bullet \text{ Come } A\text{-modulo, } (x) \cong A \quad 0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x} (x) \rightarrow 0$$

perché x non è divisore di 0

Inoltre, per Artin-Rees la retrazione $(x) \cap \mathfrak{m}^n$ è una retrazione $\mathfrak{m}$ -stabile
 $\Rightarrow \ell((x)/(x) \cap \mathfrak{m}^n)$ per $n \gg 0$ è un polinomio, il cui grado e termine di testa
 coincidono con quelli del polinomio $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n)$

Dalla seq. esatta,

$$\ell_B(B/\mathfrak{m}_B^n) = \ell_A(B/\mathfrak{m}_B^n) = \ell(A/\mathfrak{m}^n) - \ell((x)/(x) \cap \mathfrak{m}^n) \text{ è un pol. di grado}$$

strettamente minore di $\ell(A/\mathfrak{m}^n)$ perché i termini
di testa si cancellano

$$\Rightarrow d(B) \leq d(A) - 1$$

□

Oss $(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano, $\pi: A \rightarrow A'$ un quoziente, $\mathfrak{m}' = \pi(\mathfrak{m})$.
 e $d(A') \leq d(A)$

DIMOSTRAZIONE

$$A/\mathfrak{m}^n \longrightarrow A'/\mathfrak{m}'^n \longrightarrow 0$$

$$\ell_{A'}(A'/\mathfrak{m}'^n) = \ell_A(A'/\mathfrak{m}'^n) \leq \ell_A(A/\mathfrak{m}^n)$$

Per $n \gg 0$, questo dà $d(A') \leq d(A)$.

proposizione $\dim A \leq d(A)$

DIMOSTRAZIONE

Per induzione su $d(A)$

• $d(A) = 0$: $\ell(A/\mathfrak{m}^n)$ è costante per $n \gg 0$

$$0 \rightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \rightarrow A/\mathfrak{m}^{n+1} \rightarrow A/\mathfrak{m}^n \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \ell(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \ell(A/\mathfrak{m}^{n+1}) - \ell(A/\mathfrak{m}^n) = 0 \text{ per } n \gg 0$$

$$\Rightarrow \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = (0) \Rightarrow \mathfrak{m} \cdot \mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^n \xrightarrow{\text{Nak}} \mathfrak{m}^n = (0)$$

per cui A è Artiniano e quindi di $\dim. 0$

• $d(A) \geq 1$: Prendiamo $P_0 \subsetneq P_1 \subsetneq \dots \subsetneq P_r$ catena di primi in A con $r = \dim A$

Se $r=0$, ok $\dim A < d(A)$

Se $r \geq 1$, scelgo $x \in P_1 \setminus P_0$. Sia $A' = A/P_0$: è un dominio

e $d(A') \leq d(A)$. La classe di x in A' non è un divisore di 0

$$\Rightarrow d(A'/(x)) \leq d(A') - 1 \leq d(A) - 1$$

Per hp. induttiva, $\dim(A'/(x)) \leq d(A) - 1$


D'altra parte, la catena $P_1/(x) \subsetneq \dots \subsetneq P_r/(x)$ mostra

che $\dim(A'/(x)) \geq r-1$

$$\Rightarrow r-1 \leq d(A) - 1 \Rightarrow r \leq d(A)$$

□

esempio combinatorio



$$v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$$

Consideriamo le combinazioni $a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3$, con $a_i \in \mathbb{N}$

"Quanti sono" questi punti? Specificamente, quanti ce ne sono con $x+y=n$, con $n \gg 0$?

$$A = K[x^2, y^3, xy] \cong K[x, y]$$

Contare i punti con somma delle coord = n è come calcolare $\dim A_n$

$$\phi: K[u, v, w] \rightarrow A$$

$$\begin{matrix} u & \mapsto & x^2 \\ v & \mapsto & y^3 \\ w & \mapsto & xy \end{matrix}$$

$$\bullet \text{Ker } \phi \ni -u^3 v^2 + w^6$$

• $\text{Ker } \phi$ è primo, perché ϕ è sng e A è un dominio

$$\bullet \dim A = \dim K[u, v, w] - \text{ht Ker } \phi$$

$$2 = 3 - \text{ht Ker } \phi \Rightarrow \text{ht Ker } \phi = 1$$

$$\dim A = \text{trdeg Frac } A = \text{trdeg } K(x, y) = 2$$

Ora $\text{Ker } \phi \cong (w^6 - u^3 v^2)$ primo

$$\Rightarrow A \cong K[u, v, w] / (w^6 - u^3 v^2) =: B \quad \deg u = 2 \quad \deg v = 3 \quad \deg w = 2$$

$$P_B(t) = \sum_{n \geq 0} \ell(B_n) t^n$$

$$P_B(t) = \frac{1}{(1-t^{\deg u})} P_{B/uB}(t) \quad \text{se } [u] \text{ è iniettiva}$$

$$= \frac{1}{(1-t^2)} P_{K[u, w]/(w^6)}(t) = \frac{1}{(1-t^2)(1-t^3)} P_{K[w]/(w^6)}(t)$$

$$= \frac{1}{(1-t^2)(1-t^3)} (1+t^2+t^4+t^6+t^8+t^{10}) = \frac{1-t^{12}}{(1-t^2)^2(1-t^3)}$$

$$= (1+t^2+\dots+t^{10}) \sum_{n \geq 0} r(n) t^n = \sum_{n \geq 0} s(n) t^n$$

$$\frac{1}{1-t^2} = 1+t^2+t^4+\dots \quad \frac{1}{1-t^3} = 1+t^3+t^6+\dots$$

$$r(n) = \# \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid 2a+3b=n\}$$

$$s(n) = r(n) + r(n-2) + \dots + r(n-10)$$

$|r(n) - \frac{n}{6}|$ è limitato $\Rightarrow s(n) = n + \text{un termine limitato}$

Funzioni di Hilbert e varietà proiettive

def Sia I un ideale omogeneo di $A := K[x_0, \dots, x_n]$. Poniamo

$$h_I(d) = \dim_K (A/I)_d$$

Oss $(B, M) = K[x_0, \dots, x_n]_{(x_0, \dots, x_n)}$

$$\text{Gr}_M B = \bigoplus_{d \geq 0} \frac{(x_0, \dots, x_n)^d}{(x_0, \dots, x_n)^{d+1}} \simeq K[x_0, \dots, x_n] \quad (\text{hanno le stesse parti graduate in ogni grado})$$

Oss Sia $F \in K[x_0, \dots, x_n]$ un polinomio omogeneo

$$V_P(F) = \{ [x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}^n(K) \mid F(x_0, \dots, x_n) = 0 \}$$

 Più generalmente, se I è ideale omogeneo

$$V_P(I) = \{ [x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{P}^n(K) \mid F(P) = 0 \quad \forall F \in I \text{ omogeneo} \}$$

 Viceversa, dato $V \subseteq \mathbb{P}^n(K)$, il corrispondente ideale è

$$I(V) = \{ F \in K[x_0, \dots, x_n] \mid F(\tilde{P}) = 0 \quad \forall \tilde{P} \in K^{n+1} \text{ che rappresenta } P \in V \}$$

 è un ideale omogeneo (K infinito)

esempio Funzione di Hilbert di un punto
 $V = \{ [a_0 : \dots : a_n] \} \longrightarrow I(V) = (a_i x_j - a_j x_i \mid i, j)$
 A meno di una trasformazione proiettiva, posso portare
 P in $[1 : \dots : 0] \longrightarrow I = (x_1, \dots, x_n)$
 Algebricamente: se A_{ij} è una matrice invertibile in $M_{n+1}(K)$
 $x_i \longmapsto \sum_j A_{ij} x_j$ è un automorfismo di $K[x_0, \dots, x_n]$

$$\dim_K (K[x_0, \dots, x_n] / (a_i x_j - a_j x_i)_d) = \dim_K \left(\frac{K[x_0, \dots, x_n]_d}{(x_1, \dots, x_n)_d} \right) = 1 \quad \forall d$$

Oss (additività) I, J omogenei. Vale

$$h_{I+J} + h_{I \cap J} = h_I + h_J$$

$$h_L(d) = \dim K[x_0, \dots, x_n]_d - \dim L_d$$

 Basta dim che $\dim(I+J)_d + \dim(I \cap J)_d = \dim I_d + \dim J_d$
 che è Grassmann

Oss $V(I+J) = V(I) \cap V(J)$

$$V_P(I) = \emptyset \iff \exists m \geq 0 \text{ t.c. } (x_0, \dots, x_n)^m \subseteq I$$

 Infatti $V_P(I) = \emptyset \iff V(I) = \{ (0, \dots, 0) \} \iff V(I) \subseteq V((x_0, \dots, x_n))$

$$\iff \sqrt{I} \supseteq (x_0, \dots, x_n)$$

Conseguenza: Se $P_1, \dots, P_n$, $I = V((P_1, \dots, P_n))$

$$h_I(d) = n \quad \forall d \gg 0$$

$$h_{(x_0, \dots, x_n)^m}(d) = 0 \quad \forall d \gg 0 :$$

$$\dim \frac{K[x_0, \dots, x_n]_d}{(x_0, \dots, x_n)^m_d} = 0 \quad \text{per } d > m$$

Per induzione dall'additività trovo $h_I(d) = n \quad \forall d \gg 0$

Funzione di Hilbert di 3 o 6 punti

• Sia $V = \{P_1, P_2, P_3\}$, $I = I(V)$ nel piano

$$h_I(1) = \dim \frac{K[x_0, x_1, x_2]_1}{I_1} = \begin{cases} 3 & \text{se } P_1, P_2, P_3 \text{ non allineati} \\ 2 & \text{se } P_1, P_2, P_3 \text{ allineati} \end{cases}$$

• Sia $V = \{P_1, \dots, P_6\}$, $P_1, \dots, P_6$ non allineati, $I = I(V)$

$$\dim \frac{K[x_0, x_1, x_2]_2}{I_2} = \begin{cases} 6 & \text{se i punti non stanno su una conica} \\ 5 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

esempio $h_{(0)} = ? \quad V = \mathbb{P}^n \rightarrow I = (0)$

$$h_I(d) = \dim K[x_0, \dots, x_n]_d$$

$$x_0^{e_0} \dots x_n^{e_n} \text{ con } e_0 + \dots + e_n = d, e_i \geq 0 \rightarrow \binom{n+d}{n}$$

$$h_I(d) = \dim K[x_0, \dots, x_n]_d = \frac{1}{1-d} \dim K[x_0, \dots, x_n]_d = \dots = \frac{1}{(1-d)^{n+1}}$$

$$\text{Questo dimostra } \sum_{d \geq 0} \binom{n+d}{n} t^d = \frac{1}{(1-t)^{n+1}}$$

$C := K[x_0, \dots, x_n]$. I ideale primo omogeneo $\cong (x_0, \dots, x_n)$

$A = (C/I)_{(x_0, \dots, x_n)} = m$ $B = C/I$ dominio

$$\dim A = d(A) = d(\operatorname{Gr}_m A) = \operatorname{ht}_B(x_0, \dots, x_n) = \dim B$$

$$\dim V_{\mathbb{P}}(I) = \dim V(I) - 1 = \dim B - 1$$

$$h_I(d) = \dim_K \frac{K[x_0, \dots, x_n]_d}{I_d}$$

$$\frac{\mathcal{M}_A^d}{\mathcal{M}_A^{d+1}} \simeq \frac{\mathcal{M}_B^d}{\mathcal{M}_B^{d+1}} \simeq \frac{(x_0, \dots, x_n)^d + I}{(x_0, \dots, x_n)^{d+1} + I}$$

$$(x_0, \dots, x_n)^d + I = I_0 \oplus I_1 \oplus \dots \oplus I_{d-1} \oplus C_d \oplus C_{d+1} \oplus \dots$$

Quozientando per $(x_0, \dots, x_n)^{d+1} + I$, ottengo

$$\frac{(x_0, \dots, x_n)^d + I}{(x_0, \dots, x_n)^{d+1} + I} \simeq C_d / I_d = \frac{K[x_0, \dots, x_n]_d}{I_d}$$

$$\text{Per d grande, } \dim_K \left(\frac{\mathcal{M}_A^d}{\mathcal{M}_A^{d+1}} \right) = h_I(d) = \text{pol. di grado } \dim A - 1 = \dim B - 1 = \dim V_{\mathbb{P}}(I)$$

ES(P4) Sia F un polinomio omogeneo, I un ideale omogeneo in $K[x_0, \dots, x_n]$

Supponiamo che $\exists d_0$ t.c. $\forall d \geq d_0 \quad \forall G \in K[x_0, \dots, x_n]_d$ vale $FG \in I \Rightarrow G \in I$.

Allora $\forall d \gg 0 \quad h_{I+(F)}(d) = h_I(d) - h_I(d - \deg F)$

FATTO $K = \mathbb{K}$, I t.c. $V_{\mathbb{P}}(I) \neq \emptyset$. Allora $\exists F \in K[x_0, \dots, x_n]_d$ che soddisfa l'ipotesi dell'es. precedente.

esempio Pirella con una varietà $V = V_P(I)$.
 Usando i fatti sopra, trovo F lineare t.c.
 $h_{I+(F)}(d) = h_I(d) - h_I(d-1)$ per $d \gg 0$
 Se $h_I(d) \sim C \frac{d^{\dim V}}{(\dim V)!}$, $C \in \mathbb{N}_{>0}$

$$h_{I+(F)}(d) \sim C \frac{d^{\dim V - 1}}{(\dim V - 1)!}$$

$$\Delta\left(\frac{x^k}{k!}\right) = \frac{(x+1)^k - x^k}{k!} = \frac{kx^{k-1} + O(x^{k-2})}{k!} = \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}$$

Ripetendo questo procedimento $(\dim V)$ volte, trovo
 $h_{I+(F_1, \dots, F_{\dim V})}(d) = C$

def. Questo C si chiama il grado di V ed è
 il numero* di punti che trovo intersecando con $(\dim V)$ iperpiani generici
 * con molteplicità

ES K campo, $\mathfrak{m}$ id. massimale di $K[x_1, \dots, x_n] = A$
 Allora $\exists (x_1, \dots, x_n) \in \bar{K}^n$ t.c. $\mathfrak{m} = \{p \in A \mid p(x_1, \dots, x_n) = 0\}$

sol Considero $B = \bar{K}[x_1, \dots, x_n]$ e $A \subseteq B$

Ci basterebbe sapere che ogni ideale massimale di A
 è l'intersezione fra A e un id. massimale di B .

Per going over / going down, basta che $A \subseteq B$ sia un'est. intera

Perciò devo mostrare che ogni $p(x_1, \dots, x_n) \in B$ è intero su A

Osservo che $\bar{K}[x_1, \dots, x_n] = \bigcup_{\substack{F/K \text{ est. finita} \\ F \subseteq \bar{K}}} F[x_1, \dots, x_n]$

L'insieme $C := \{q \in F[x_1, \dots, x_n] \mid q \text{ è intero su } A\}$ è un sottanello di $F[x_1, \dots, x_n]$

• $x_1, \dots, x_n \in C$ perché stanno in A

• $f \in F$: allora $f \in C$, perché f è radice di un polinomio monico a coeff in K
 e quindi a coeff in A

$\Rightarrow C = F[x_1, \dots, x_n] \Rightarrow B/A$ intera

□

Oss $\prod_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(F/K)} (t - \mathfrak{p}(x_1, \dots, x_n)) \in A[t]$

ES p primo. L'anello $\mathbb{Z}_p[x, y]$ è regolare.

SOL Classifichiamo gli ideali massimali.

Sia m massimale. Considero $m \cap \mathbb{Z}_p$: è un primo di $\mathbb{Z}_p$, cioè (0) e (p) .

• Se $m \cap \mathbb{Z}_p = (p)$, m corrisponde a un ideale di $\mathbb{Z}_p/(p)[x, y] = \mathbb{F}_p[x, y]$.

$\bar{m}$ è generato da 2 elementi e che $\text{ht } \bar{m} = 2$

$\Rightarrow m = (p, f_1, f_2)$, $\text{ht } m \leq 3$

In effetti $\text{ht } m = 3$: prendo una catena $\bar{p}_0 \subsetneq \bar{p}_1 \subsetneq \bar{m}$ e per corrispondenza ho $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, f_3) \subsetneq m$

• Se $m \cap \mathbb{Z}_p = (0)$: m non incontra $\{p^n : n \in \mathbb{N}\}$

corrisponde a un ideale di $S^{-1}\mathbb{Z}_p[x, y] = \mathbb{Q}_p[x, y]$

$m\mathbb{Q}_p[x, y] = (g_1, g_2)$ di altezza 2


Una catena dentro m è in corrisp. con una catena contenuta in $m\mathbb{Q}_p[x, y]$

da localizz. $\mathbb{Z}_p[x, y]_m = \mathbb{Q}_p[x, y]_m$ ha dim 2

e il suo ideale è generato da 2 elementi

Oss Gli ideali del 2° tipo esistono: $(1 - px, y)$

$$\mathbb{Z}_p[x, y]/(1 - px, y) \simeq \mathbb{Z}_p[x]/(1 - px) \simeq \mathbb{Z}_p\left[\frac{1}{p}\right] = \mathbb{Q}_p$$



ES A regolare, $x \in A$. Supponiamo che $\forall m$ id. massimale di A valga $x \notin m^2$. Allora $A/(x)$ è regolare.

SOL Sia $\bar{m}$ un massimale di $A/(x)$; corrisponde ad un massimale m di A , $x \in m$.

Considero $m/m^2 \ni \bar{x} \neq 0$. Completo $\bar{x}$ ad una base di m/m^2 come

A/m -spazio vett.: $\bar{x} = \bar{x}_1, \dots, \bar{x}_r$, con $r = \dim_{A/m} m/m^2 = \text{ht } m$

Allora $m = (x, x_2, \dots, x_r)$ e questo è un sist. reg. di parametri

$A_m/(x)A_m$ è regolare

$$\underset{12}{(A/(x))_{\bar{m}}}$$

Questo vale $\forall \bar{m}$, quindi $A/(x)$ è regolare. □

Es $A = \mathbb{Z}_p[x,y]/(y^2 - x^5 - p)$ $B = \mathbb{Z}_p[x,y]/(y^2 - x^5 - p^2)$

Mostriamo che B non è regolare, ma A sì

Cominciamo da B : basta esibire $\mathfrak{m} \subset B$ massimale con

$$\dim B_{\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) > \text{ht } \mathfrak{m}$$

$$\mathfrak{m} = (p, x, y) \quad \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \simeq \frac{\mathfrak{m} + (y^2 - x^5 - p^2)}{\mathfrak{m}^2 + (y^2 - x^5 - p^2)} = \frac{(x, y, p)}{(x, y, p)^2} \quad \text{ha dim 3 su } B_{\mathfrak{m}} \simeq \mathbb{F}_p$$

|| siccome $\mathbb{Z}_p[x,y]$ è regolare
 $\text{ht}_{\mathbb{Z}_p[x,y]}(x, y, p) = 3$

D'altro canto $\text{ht } \mathfrak{m} \leq \dim B \leq 2$, perché le catene in B corrispondono a catene in $\mathbb{Z}_p[x,y]$ che non partono da 0.

Oss $d(A/(x)) \leq d(A) - 1$ per A dominio, $x \neq 0$

Ora prendiamo A . Per l'es precedente, basta mostrare che $f = y^2 - x^5 - p \notin \mathfrak{m}^2 \forall \mathfrak{m}$ massimale.

• Caso $\mathfrak{m} \nsubseteq p$, cioè $\mathfrak{m}$ corrisponde ad un massimale di $\mathbb{Q}_p[x,y]$

$$\text{Se } f \in \mathfrak{m}^2 \text{ in } \mathbb{Z}_p[x,y] \implies f \in (\mathfrak{m}(\mathbb{Q}_p[x,y]))^2$$

$$\text{So che } \mathfrak{m}(\mathbb{Q}_p[x,y]) = \{g \in \mathbb{Q}_p[x,y] : g(\alpha, \beta) = 0\} \text{ per un certo } (\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{Q}_p}^2$$

$$\implies f \in (x - \alpha, y - \beta)^2 \text{ in } \overline{\mathbb{Q}_p}[x,y]$$

Oss $\mathfrak{m}(\overline{\mathbb{Q}_p}[x,y])$ non è necess. massimale: ad es.
 $p=3, \mathfrak{m} = (x^2+1, y) \rightsquigarrow \mathfrak{m}(\overline{\mathbb{Q}_3}[x,y]) \neq (x+i, y)$

$$\text{Si avrebbe } f(\alpha, \beta) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(\alpha, \beta) = \frac{\partial f}{\partial y}(\alpha, \beta)$$

perché questa proprietà è vera per ogni pol. del tipo
 $(x - \alpha)^2 g(x, y), (y - \beta)^2 g(x, y), (x - \alpha)(y - \beta) g(x, y).$

Quindi (α, β) risolvono

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^5 - p = 0 \\ -5\alpha^4 = 0 \\ 2\beta = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 0 \\ p = 0 \end{cases} \quad \text{assurdo}$$

• Caso $p \in \mathfrak{m}$: $\mathfrak{m} = (p, f_1, f_2) \longleftrightarrow \overline{\mathfrak{m}}$ mass. di $\mathbb{F}_p[x,y]$

$$f \in \mathfrak{m}^2 \longrightarrow f \bmod p \in \overline{\mathfrak{m}}^2 \quad \overline{\mathfrak{m}} = \{g(x,y) : g(\alpha, \beta) = 0\} \text{ per } (\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{F}_p}^2$$

$$\implies f \in (x - \alpha, y - \beta)^2 \text{ in } \mathbb{F}_p[x,y]$$

Allora α, β soddisfa

$$\begin{cases} \beta^2 - \alpha^5 - p = 0 \\ -5\alpha^4 = 0 \\ 2\beta = 0 \end{cases} \quad \text{in } \overline{\mathbb{F}_p}$$

$$\text{Se } p \neq 2, 5 \rightarrow \begin{cases} \beta^2 - \alpha^5 = 0 \\ \alpha = 0 \\ \beta = 0 \end{cases}$$

$$p=2 \rightarrow \begin{cases} \alpha^4 = 0 \rightarrow \alpha = 0 \\ \beta^2 = 0 \rightarrow \beta = 0 \end{cases}$$

$$p=5 \rightarrow \begin{cases} \alpha^5 = 0 \rightarrow \alpha = 0 \\ 2\beta = 0 \rightarrow \beta = 0 \end{cases}$$

SE $\exists \mathbb{P} \in \mathbb{M}^2$, allora $\mathbb{M} \ni p$ e $\overline{\mathbb{M}} = (x, y) \Rightarrow \mathbb{M} = (x, y, p)$

Basta chiedersi se $\mathbb{P} = y^2 - x^5 - p \in \mathbb{M}^2$, cioè $p \in \mathbb{M}^2$ impossibile

ES Completamenti e regolarità

Sia $(A, \mathbb{M})$ locale Noeth., $\hat{A}$ il completamento $\mathbb{M}$ -adico.

(1) $\dim \hat{A} = \dim A$

(2) A regolare $\Rightarrow \hat{A}$ regolare

SOL $\hat{A}$ Noetheriano, locale, con id. massimale $\mathbb{M}\hat{A}$

$$\hat{A}/\hat{\mathbb{M}} \cong \widehat{A/\mathbb{M}} = A/\mathbb{M} \text{ campo e } \hat{\mathbb{M}} = \mathbb{M}\hat{A}$$

$d(A) = \text{grado del pol. che coincide con } n \mapsto Q(A/\mathbb{M}^n) \text{ per } n \gg 0$

$d(A)-1 = \text{grado del pol. che coincide con } n \mapsto Q(\mathbb{M}^n/\mathbb{M}^{n+1}) \text{ per } n \gg 0$

$$d(\hat{A})-1 = \quad // \quad n \mapsto \begin{matrix} Q_{\hat{A}}(\hat{\mathbb{M}}^n/\hat{\mathbb{M}}^{n+1}) \\ \downarrow \text{ } l_{\hat{A}/\hat{\mathbb{M}}}(\hat{\mathbb{M}}^n/\hat{\mathbb{M}}^{n+1}) \end{matrix} \quad \swarrow \text{ } l_{A/\mathbb{M}}(\mathbb{M}^n/\mathbb{M}^{n+1})$$

Osserviamo che $\hat{\mathbb{M}}^n/\hat{\mathbb{M}}^{n+1} \cong \widehat{\mathbb{M}^n/\mathbb{M}^{n+1}} = \mathbb{M}^n/\mathbb{M}^{n+1}$

$$(2) A \text{ regolare} \iff \dim_{A/\mathbb{M}} \mathbb{M}/\mathbb{M}^2 = \dim A \iff \dim_{\hat{A}/\hat{\mathbb{M}}} \hat{\mathbb{M}}/\hat{\mathbb{M}}^2 = \dim \hat{A} \iff \hat{A} \text{ regolare}$$

TEORIA DELLE CATEGORIE

Def. Una categoria $\mathcal{C}$ consiste dei dati seguenti:



- una classe $\text{ob}(\mathcal{C})$ o $|\mathcal{C}|$ di "oggetti"
- una classe $\text{Mor}(\mathcal{C})$ di "freccie"
- due funzioni "classe" dominio e codominio (source e target)
 $s: \text{Mor}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{ob}(\mathcal{C}) \quad t: \text{Mor}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{ob}(\mathcal{C})$
- per ogni 3 oggetti $A, B, C \in \text{ob}(\mathcal{C})$, posto
 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) = \{ f \in \text{Mor}(\mathcal{C}) \mid s(f) = A, t(f) = B \}$,
 un'operazione binaria
 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, C) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, C)$
 $f \quad g \quad \longmapsto g \circ f$

che soddisfanno

- (i) associatività: $\forall A, B, C, D \in \text{ob}(\mathcal{C}), \forall f: A \rightarrow B, \forall g: B \rightarrow C, \forall h: C \rightarrow D$
 vale $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
- (ii) identità: $\forall A \in \text{ob}(\mathcal{C}), \exists \text{id}_A \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$ che è l'identità
 bilatera per la composizione

esempio

- (Set) : $\text{ob} = \text{insiemi}, \text{Mor} = \text{funzioni}$
- Ab : $\text{ob} = \text{gruppi abeliani}, \text{Mor} = \text{omomorfismi di gruppi abeliani}$
- Vect_K
- Mod_R
- Top^* : $\text{ob} = \text{coppie } (X, p), X \text{ sp. top. e } p \in X$
 $\text{Mor}: f: (X, p) \rightarrow (Y, q) \text{ continua t.c. } f(p) = q$
- Categoria con $|\text{ob}(\mathcal{C})| = 1$
 (e localmente piccola) $\Rightarrow$ monaide $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$
- Poset : $(X, \leq)$ un insieme parz. ordinato
 "Categoria poset" se $|\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)| \leq 1$
- Grafi diretti



- Categoria opposta: $\mathcal{C} = (|\mathcal{C}|, \text{Mor}(\mathcal{C})) \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}} = (|\mathcal{C}|, \text{Mor}(\mathcal{C})^{\text{op}})$
 $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(A, B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$

Def. Siano $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ due categorie.

Un funtore (covariante) $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ è dato di:

- una funzione classe $F: |\mathcal{C}| \rightarrow |\mathcal{D}|$
- $\forall A, B \in |\mathcal{C}|, F: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$
 tale che

(i) $\forall A, F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$

(ii) $\forall A, B, C \in |\mathcal{C}|, \forall f: A \rightarrow B, \forall g: B \rightarrow C$ vale
 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$

esempio

$$\begin{aligned} \pi_1: \text{Top}^* &\longrightarrow \text{Grp} \\ (X, p) &\longmapsto \pi_1(X, p) \\ f: (X, p) \longrightarrow (Y, q) &\longmapsto \pi_1(f): \pi_1(X, p) \longrightarrow \pi_1(Y, q) \\ [f] &\longmapsto [f \circ \gamma] \end{aligned}$$

• Funtori dimenticanti

• localizzazione: R anello, S parte moltiplicativa

$$\begin{aligned} S^{-1}: \text{Mod}_R &\longrightarrow \text{Mod}_{S^{-1}R} \\ M &\longmapsto S^{-1}M \\ f: M \longrightarrow N &\longmapsto S^{-1}f: S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}N \\ \frac{M}{S} &\longmapsto \frac{f(M)}{S} \end{aligned}$$

• Dualità: $\text{Vect}_K \longrightarrow \text{Vect}_K$

$$\begin{aligned} V &\longmapsto V^* = \text{Hom}(V, K) \\ f: V \longrightarrow W &\longmapsto f^*: W^* \longrightarrow V^* \\ \psi &\longmapsto \psi \circ f \end{aligned}$$

$$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

diventa un funtore $\text{Vect}_K \longrightarrow \text{Vect}_K^{\text{op}}$

def. Un funtore contravariante $F: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$
è un funtore $\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}^{\text{op}}$

esempio $\text{Spec}: \text{Ring} \longrightarrow \text{Top}$ è un funtore contravariante

I nostri funtori preferiti

R anello, Mod_R . Fissiamo $M \in \text{Mod}_R$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ } - \otimes M: \text{Mod}_R &\longrightarrow \text{Mod}_R \\ N &\longmapsto N \otimes_R M \\ f: N_1 \longrightarrow N_2 &\longmapsto f \otimes \text{id}: N_1 \otimes M \longrightarrow N_2 \otimes M \\ \bullet \text{ } \text{Hom}_R(-, M): \text{Mod}_R &\longrightarrow \text{Mod}_R^{\text{op}} \\ N &\longmapsto \text{Hom}_R(N, M) \\ f: N_1 \longrightarrow N_2 &\longmapsto \text{Hom}(N_2, M) \longrightarrow \text{Hom}(N_1, M) \\ \phi &\longmapsto \phi \circ f \\ \bullet \text{ } \text{Hom}_R(M, -): \text{Mod}_R &\longrightarrow \text{Mod}_R \\ N &\longmapsto \text{Hom}_R(M, N) \\ f: N_1 \longrightarrow N_2 &\longmapsto \text{Hom}(M, N_1) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}(M, N_2) \\ \phi &\longmapsto f \circ \phi \end{aligned}$$

Diagrammi

Un diagramma in una categoria $\mathcal{C}$ è un fontore

$$F: J \longrightarrow \mathcal{C} \quad (\text{è detto di "forma" } J)$$

Il diagramma è commutativo se J è una categoria poset.


Coni Un cono sul diagramma $F: J \longrightarrow \mathcal{C}$ è un oggetto $X \in \mathcal{C}$ con mappe $f_j: X \longrightarrow F(j) \quad \forall j \in |J|$ e tale che

$$F(f) \circ f_{j_1} = f_{j_2} \quad \forall f \in \text{Hom}_J(j_1, j_2)$$


Un cono è detto un (o) limite di un diagramma se

$\forall (T, g_i)$ cono sullo stesso diagramma $\exists! h: T \longrightarrow X$ che fa commutare tutto: $g_i = f_i \circ h$
Tale limite è unico.

esempio • In Set



• In Set



$$g \circ g' = f \circ f'$$


$$L = X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid g(x) = f(y)\}$$

• X sp. top, $\text{Open } X = \text{categoria degli aperti}$
 $|\text{Open } X| = \text{aperti di } X, \text{ Mor}_{\text{Open } X}(U, V) = \begin{cases} \{i: U \hookrightarrow V\} & \text{se } U \subseteq V \\ \emptyset & \text{altrimenti} \end{cases}$




$$L = U \cap V$$

• In Ab, prendiamo un sistema inverso di gruppi
(= diagramma di forma $\bullet \longleftarrow \bullet \longleftarrow \bullet \longleftarrow \dots$)




$$G = \varprojlim G_i$$

• In Ab



$$L = \text{Ker } f$$

Colimiti



esempio • In $\mathbf{Ab}$

$$\begin{array}{ccc} & Y & \\ & \downarrow i_2 & \\ X & \xrightarrow{u} & X \oplus Y \end{array}$$

Oss $\text{Hom}(A, \pi X_i) = \pi \text{Hom}(A, X_i)$
 $\text{Hom}(\oplus X_i, A) = \prod \text{Hom}(X_i, A)$

Aggiunti

$\mathcal{C}, \mathcal{D}$ categorie, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}, G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$

Deciamo che F e G sono aggiunti l'uno all'altro se vale

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(A), B) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, G(B)) \quad \forall A \in \text{ob}(\mathcal{C}) \quad \forall B \in \text{ob}(\mathcal{D})$$

F si dice aggiunto sinistro, G è l'aggiunto destro.

teorema Gli aggiunti sinistri commutano con i colimiti.
Gli aggiunti destri commutano con i limiti.

esempio $\text{Hom}_{\mathbf{R}}(M_1 \otimes N, M_2) = \text{Hom}_{\mathbf{R}}(M_1, \text{Hom}(N, M_2))$

I funtori $F = - \otimes N$ e $G = \text{Hom}(N, -)$ sono aggiunti

Caso speciale del Teo: $- \otimes N$ commuta con i Coker

$$M_1/M_2 \otimes N = M_1 \otimes N / M_2 \otimes N \quad [\otimes N \text{ è esatto a dx}]$$

$\text{Hom}(N, -)$ è aggiunto dx $\Rightarrow$ commuta con i Ker $\Rightarrow$ è esatto a sx.

ALGEBRA OMOLOGICA

DEF. R, S due anelli, $F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ funtore. Si dice che F è

- additivo se $\forall A, B \in \text{Mod}_R$ la mappa $\text{Hom}_R(A, B) \rightarrow \text{Hom}_S(F(A), F(B))$ è un omomorfismo di gruppi abeliani (Tutti i nostri funtori saranno additivi)
- esatto a sx se per ogni successione esatta $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ la successione $0 \rightarrow F(M_1) \rightarrow F(M_2) \rightarrow F(M_3)$ è esatta.

Oss $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_2/M_1 \rightarrow 0$
 $0 \rightarrow F(M_1) \rightarrow F(M_2) \rightarrow F(M_2/M_1)$

- esatto a dx se per ogni $M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow 0$ esatta la successione $F(M_1) \rightarrow F(M_2) \rightarrow 0$ è esatta
- esatto se è esatto sia a dx sia a sx

DEF. Un modulo $M \in \text{Mod}_R$ è

- piatto se $- \otimes M$ è esatto [a sx]
- proiettivo se $\text{Hom}_R(M, -)$ è esatto [a dx]
- iniettivo se $\text{Hom}_R(-, M)$ è esatto [a dx]
- libero se è isomorfo a $\bigoplus_{i \in I} R$ per un qualche insieme di indici I .

Concretamente

- Piatto: per ogni $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B$ iniettiva, anche

$$0 \rightarrow A \otimes M \xrightarrow{f \otimes \text{id}} B \otimes M \text{ è iniettiva}$$

- Proiettivo: $A \xrightarrow{f} B \rightarrow 0 \rightarrow \text{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\psi} \text{Hom}_R(M, B) \rightarrow 0$
 $\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \exists \psi \uparrow & \nearrow \varphi & \\ M & & \end{array}$

$$\forall \varphi: M \rightarrow B \quad \exists \psi: M \rightarrow A \text{ t.c. } \varphi = f \circ \psi$$

- Iniettivo: $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \rightarrow 0 \leftarrow \text{Hom}(A, M) \xleftarrow{\varphi \circ f} \text{Hom}(B, M)$
 $\begin{array}{ccc} 0 & \leftarrow & \text{Hom}(A, M) \\ \psi \downarrow & \nearrow \exists \varphi & \\ M & & \end{array}$

$$\forall \psi: A \rightarrow M \quad \exists \varphi: B \rightarrow M \text{ t.c. } \psi = \varphi \circ f$$

Piatti R anello

- R è piatto, perché $- \otimes_R R = \text{id}$ è esatto
- $\otimes$ commutano con $\oplus$ (aggiunzione), e quindi se $\{M_i\}$ sono piatti, anche $\oplus M_i$ è piatto

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow A \rightarrow B \xrightarrow{\otimes (\oplus M_i)} 0 \rightarrow A \otimes (\oplus M_i) &\rightarrow B \otimes (\oplus M_i) \\ 0 \rightarrow \oplus (A \otimes M_i) &\rightarrow \oplus (B \otimes M_i) \end{aligned}$$

che è iniettiva

- In particolare, ogni modulo libero è piatto.
- S parte moltiplicativa, $S^{-1}R$ è un R -modulo piatto poiché $M \otimes_R S^{-1}R = S^{-1}M$, il funtore $\otimes_R S^{-1}R$ coincide con S^{-1} , che è esatto (la distinzione fra R -mod e $S^{-1}R$ -mod non è importante)

Proiettivi

- R è proiettivo: $\text{Hom}_R(R, -) = \text{id}$ è esatto
- $\oplus$ di proiettivi è proiettivo:

$$\begin{array}{ccccc} B & \rightarrow & A & \rightarrow & 0 \\ \uparrow \otimes g & & \uparrow \otimes f & & \\ g & & \oplus P_i & & \\ \uparrow \cup & & \uparrow & & \\ P_i & & & & \end{array}$$

(curved arrow from $\oplus P_i$ to A labeled f)

- In particolare, ogni modulo libero è proiettivo.

Costruzione $F(M) = \bigoplus_{m \in M} R \rightarrow M \rightarrow 0$

— basta dare una mappa $R \rightarrow M \forall m \in M$
Sulla componente m prendo $1 \mapsto m$

Se M è fin gen da $m_1, \dots, m_n$, posso prendere

$$F_{\text{fin}}(M) = \bigoplus_{i=1}^n R \rightarrow M$$

$e_i \mapsto m_i$

proposizione

La categoria Mod_R ha abbastanza proiettivi, cioè per ogni $M \in \text{Mod}_R$ $\exists P \rightarrow M \rightarrow 0$ con P proiettivo.

Risoluzioni proiettive

$$\dots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

Lemma P proiettivo $\iff \exists Q$ t.c. $P \oplus Q$ libero

DIMOSTRAZIONE

$$(\Leftarrow) \quad \begin{array}{c} B \longrightarrow A \longrightarrow 0 \\ \uparrow \quad \nearrow \quad \uparrow \\ P \oplus Q \longleftarrow P \end{array}$$

$$P \oplus Q \longleftarrow P$$

$$g \circ (P \longleftarrow P \oplus Q) \text{ solleva } \neq$$

$$(\Rightarrow) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & F & \longrightarrow & P \longrightarrow 0 \\ & & \alpha \downarrow & & \uparrow \text{id} & & \\ & & P & & & & \end{array}$$

$P \oplus Q$ libero $\Rightarrow$ proiettivo $\Rightarrow f \circ g$ si solleva

$$\iff F \simeq P \oplus Q$$

□

corollario Proiettivo $\Rightarrow$ piatto.

DIMOSTRAZIONE

Sia P proiettivo, Q t.c. $P \oplus Q = F$ libero

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{\otimes F} 0 \longrightarrow A \otimes F \longrightarrow B \otimes F \text{ esatta}$$

$$0 \longrightarrow A \otimes P \oplus A \otimes Q \longrightarrow B \otimes P \oplus B \otimes Q$$

In particolare, $A \otimes P \longrightarrow B \otimes P$ è iniettiva

□

Lemma $(R, \mathfrak{m})$ locale (non necess. Noetheriano), P R -mod fin gen. proiettivo.
Allora P è libero.

DIMOSTRAZIONE

$P \otimes R/\mathfrak{m} = P/\mathfrak{m}P$ è uno s.v. su $R/\mathfrak{m}$ di dim finita

Diciamo che $\bar{m}_1, \dots, \bar{m}_n$ sia una base: la solleva a $m_1, \dots, m_n$ di M

Per Nak, $\langle m_1, \dots, m_n \rangle = M$

$$0 \longrightarrow Q \longrightarrow R^n \xrightarrow{e_i \mapsto m_i} P \longrightarrow 0$$

Per proiettività, la successione spezza: $R^n = P \oplus Q$

$$\text{Quozientando per } \mathfrak{m}: (R/\mathfrak{m})^n \simeq P/\mathfrak{m}P \oplus Q/\mathfrak{m}Q$$

$$\dim n \quad \dim n \Rightarrow \dim 0$$

$\Rightarrow Q = \mathfrak{m}Q$ Siccome $Q = R^n/P$ è un quoziente di R^n , è fin gen.

Posso applicare Nak: $Q = 0$.

Allora $P \simeq R^n$

□

Oss Kaplansky: su $(A, \mathfrak{m})$ locale, tutti i proiettivi sono liberi

proposizione R anello Noetheriano, M R -modulo fin gen.
 M è proiettivo $\iff M_p := M \otimes_R R_p$ è libero $\forall p \in \text{Spec } R$
 $\iff M_p := M \otimes_R R_p$ è libero $\forall p \in \text{SpecMax } R$

def Un R -modulo M si dice finitamente presentato se esiste una successione esatta $R^m \rightarrow R^n \rightarrow M \rightarrow 0$
 (nel caso Noetheriano vuol dire solo fin gen)

Lemma A R -mod fin. presentato. Allora $\forall p \in \text{Spec } R$
 $\text{Hom}_R(A, B) \otimes_R R_p \cong \text{Hom}_{R_p}(A_p, B_p)$
 $\varphi \otimes \frac{f}{s} \mapsto (\frac{a}{s} \mapsto \varphi(a) \otimes \frac{f}{s})$

Dimostrazione

• Se A è libero, $A \cong R^n$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(R^n, B) \otimes_R R_p &\stackrel{?}{\cong} \text{Hom}_{R_p}(R_p^n, B_p) \\ B^n \otimes_R R_p &= (B \otimes_R R_p)^n \\ &\text{perché } \otimes \text{ commuta con } \oplus \end{aligned}$$

• Se A è fin. pres: fissiamo $R^m \rightarrow R^n \rightarrow A \rightarrow 0$

Applico prima $\text{Hom}(-, B)$ e poi $\otimes_R R_p$: trovo

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Hom}(R^m, B) \otimes_R R_p & \leftarrow & \text{Hom}(R^n, B) \otimes_R R_p & \leftarrow & \text{Hom}(A, B) \otimes_R R_p & \leftarrow & 0 \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong & & \downarrow & & \downarrow \cong \\ \text{Hom}(R_p^m, B_p) & \leftarrow & \text{Hom}(R_p^n, B_p) & \leftarrow & \text{Hom}(A_p, B_p) & \leftarrow & 0 \end{array} \quad \text{esatta}$$

$$\text{Hom}(R_p^m, B_p) \leftarrow \text{Hom}(R_p^n, B_p) \leftarrow \text{Hom}(A_p, B_p) \leftarrow 0 \quad (\text{prima } \otimes_R R_p \text{ poi } \text{Hom}(-, B_p))$$

Il Lemma dei 5 dice che la freccia centrale è un isomorfismo. □

Dimostrazione

$(\implies)$ Supponiamo M proiettivo f.g.

Scevro $M \oplus Q \cong R^n$

Localizzando: $M_p \oplus Q_p \cong R_p^n \implies M_p$ proiettivo e fin gen perché $M_p \cong R_p^n$ e R_p Noeth.
 $\implies M_p$ libero

$(\impliedby)$ $B \rightarrow A \rightarrow 0$ devo mostrare che $\text{Hom}(M, B) \rightarrow \text{Hom}(M, A)$ è surgettiva

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \vdots \\ \uparrow \\ M \end{array}$$

$$\iff \text{Hom}(M, B)_p \rightarrow \text{Hom}(M, A)_p \text{ è sorg } \forall p$$

$$\stackrel{\text{Lemma}}{\iff} \text{Hom}_{R_p}(M_p, B_p) \rightarrow \text{Hom}_{R_p}(M_p, A_p) \text{ è sorg } \forall p$$

che è vero perché $B_p \rightarrow A_p \rightarrow 0$ e M_p è libero. □

iniettivi

- Prodotti diretti di iniettivi sono iniettivi

Lemma: criterio di Baer

R anello, M R -modulo

M è iniettivo $\iff$ per ogni ideale $I \triangleleft R$ e ogni $f: I \rightarrow M$

$\exists g: R \rightarrow M$ t.c. $g|_I = f$.

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & R \\ & & \downarrow f & & \downarrow \exists g \\ & & M & & \end{array}$$

DIMOSTRAZIONE

($\implies$) OVvio

($\impliedby$) Prendiamo $0 \longrightarrow A \longrightarrow B$
 $\downarrow f$
 M

$$\mathcal{F} = \{(A', f') \mid A \subseteq A' \subseteq B, f': A' \rightarrow M, f'|_A = f\}$$

$\mathcal{F}$ soddisfa le ipotesi di Zorn

Sia $(\tilde{A}, \tilde{f})$ massimale

Se $\tilde{A} = B$ ho finito. Altrimenti prendo $b \in B \setminus \tilde{A}$.

Sia $I = \{r \in R \mid rb \in \tilde{A}\}$ è un ideale di R .

Considero

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & R \\ & & \downarrow \tilde{f} & & \downarrow \exists g \\ & & M & & \end{array}$$

$g: R \rightarrow M$ t.c.

se $r \in I$, $g(r) = \tilde{f}(rb)$

$$\tilde{A} + \langle b \rangle \longrightarrow M$$

$$\tilde{a} + rb \longmapsto \tilde{f}(\tilde{a}) + g(r)$$

Verifichiamo la buona def.

$$\tilde{a}_1 + r_1 b = \tilde{a}_2 + r_2 b \longrightarrow \tilde{A} \ni \tilde{a}_1 - \tilde{a}_2 = (r_2 - r_1)b \implies r_2 - r_1 \in I$$

$$\text{Quindi } g(r_2 - r_1) = \tilde{f}((r_2 - r_1)b)$$

La proprietà da verificare è

$$\tilde{f}(\tilde{a}_1) + g(r_1) \stackrel{?}{=} \tilde{f}(\tilde{a}_2) + g(r_2)$$

$$\iff \tilde{f}(\tilde{a}_1 - \tilde{a}_2) \stackrel{?}{=} g(r_2 - r_1) = \tilde{f}((r_2 - r_1)b) = \tilde{f}(\tilde{a}_1 - \tilde{a}_2)$$

□

Lemma

In $\text{Mod } \mathbb{Z} = \text{Ab}$, M è iniettivo $\iff M$ è divisibile, cioè

$\forall n \neq 0$ la funzione $[n]: M \rightarrow M$ è surgettiva.

DIMOSTRAZIONE

M iniettivo $\iff \forall I \triangleleft \mathbb{Z}$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & & \downarrow \forall f & & \downarrow \exists g \\ & & M & & \end{array}$$

1° caso: $I = (0)$, $f = 0$ e prendo $g = 0$

2° caso: $I = (n)$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & n\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z} \\ & & \downarrow n & & \downarrow f \\ & & nM & & \end{array}$$

Se $f(n) = m$, $g(n)$ deve

essere un el. di M t.c. $ng(n) = g(n) = f(n) = m$

Da questo segue l'equivalenza.

□

esempio $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ sono $\mathbb{Z}$ -mod iniettivi

Lemma $A \text{ R-mod}, T \in \text{Ab}$.

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T) \cong \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, T))$$

dove $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, T)$ è un R -mod con moltiplicazione

$$(r \cdot \varphi)(r') := \varphi(rr')$$

Inoltre $\forall A \rightarrow B$ omomorfismo di R -moduli

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T) \xleftarrow{\quad} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(B, T)$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T) & \xleftarrow{\quad} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(B, T) \\ \downarrow \text{Id} & \hookrightarrow & \downarrow \text{Id} \\ \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, T)) & \xleftarrow{\quad} & \text{Hom}_R(B, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, T)) \end{array}$$

DIMOSTRAZIONE

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, T) \xleftrightarrow{\quad} \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, T))$$

$$\begin{array}{ccc} \varphi & \mapsto & (a \mapsto (r \mapsto \varphi(ra))) \\ (a \mapsto (\psi(ra))) & \longleftarrow & \psi \end{array}$$

□

corollario Se $\mathbb{Q} \in \text{Ab}$ iniettivo, $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q})$ è un R -mod iniettivo.

DIMOSTRAZIONE

$$\mathbb{Q}' := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q})$$

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B \\ & & \downarrow \mathbb{Q} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_R(B, \mathbb{Q}') & \longrightarrow & \text{Hom}_R(A, \mathbb{Q}') \text{ surg?} \\ \parallel & \hookrightarrow & \parallel \\ \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(B, \mathbb{Q}) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \mathbb{Q}) \end{array}$$

□

proposizione Mod_R ha abbastanza iniettivi, cioè
 $\forall M \in \text{Mod}_R \exists I$ iniettivo con $\psi: M \rightarrow I$ iniettivo.

DIMOSTRAZIONE

$$I := \prod_{\phi \in \text{Hom}_R(M, \mathbb{Q})} \mathbb{Q}, \text{ dove } \mathbb{Q} := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(R, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \text{ è iniettivo}$$

Costruiamo $\psi: M \rightarrow I$, cioè costruiamo una $M \rightarrow \mathbb{Q}$ per ogni fattore:
 per fattore ϕ uso ϕ .

Vediamo che ψ è iniettivo: $\text{Ker } \psi = \{0\} \iff \forall m \in M \exists \phi \text{ t.c. } \phi(m) \neq 0$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & \langle m \rangle \longrightarrow M \\ & & \downarrow \phi \\ & & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array} \quad \text{Costruire } M \longrightarrow \mathbb{Q} \in \text{Hom}_R(M, \mathbb{Q})$$

$$\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \leftarrow \dots \leftarrow \mathbb{Q}$$

$$\langle m \rangle = \mathbb{Z} \text{ o } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

quindi posso costruire ϕ non banale
 In Ab , $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è iniettivo

□

Obiettivo Sia $F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ un funtore esatto a sx (R, S non necess comm)

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \text{ surc. esatta corta}$$

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow (R^1 F)(A) \rightarrow (R^1 F)(B) \rightarrow (R^1 F)(C) \rightarrow \dots \rightarrow (R^2 F)(A) \rightarrow \dots$$

Se F è esatto a dx:

$$\dots \rightarrow (L^1 F)(A) \rightarrow (L^1 F)(B) \rightarrow (L^1 F)(C) \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0$$

Def. Un complesso (di catene) coomologico di R -moduli è una successione

$$\dots \rightarrow A^{i-1} \xrightarrow{d_A^{i-1}} A^i \xrightarrow{d_A^i} A^{i+1} \xrightarrow{d_A^{i+1}} A^{i+2} \rightarrow \dots$$

tali che $d_A^{i+1} \circ d_A^i = 0 \quad \forall i$

Numeraazione omologica: $A_{\cdot} := A^{\cdot}$

La coomologia del complesso $(A^{\cdot}, d_A^{\cdot})$ si ottiene come segue.

- gli i -cocicli $Z^i(A^{\cdot}) = \text{Ker } d_A^i = A^i$
- gli i -cobordi $B^i(A^{\cdot}) = \text{Im } d_A^{i-1} = Z^i(A^{\cdot}) = A^i$
- l' i -esimo gruppo di coomologia è $H^i(A^{\cdot}) = Z^i(A^{\cdot}) / B^i(A^{\cdot})$

Diciamo che il complesso è aciclico o esatto se $H^i(A^{\cdot}) = 0 \quad \forall i$.

Un morfismo di complessi $\phi^{\cdot}: A^{\cdot} \rightarrow B^{\cdot}$ è

è una collezione di mappe $\phi^i: A^i \rightarrow B^i$

$$\dots \rightarrow A^i \xrightarrow{d_A^i} A^{i+1} \xrightarrow{d_A^{i+1}} A^{i+2} \rightarrow \dots$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \phi^i \downarrow & \hookrightarrow & \phi^{i+1} \downarrow & \hookrightarrow & \phi^{i+2} \downarrow \\ \dots & \rightarrow & B^i & \xrightarrow{d_B^i} & B^{i+1} & \xrightarrow{d_B^{i+1}} & B^{i+2} \rightarrow \dots \end{array}$$

$$\text{t.c. } \phi^{i+1} \circ d_A^i = d_B^i \circ \phi^i \quad \forall i$$

Oss Sia $\phi^{\cdot}: A^{\cdot} \rightarrow B^{\cdot}$ un morfismo di complessi.

Ci sono mappe indotte $H^i(\phi^{\cdot}): H^i(A^{\cdot}) \rightarrow H^i(B^{\cdot}) \quad \forall i$

$$a_i \in Z^i(A^{\cdot}) \quad [a_i] \mapsto [\phi^i(a_i)]$$

$$1) \phi^i(a_i) \in Z^i(B^{\cdot}): d_B^i \phi^i(a_i) = \phi^{i+1} \circ d_A^i(a_i)$$

$$2) \text{ passa al quoziente: } \phi^i(d_A^{i-1}(a_{i-1})) = d_B^i \circ \phi^{i-1}(a_{i-1}) \text{ quindi } \phi^i \text{ manda } B^i(A^{\cdot}) \text{ in } B^i(B^{\cdot})$$

Oss $H^i(A^{\cdot} \oplus B^{\cdot}) = H^i(A^{\cdot}) \oplus H^i(B^{\cdot})$. ogni H^i è un funtore additivo $\text{Chr} \rightarrow \text{Mod}_R$

Def. Siano $A^{\cdot}, B^{\cdot}$ due complessi.

Un morfismo di complessi $\phi^{\cdot}: A^{\cdot} \rightarrow B^{\cdot}$ è un quasi-isomorfismo se $H^i(\phi^{\cdot})$ è un isomorfismo $\forall i$

Due morfismi $\phi^{\cdot}, \psi^{\cdot}: A^{\cdot} \rightarrow B^{\cdot}$ sono omotopi (chain homotopic)

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \rightarrow & A^i & \xrightarrow{d_A^i} & A^{i+1} & \xrightarrow{d_A^{i+1}} & A^{i+2} \rightarrow \dots \\ & & \downarrow \phi^i - \psi^i & & \downarrow \phi^{i+1} - \psi^{i+1} & & \downarrow \phi^{i+2} - \psi^{i+2} \\ \dots & \rightarrow & B^i & \xrightarrow{d_B^i} & B^{i+1} & \xrightarrow{d_B^{i+1}} & B^{i+2} \rightarrow \dots \end{array}$$

$$\text{se } \exists k_i: A^i \rightarrow B^{i-1} \text{ t.c. } \phi^i - \psi^i = d_B^{i-1} \circ k_i + k_{i+1} \circ d_A^i \quad \forall i.$$

Oss Se ϕ^* e ψ^* sono omotopi, $H^i(\phi^*) = H^i(\psi^*) \forall i$.

$$[a_i] \in H^i(A), a_i \in Z^i(A^*) \quad \phi^*(a_i) - \psi^*(a_i) = d_{B^*}^{i-1} \circ \phi_i(a_i) + \psi^{i+1} \circ d_A^i(a_i) = d_{B^*}^{i-1} \circ \phi_i(a_i) \text{ è un cobordo}$$

$$\Rightarrow [\phi^*(a_i)] = [\psi^*(a_i)] \in H^i(B^*)$$

Def. Diciamo che $\phi^*: A^* \rightarrow B^*, \psi^*: B^* \rightarrow A^*$ sono equivalenze omotopiche se $\phi^* \circ \psi^*$ e $\psi^* \circ \phi^*$ sono omotopi all'identità.

In particolare, ϕ^* e ψ^* sono quasi-isomorfismi:

$$\phi^* \circ \psi^* \sim \text{id}^* \Rightarrow H^i(\phi^* \circ \psi^*) = H^i(\text{id}^*)$$

$$H^i(\phi^*) \circ H^i(\psi^*) \stackrel{\text{id}}{=} \text{id}$$

Def. Una successione esatta di complessi è

$$0 \rightarrow A^* \rightarrow B^* \rightarrow C^* \rightarrow 0$$

t.c. $\forall i \quad 0 \rightarrow A^i \rightarrow B^i \rightarrow C^i \rightarrow 0$ è esatta.

proposizione Sia $0 \rightarrow A^* \rightarrow B^* \rightarrow C^* \rightarrow 0$ esatta corta di complessi.

C'è una successione esatta lunga

$$\dots \rightarrow H^{i-1}(C^*) \xrightarrow{\partial} H^i(A^*) \rightarrow H^i(B^*) \rightarrow H^i(C^*) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}(A^*) \rightarrow \dots$$

Lemma del serpente

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{Ker } \alpha & \rightarrow & \text{Ker } \beta & \rightarrow & \text{Ker } \gamma \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & A & \rightarrow & B & \rightarrow & C \rightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \rightarrow & A' & \rightarrow & B' & \rightarrow & C' \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \text{Coker } \alpha & \rightarrow & \text{Coker } \beta & \rightarrow & \text{Coker } \gamma \end{array}$$

la successione

$$\text{Ker } \alpha \rightarrow \text{Ker } \beta \rightarrow \text{Ker } \gamma \rightarrow \text{Coker } \alpha \rightarrow \text{Coker } \beta \rightarrow \text{Coker } \gamma \text{ è esatta.}$$

Dimostrazione

$$\begin{array}{ccccccc} & H^i(A^*) & & H^i(B^*) & & H^i(C^*) & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ A^i/B^i(A^*) & \rightarrow & B^i/B^i(B^*) & \xrightarrow{\bar{\beta}^i} & C^i/B^i(C^*) & \rightarrow & 0 \\ & \downarrow d_A^i & & \downarrow d_B^i & & \downarrow d_C^i & \\ 0 \rightarrow Z^{i+1}(A^*) & \rightarrow & Z^{i+1}(B^*) & \rightarrow & Z^{i+1}(C^*) & & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & H^{i+1}(A^*) & & H^{i+1}(B^*) & & H^{i+1}(C^*) & \end{array}$$

le successioni orizzontali sono esatte:

- iniettività di $Z^{i+1}(A^*) \xrightarrow{\alpha^{i+1}} Z^{i+1}(B^*)$: α^{i+1} è iniettiva
- analogamente, $B^i/B^i(B^*) \rightarrow C^i/B^i(C^*)$ è surgettiva
- esattezza in $B^i/B^i(B^*)$: se $b \in B^i/B^i(B^*)$ t.c. $\bar{\beta}^i(b) = 0$, allora $\beta^i(b) \in B^i(C^*)$: $\beta^i(b) = d_C^i(c_{i-1}) = d_C^i(\beta^{i-1}(b_{i-1})) = \beta^i \circ d_B^{i-1}(b_{i-1})$
 $\Rightarrow \beta^i(b - d_B^{i-1}(b_{i-1})) = 0$
 $\Rightarrow b - d_B^{i-1}(b_{i-1}) = \alpha^i(a_i)$
 $\Rightarrow b = \alpha^i(a_i)$
 $\bar{\beta}^i \circ \alpha^i = 0$ è facile.

□

Lemma

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \longrightarrow 0 & \text{esatta} \\ & & \downarrow f^\bullet & & \downarrow g^\bullet & & \downarrow h^\bullet & \\ 0 & \longrightarrow & D^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet & \longrightarrow & F^\bullet \longrightarrow 0 & \text{esatta} \\ \dots & \longrightarrow & H^i(A^\bullet) & \longrightarrow & H^i(B^\bullet) & \longrightarrow & H^i(C^\bullet) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}(A^\bullet) \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow H^i(f^\bullet) & \hookrightarrow & \downarrow H^i(g^\bullet) & \hookrightarrow & \downarrow H^i(h^\bullet) & \\ \dots & \longrightarrow & H^i(D^\bullet) & \longrightarrow & H^i(E^\bullet) & \longrightarrow & H^i(F^\bullet) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}(D^\bullet) \longrightarrow \dots \end{array}$$

Strategia Partire con $0 \longrightarrow A^\bullet \longrightarrow B^\bullet \longrightarrow C^\bullet \longrightarrow 0$, F esatto a dx

• Costruire $0 \longrightarrow P^\bullet_A \longrightarrow P^\bullet_B \longrightarrow P^\bullet_C \longrightarrow 0$

• Applicare F : $0 \longrightarrow F(P^\bullet_A) \longrightarrow F(P^\bullet_B) \longrightarrow F(P^\bullet_C) \longrightarrow 0$ esatta

• Dalla prop:

$$H_{i+1}(F(P^\bullet_C)) \longrightarrow H_i(F(P^\bullet_A)) \longrightarrow H_i(F(P^\bullet_B)) \longrightarrow H_i(F(P^\bullet_C)) \longrightarrow H_{i-1}(F(P^\bullet_A)) \longrightarrow \dots$$

• Vedere che $H_0(F(P^\bullet_A)) = F(A)$ e poi in generale definiremo $(L_i F)(A) = H_i(F(P^\bullet_A))$

RISOLUZIONI PROIETTIVE

Def. Dato $A \in \text{Mod}_R$, una risoluzione proiettiva di A è una sequenza esatta

$$\dots \longrightarrow P_2^\bullet \longrightarrow P_1^\bullet \longrightarrow P_0^\bullet \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

in cui i $P_i^\bullet$ sono moduli proiettivi

Una risoluzione iniettiva è

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow I_0^\bullet \longrightarrow I_1^\bullet \longrightarrow I_2^\bullet \longrightarrow \dots$$

proposizione Esistono sempre:

$$\dots \longrightarrow P_1^\bullet \xrightarrow{\pi_1} \text{Ker } \pi_0 \subseteq P_0^\bullet \xrightarrow{\pi_0} A \longrightarrow 0$$

Lemma

$$\dots \xrightarrow{\pi_2} P_1 \xrightarrow{\pi_1} P_0 \xrightarrow{\pi_0} A \rightarrow 0 \quad \text{risoluzione proiettiva}$$

$$\dots \xrightarrow{\beta_2} B_1 \xrightarrow{\beta_1} B_0 \xrightarrow{\beta_0} B \rightarrow 0 \quad \text{complesso aciclico}$$

(i) Esistono $\alpha_i: P_i \rightarrow B_i \forall i \geq 0$ che fanno commutare tutto, cioè $\alpha_i \circ \pi_{i+1} = \beta_{i+1} \circ \alpha_{i+1}$

(ii) Se $\{ \alpha_i \}$ e $\{ \beta_i \}$ hanno questa proprietà, allora α_0 e β_0 sono omotopi.

Corollario

$$\dots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow A \rightarrow 0 \quad \text{ris. proiettiva}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \downarrow \alpha_2 & \text{id} & \downarrow \alpha_1 & \text{id} & \downarrow \alpha_0 & \text{id} & \parallel \\ \dots \rightarrow Q_2 & \rightarrow & Q_1 & \rightarrow & Q_0 & \rightarrow & A \rightarrow 0 \\ \downarrow \beta_2 & & \downarrow \beta_1 & & \downarrow \beta_0 & & \parallel \\ \dots \rightarrow P_2 & \rightarrow & P_1 & \rightarrow & P_0 & \rightarrow & A \rightarrow 0 \end{array} \quad \text{ris. proiettiva}$$

Per il Lemma, $\beta_0 \circ \alpha_0$ è omotopa ad id_A e viceversa.

DIMOSTRAZIONE

$$(i) \dots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \xrightarrow{\pi_1} P_0 \xrightarrow{\pi_0} A \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \searrow \alpha_0 & & \searrow \alpha_{-1} & & \\ \dots \rightarrow B_2 & \rightarrow & B_1 & \rightarrow & B_0 & \rightarrow & B \rightarrow 0 \end{array}$$

α_0 esiste per proprietà dei proiettivi.

Per usare la proiettività per sollevare $\alpha_0 \circ \pi_1$ a P_1 , mi basta sapere che $B_1 \twoheadrightarrow 0 \supseteq \text{Im}(\alpha_0 \circ \pi_1)$

Ora $\text{Im}(B_1 \rightarrow B_0) = \text{Ker } \beta_0$, quindi basta verificare che

$$\text{Im}(\alpha_0 \circ \pi_1) \subseteq \text{Ker } \beta_0 \iff \beta_0 \circ \alpha_0 \circ \pi_1 = 0 \iff \alpha_{-1} \circ \pi_0 \circ \pi_1 \underset{=0}{=} 0$$

Poi si procede per induzione.

$$(ii) \begin{array}{ccccccc} P_2 & \rightarrow & P_1 & \rightarrow & P_0 & \rightarrow & A \rightarrow 0 \\ \parallel & & \alpha_1 \parallel \beta_1 & & \alpha_0 \parallel \beta_0 & & \downarrow \alpha_{-1} \\ B_2 & \rightarrow & B_1 & \rightarrow & B_0 & \rightarrow & B \rightarrow 0 \end{array}$$

Tesi: $\exists k_i: P_i \rightarrow B_{i+1} \text{ t.c. } \alpha_i - \beta_i = \beta_{i+1} \circ k_i + k_{i-1} \circ \pi_i \quad \forall i$

$$i=-1: 0 = \alpha_{-1} - \beta_{-1} = \beta_0 \circ k_{-1} + k_{-2} \circ \pi_{-1} : \text{prenda } k_{-1} = 0$$

$$i=0: \alpha_0 - \beta_0 = \beta_1 \circ k_0$$

Ho $\alpha_0 - \beta_0: P_0 \rightarrow B$ con $\text{Im}(\alpha_0 - \beta_0) \subseteq \text{Im}(B_1 \rightarrow B_0)$

Per proiettività, ho il sollevamento da P_0 a B_1

$$\text{Per il contenimento: } \text{Im}(\alpha_0 - \beta_0) \subseteq \text{Ker } \beta_0 \iff \beta_0 \circ (\alpha_0 - \beta_0) = 0$$

$$\iff \alpha_{-1} \circ \pi_0 - \beta_{-1} \circ \pi_0 = 0$$

Poi si procede per induzione.



Gruppo di Picard

ES Sia R un anello Noetheriano, M R -mod proiettivo fin.gen
 Consideriamo la funzione $r: \text{Spec } R \rightarrow \mathbb{N}$. Come varia r ?

$$P \mapsto \text{rk}_R(M_P)$$

Oss R rango è ben definito: se $M_P \cong R_P^r$, allora
 $r = \dim_{R_P/PR_P}(M_P/PM_P)$ $M_P/PM_P \cong R_P^r/PR_P^r \cong (R_P/PR_P)^r$

Sol Siano $P \subset Q$ due primi
 $(M_Q)_{PR_Q} \cong (R_Q^{r(Q)})_{PR_Q} \cong (R_P)^{r(Q)}$
 $M_P \cong R_P^{r(P)}$
 $\Rightarrow r(P) = r(Q)$

Se P è primo minimale, r è costante su $V(P) = \{Q \in \text{Spec } R \mid Q \supset P\}$,
 e quindi sulle componenti connesse. □

In particolare, se R è un dominio, abbiamo un ben definito "rango"
 per i moduli proiettivi.

ES R dominio Noetheriano, M R -mod proiettivo di rango 1 fin.gen.
 Definiamo $M^* := \text{Hom}(M, R)$
 Allora $M \otimes M^* \cong R$ come R -mod.

Sol Ho $\varphi: M \otimes M^* \rightarrow R$ è la stessa cosa
 che descrivere $\tilde{\varphi}: M \times M^* \rightarrow R$
 $(m, f) \mapsto f(m)$ è bilineare

Per dimostrare che φ è isomorfismo, basta farlo in ogni localizzazione

$$\varphi_P: (M \otimes M^*)_P \rightarrow R_P$$

$$M_P \otimes M_P^* = M_P \otimes \text{Hom}_{R_P}(M_P, R_P) \cong R_P \otimes \text{Hom}_{R_P}(R_P, R_P) \cong R_P$$

$$\text{Hom}_R(M, R) \otimes R_P \cong \text{Hom}_{R_P}(M_P, R_P) \cong \text{Hom}_{R_P}(R_P, R_P) \cong R_P$$

Quindi M^* è loc. libero $\Rightarrow$ proiettivo

Def R dominio Noetheriano.

$\text{Pic}(R) = (\{M \text{ } R\text{-moduli proiettivi fin.gen di rango 1}\} / \sim, \otimes)$

$$(M_1 \otimes M_2)_P \cong (M_1)_P \otimes_{R_P} (M_2)_P \cong R_P \otimes_{R_P} R_P \cong R_P$$

è associativo, l'el. neutro è R e l'inverso è M^*

ES Se R è un PID, $\text{Pic}(R)$ è banale.

Sol Sia P un proiettivo: $\exists Q$ t.c. $P \otimes Q$ sia libero
 $\Rightarrow P$ sottomodulo di un libero $\xrightarrow{\text{RMD}}$ P è libero

ES $R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})}$. $\text{Pic}(R) \neq \{1\}$

SOL $I = (2, 1+\sqrt{-5})$ non è principale $\Rightarrow$ non è libero

I è proiettivo: vediamo che è loc. libero

I_P è libero su R_P

Per $P = (0)$: I_P è libero su $\text{Frac}(R)$ (sp. vett.)

Per P massimale: R_P è un DVR $\Rightarrow$ PID

I_P è principale e quindi libero

I non è principale:

$$R/I = \frac{\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]}{(2, 1+\sqrt{-5})} \simeq \frac{\mathbb{Z}[x]}{(x^2+5, 2, 1+x)} \simeq \mathbb{F}_2$$

Supponiamo $I = (a+b\sqrt{-5})$

$$R \longrightarrow I \subseteq R$$

$$r \longmapsto r(a+b\sqrt{-5}) \quad \text{ha immagine } I$$

Scevro $R = \mathbb{Z} \cdot 1 \oplus \mathbb{Z} \sqrt{-5} \simeq \mathbb{Z}^2$ come $\mathbb{Z}$ -mod

$$\Phi: \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$$

Φ ha matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$

Voglio dire che $|\det \Phi| = \det M = a^2 + b^2 \neq 2$

Applico l'algoritmo di Euclide

$$\text{es } \begin{pmatrix} 3 & -35 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{[2]+[1]} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 87 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 87 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{[2]-3[1]} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 87 & 7-3 \cdot 87 \end{pmatrix}$$

□

ES R dominio di Dedekind, M R -mod proiettivo di rango 1 fin. gen.

Allora esiste $I \triangleleft R$ con $I \simeq M$ come R -mod.

SOL $K = \text{Frac}(R)$

$$\otimes M \begin{cases} 0 \longrightarrow R \longrightarrow K \\ 0 \longrightarrow R \otimes_R M \longrightarrow K \otimes_R M \text{ esatta} \\ 0 \longrightarrow M \longrightarrow K \end{cases}$$

M proiettivo $\Rightarrow$ piatto

$$\left\langle \frac{x_1}{s_1}, \dots, \frac{x_t}{s_t} \right\rangle = \left\langle \frac{a_1}{s_1}, \dots, \frac{a_t}{s_t} \right\rangle$$

$$\Rightarrow M \subseteq \frac{1}{s} \cdot R \xrightarrow{\cdot s} R \Rightarrow sM \subseteq R \text{ è un sottomod, cioè un ideale}$$

(Un tale M si dice ideale frazionario).

□

ES $I, J \triangleleft R$ dominio di Dedekind ($\Rightarrow$ automaticamente mod. proiettivi)

Allora $I \cdot J \simeq I \otimes J$

$$\text{SOL } 0 \longrightarrow J \longrightarrow R \xrightarrow{\otimes I} 0 \longrightarrow J \otimes I \xrightarrow{\text{incl}} R \otimes I \simeq I \hookrightarrow R$$

$$j \otimes i \longmapsto j \otimes i \longmapsto ji \longmapsto ji$$

$$0 \longrightarrow J \otimes I \longrightarrow IJ \text{ ed è surgettiva}$$

□

Conseguenza: $\text{Pic}(\mathcal{O}_K) \simeq \mathcal{O}(K)$

teorema $\#\mathcal{O}(K) < +\infty$

esempio $\text{Pic}(\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-5})}) = \text{Pic}(\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

ES $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ non è libero

Lemma $f: \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z}$ omomorfismo t.c. $f|_{\mathbb{Z}^{(n)}} \equiv 0$.
Allora $f \equiv 0$ (dove $\mathbb{Z}^{(n)} = \bigoplus_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}$)

DIMOSTRAZIONE

Sia $x \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ della forma $x = (x_n) = (p^n y_n)$ dove p è un primo e $y_n \in \mathbb{Z}$.

$$f(x) = f((y_0, p y_1, \dots, p^n y_n, 0, \dots) + (0, \dots, 0, p^{n+1} y_{n+1}, \dots)) = f(A) + f(B) = 0 + f(B) = p^{n+1} f(C)$$

$$\Rightarrow f(x) \text{ è multiplo di } p^{n+1} \forall n \Rightarrow f(x) = 0$$

Se $x = (x_n)$ è qualsiasi $x = (2^n a_n + 3^n b_n)_n$

$$\Rightarrow f(x) = f((2^n a_n)_n) + f((3^n b_n)_n) = 0$$

□

Lemma $f: \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z}$ omomorfismo di $\mathbb{Z}$ -mod.
Sia $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$.
Allora $f(e_i) = 0 \forall i$ tranne un numero finito.

DIMOSTRAZIONE

Per assurdo, supponiamo di no

Considero $x = (2^{k_n})$ (k_n da scegliere, crescente) e calcolo

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^j 2^{k_i} e_i + 2^{k_{j+1}} b_j\right)$$

$$\Rightarrow f(x) - \sum_{i=1}^j 2^{k_i} f(e_i) = 2^{k_{j+1}} f(b_j)$$

$$\frac{3}{4} > \left| \frac{f(x) - \sum_{i=1}^j 2^{k_i} f(e_i)}{2^{k_{j+1}}} \right| = |f(b_j)|$$

Scelgo k_{j+1} t.c. $\left| \frac{\sum_{i=1}^j 2^{k_i} f(e_i)}{2^{k_{j+1}}} \right|$ sia $< \frac{1}{2}$

Per j abbastanza grande, $|f(b_j)| < 1 \Rightarrow f(b_j) = 0$

Per j grande $b_j - b_{j+1} = c_j e_{j+1}$, con $c_j \in \mathbb{Z} \Rightarrow 0 = f(b_j - b_{j+1}) = c_j f(e_{j+1})$

□

corollario $\text{Hom}(\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}, \mathbb{Z}) = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{Z} p_n$, dove $p_n: \mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{Z}$
 $(x_n) \mapsto x_n$

DIMOSTRAZIONE

($\supseteq$) è chiaro

($\subseteq$) $f \in \text{Hom}(\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}, \mathbb{Z})$, pongo $g := \sum_{i=0}^{\infty} f(e_i) p_i$
e osservo che f e g coincidono su $\mathbb{Z}^{(n)}$

$$\Rightarrow f - g|_{\mathbb{Z}^{(n)}} \equiv 0 \Rightarrow f - g \equiv 0 \Rightarrow f = g$$

□

teorema $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ non è libero.

DIMOSTRAZIONE

Per assurdo, $\mathbb{Z}^{\mathbb{N}} \simeq \bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}$

• $|I|$ finito: $|\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}| = \mathfrak{c}$, $|\bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}| = \aleph_0$.

• $|I|$ infinito: $\text{Hom}(\mathbb{Z}^{\mathbb{N}}, \mathbb{Z}) \simeq \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{Z}$ numerabile

$$\text{Hom}(\bigoplus_{i \in I} \mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \simeq \prod_{i \in I} \mathbb{Z} \text{ più che numerabile} \quad \blacktriangleleft \quad \square$$

Funtori derivati

$F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ Functore additivo esatto a dx

I funtori derivati sinistri $L_i F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_S$ sono definiti come segue:

(i) dato $A \in \text{Mod}_R$, scelgo una risoluzione proiettiva $P^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0$, considero il complesso $F(P^\bullet)$, cioè

$$\dots \rightarrow F(P_2^\bullet) \rightarrow F(P_1^\bullet) \rightarrow F(P_0^\bullet) \rightarrow 0$$

e definisco $(L_i F)(A) := H_i(F(P^\bullet))$

(ii) dato $f: A \rightarrow B$ omomorfismo di R -moduli, scelgo $P^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0$ e $P^\bullet \rightarrow B \rightarrow 0$ risoluzioni proiettive

$$\begin{array}{ccc} P^\bullet & \rightarrow & A \rightarrow 0 \\ P^\bullet & \rightarrow & A \rightarrow 0 \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ P^\bullet & \rightarrow & B \rightarrow 0 \end{array}$$

Applico F e trovo $F(P^\bullet) \xrightarrow{F(f)} F(P^\bullet)$

$$(L_i F)(f) := H_i(F(f)): H_i(F(P^\bullet)) \rightarrow H_i(F(P^\bullet))$$

Buona definizione

Se prendo $P^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0, Q^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0$ risoluzioni proiettive

α, β è un'equivalenza omotopica

$$\begin{array}{ccc} P^\bullet & \rightarrow & A \rightarrow 0 \\ \downarrow \alpha & & \parallel \\ Q^\bullet & \rightarrow & A \rightarrow 0 \end{array}$$

Oss f, g omotope vuol dire

$$f_i - g_i = d_{i-1} \circ k + k \circ d_i$$

$$F(f_i) - F(g_i) = F(d_{i-1}) \circ F(k) + F(k) \circ F(d_i)$$

$\Rightarrow$ l'omotopia si preserva applicando F

Applicando F , trovo che $F(\alpha)$ e $F(\beta)$ sono equivalenze omotopiche

$$\text{fra } F(P^\bullet) \xrightleftharpoons[F(\beta)]{F(\alpha)} F(Q^\bullet)$$

Prendendo l'omologia in grado i

$$H_i(F(P^\bullet)) \xrightleftharpoons[\sim]{\sim} H_i(F(Q^\bullet))$$

la stessa verifica mostra la buona definizione di $(L_i F)(f)$

$$L_0 F = F$$

$$\dots \rightarrow P_2^\bullet \rightarrow P_1^\bullet \rightarrow P_0^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0$$


) F

$$F(P^\bullet) \xrightarrow{\partial_1} F(P_0^\bullet) \xrightarrow{\partial_0} F(A) \rightarrow 0 \text{ esatta}$$

$$F(P^\bullet) = \dots \rightarrow F(P_1^\bullet) \xrightarrow{\partial_1} F(P_0^\bullet) \xrightarrow{\tilde{\partial}_0} 0$$


$$L_0 F(A) = H_0(F(P^\bullet)) = \frac{Z^0(F(P^\bullet))}{B^0(F(P^\bullet))} = \frac{F(P_0^\bullet)}{\text{Im } \partial_1} = \text{Im } \partial_0 = F(A)$$

Lemma del ferro di cavallo




Oss. le succ. esatte corte verticali splittano, quindi
dobbiamo prendere $P_i^B := P_i^A \oplus P_i^C$

Dimostrazione



Successione esatta lunga



è rimasta una succ. esatta corta di complessi

la succ. esatta lunga in omologia allora ci dà

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow H_i(F(P_1^B)) \rightarrow H_i(F(P_0^B)) \rightarrow H_i(F(P_0^C)) \xrightarrow{\partial} H_{i-1}(F(P_1^A)) \rightarrow \dots \\ \dots \rightarrow L_i F(C) \rightarrow L_i F(B) \rightarrow L_i F(C) \rightarrow L_{i-1} F(A) \rightarrow \dots \\ \dots \rightarrow L_0 F(A) \xrightarrow{A} L_0 F(B) \xrightarrow{B} L_0 F(C) \xrightarrow{C} 0 \end{aligned}$$

Commenti

1) Se P è proiettivo, $L_i F(P) = (0)$ per $i > 0$

Posso prendere la risoluz. proiettiva

$$\begin{aligned} \dots \rightarrow 0 \rightarrow P &\xrightarrow{\sim} P \rightarrow 0 \\ \dots \rightarrow 0 \rightarrow F(P) &\xrightarrow{\sim} F(P) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

L'omologia in grado $i > 0$ è banale

"Dimension shifting": $0 \rightarrow B \rightarrow P \rightarrow A \rightarrow 0$ con P proiettivo

$$L_1 F(B) \rightarrow 0 \rightarrow L_1 F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(P) \rightarrow F(A) \rightarrow 0$$

↑

$$L_2 F(A) \leftarrow 0 \leftarrow L_2 F(B) \leftarrow L_3 F(A) \leftarrow 0 \leftarrow \dots$$

$$\Rightarrow L_{n+1} F(A) = L_n F(B) \text{ per ogni } n \geq 1.$$

$$2) \quad 0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

$$H_i(A) \rightarrow H_i(B) \rightarrow H_i(C) \rightarrow H_{i-1}(A)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$0 \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$$

$$H_i(D) \rightarrow H_i(E) \rightarrow H_i(F) \rightarrow H_{i-1}(D)$$

Questo implica

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow P^A \rightarrow P^B \rightarrow P^C \rightarrow 0$$

$$\downarrow G \quad \downarrow G \quad \downarrow$$

$$\downarrow G \quad \downarrow G \quad \downarrow G$$

$$0 \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow P^D \rightarrow P^E \rightarrow P^F \rightarrow 0$$

$$L_i F(A) \rightarrow L_i F(B) \rightarrow L_i F(C) \rightarrow L_{i-1} F(A)$$

$$\downarrow G \quad \downarrow G \quad \downarrow G$$

$$L_i F(D) \rightarrow L_i F(E) \rightarrow L_i F(F) \rightarrow L_{i-1} F(D)$$

3) $L_i F$ sono funtori additivi

Se voglio calcolare $L_i F(A \oplus B)$, posso prendere

$$\begin{array}{ccc} L_i F(A \oplus B) & & P^A \rightarrow A \\ \parallel & \nwarrow F & \oplus \\ H_i(F(P^A) \oplus F(P^B)) & & \oplus \\ \parallel & & P^B \rightarrow B \end{array}$$

$$H_i(F(P^A)) \oplus H_i(F(P^B)) = L_i F(A) \oplus L_i F(B)$$

4) Se F è esatto a sx covariante:

$$0 \rightarrow A \rightarrow I_A^\bullet \rightsquigarrow R^i F(A) := H^i(F(I_A^\bullet))$$

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0 \rightsquigarrow 0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow R^1 F(A) \rightarrow R^1 F(B) \rightarrow \dots$$

Se I è iniettivo, $R^i F(I) = 0 \quad \forall i \geq 1$

Se F è contravariante esatto a sx posso calcolare $R^i F$

$$\text{usando } P^\bullet \rightarrow A \rightarrow 0 \rightsquigarrow R^i F(A) := H^i(F(P^\bullet))$$

Ext e Tor

(1) Dato B R -mod., considero $F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$
 $A \mapsto A \otimes B$

è esatto a dx: ammette funtori derivati sx $L_i F(A)$ f.c.

✓ succ. esatta corta $0 \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow 0$ ottengo
 $\dots \rightarrow L_i F(M_2) \rightarrow L_i F(M_3) \rightarrow M_1 \otimes B \rightarrow M_2 \otimes B \rightarrow M_3 \otimes B \rightarrow 0$

Si denota $L_i F(A) =: \text{Tor}_i^R(A, B)$

D'altro canto posso considerare $G: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$
 $B \mapsto A \otimes B$

anche questo ammette funtori derivati sx

$$(L_i G)(B) = (L_i F)(A)$$

↑
da vedere

(2) Fissato $A \in \text{Mod}_R$, considero $F: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$
 $B \mapsto \text{Hom}_R(A, B)$
 e $G: \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$
 $A \mapsto \text{Hom}_R(A, B)$

Questi sono esatti a sx; i loro funtori derivati dx soddisfano

$$(R^i F)(B) = (R^i G)(A)$$

e si denotano $\text{Ext}_R^i(A, B)$

esempio (1) $R = \mathbb{Z}$. Calcoliamo $\text{Tor}_i(M, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0 \quad \text{ris. proiettiva}$$

) $M \otimes -$

$$\dots \rightarrow 0 \rightarrow M \otimes \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{id} \otimes \cdot n} M \otimes \mathbb{Z} \rightarrow M \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

Elimino l'ultimo termine e prendo l'omologia:

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\cdot n} M \xrightarrow{d_0} 0$$

$$\text{Tor}_0(M, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \frac{\ker d_0}{\text{Im } d_1} = \frac{M}{nM} = M \otimes \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\text{Tor}_i(M, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 0 \quad \text{per } i \geq 2$$

$$\text{Tor}_1(M, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \frac{\ker d_1}{\text{Im } d_2} = \frac{M[n]}{0} = M[n] \quad n\text{-torsione}$$

Oss Sia R un PID. $\text{Tor}_i(A, B) = 0$ per $i \geq 2$

$$\begin{array}{ccccccc} P^0 & \rightarrow & B & \rightarrow & 0 & \rightarrow & R^{\otimes J} \otimes A \rightarrow R^{\otimes I} \otimes A \rightarrow 0 \\ R^{\otimes J} & \rightarrow & R^{\otimes I} & \rightarrow & B & \rightarrow & 0 \end{array}$$

(sottomod. di un libero è libero)

Dal grado 2 in poi, l'omologia è nulla.

2) $R = K[x]/(x^2)$, $M = R/(x)$ come R -modulo

R non ammette una ris. proiettiva finita.

Intanto troviamo una ris. proiettiva:

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & R & \xrightarrow{\cdot x} & R & \xrightarrow{\cdot x} & R \xrightarrow{\pi} R/(x) \longrightarrow 0 \\ & & & \uparrow \cdot x & \uparrow \cdot x & \uparrow \cdot x & \\ & & & x & x & x & \\ & & & \downarrow \cdot x & \downarrow \cdot x & \downarrow \cdot x & \\ & & & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

Calcoliamo $\text{Tor}_i^R(M, M)$: è l'omologia del complesso

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & R \otimes M & \xrightarrow{\cdot x \otimes \text{id}} & R \otimes M & \longrightarrow & R \otimes M \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow \cdot x & & \uparrow \cdot x & & \\ & & M & \xrightarrow{\cdot x} & M & \xrightarrow{\cdot x} & M \longrightarrow 0 \end{array}$$

$$\text{Tor}_i^R(M, M) = \frac{\ker \partial_i}{\text{Im } \partial_{i+1}} = M \quad \forall i \geq 0$$

In particolare, M non ha ris. proiettive finite, altrimenti

Tor_i dovrebbe essere definitivamente nullo.

Oss Se F è un funtore esatto, applicandolo a una succ. esatta lunga
trovo una succ. esatta lunga.

proposizione Le seguenti sono equivalenti (per colonne):

(i) P proiettivo	(i) I iniettivo	(i) F piatto
(ii) $\text{Ext}^i(P, B) = 0 \quad \forall i \geq 1 \quad \forall B$	(ii) $\text{Ext}^i(A, I) = 0 \quad \forall i \geq 1 \quad \forall A$	(ii) $\text{Tor}_i(F, B) = 0 \quad \forall i \geq 1 \quad \forall B$
(iii) $\text{Ext}^i(P, B) = 0 \quad \forall i$	(iii) $\text{Ext}^i(A, I) = 0 \quad \forall A$	(iii) $\text{Tor}_i(F, B) = 0 \quad \forall B$
	(iv) $\text{Ext}^i(R/J, I) = 0 \quad \forall J \triangleleft R$	(iv) $\text{Tor}_i(F, R/J) = 0 \quad \forall J \triangleleft R$

Dimostrazione (iniettivo)

(ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) ovvio

(i) $\Rightarrow$ (ii) "i funtori derivati di un esatto sono 0"

$$\text{Ext}^i(A, I) = (R^i \text{Hom}(-, I))(A)$$

$$P_A^\bullet \longrightarrow A \longrightarrow 0 \longrightarrow \dots \longrightarrow \text{Hom}(P_A^\bullet, I) \longrightarrow \text{Hom}(P_A^\bullet, I) \longrightarrow \text{Hom}(A, I) \longrightarrow 0 \quad \text{esatto}$$

$\text{Ext}^i(A, I)$ = coomologia di un complesso che è esatto

In ogni grado $\geq 1 = (0)$

(iv) $\Rightarrow$ (i) Applico il criterio di Baer:

$$I \text{ è iniettivo} \iff 0 \longrightarrow J \longrightarrow R \longrightarrow R/J \longrightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccc} \forall \varphi \downarrow & & \exists \psi \\ & I & \end{array}$$

$\text{Hom}(-, I)$

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(R/J, I) \longrightarrow \text{Hom}(R, I) \longrightarrow \text{Hom}(J, I) \longrightarrow \text{Ext}^1(R/J, I) = 0$$

$$\psi \xrightarrow{\text{surgettiva}} \psi \circ i = \psi|_J$$

□

complessi doppi

Def. Un complesso doppio (biregolare) è una collezione $A_{i,j}$ di moduli indicizzati da $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

con mappe

$$d_{i,j}^{\leftarrow} : A_{i,j} \rightarrow A_{i,j-1}$$

$$d_{i,j}^{\downarrow} : A_{i,j} \rightarrow A_{i-1,j}$$

tali che

$$d_{i,j-1}^{\leftarrow} \circ d_{i,j}^{\leftarrow} = 0, d_{i-1,j}^{\downarrow} \circ d_{i,j}^{\downarrow} = 0$$

$$\text{e ogni quadrato anti-commuta: } d_{i,j-1}^{\downarrow} \circ d_{i,j}^{\leftarrow} = -d_{i-1,j}^{\leftarrow} \circ d_{i,j}^{\downarrow}$$

Un morfismo di complessi doppi $\varphi_{i,j} : A_{i,j} \rightarrow B_{i,j}$ è una collezione di mappe che commutano con i differenziali.

$$\begin{array}{ccccc} A_{2,0} & \xleftarrow{d_{2,1}^{\leftarrow}} & A_{2,1} & \xleftarrow{d_{2,2}^{\leftarrow}} & A_{2,2} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_{1,0} & \xleftarrow{d_{1,1}^{\leftarrow}} & A_{1,1} & \xleftarrow{d_{1,2}^{\leftarrow}} & A_{1,2} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_{0,0} & \xleftarrow{d_{0,1}^{\leftarrow}} & A_{0,1} & \xleftarrow{d_{0,2}^{\leftarrow}} & A_{0,2} \end{array}$$

Def. Il complesso totale di un complesso doppio $A_{i,j}$ è $\text{Tot}(A_{i,j})$

$$\text{Tot}(A_{i,j})_n = \bigoplus_{i+j=n} A_{i,j}$$

$$\text{con } d_n : \bigoplus_{i+j=n} A_{i,j} \rightarrow \bigoplus_{i+j=n-1} A_{i,j}$$

$$A_{i,j} \xrightarrow{d_{i,j}^{\downarrow} \oplus d_{i,j}^{\leftarrow}} A_{i-1,j} \oplus A_{i,j-1}$$

Oss $\text{Tot} : \{\text{complessi doppi}\} \rightarrow \text{Ch}_\mathbb{Z}$ è un funtore esatto

Lemma Sia $\varphi_{i,j} : A_{i,j} \rightarrow B_{i,j}$ morfismo di complessi doppi biregolari t.c. $\forall i \varphi_{i,0} : A_{i,0} \rightarrow B_{i,0}$ è un quasi-isomorfismo. Allora $\text{Tot}(\varphi_{i,j}) : \text{Tot}(A_{i,j}) \rightarrow \text{Tot}(B_{i,j})$ è un quasi-isomorfismo.

Da questo deduciamo la simmetria di Tor

Prendiamo $P_{\bullet} \rightarrow A \rightarrow 0$ e $Q_{\bullet} \rightarrow B \rightarrow 0$ ris. proiettive

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \leftarrow & P_2 \otimes B & \leftarrow & P_2 \otimes Q_0 & \leftarrow & P_2 \otimes Q_1 & \leftarrow & P_2 \otimes Q_2 & \leftarrow & \dots \\ & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \\ 0 & \leftarrow & P_1 \otimes B & \leftarrow & P_1 \otimes Q_0 & \xrightarrow{\text{id} \otimes q_1} & P_1 \otimes Q_1 & \leftarrow & P_1 \otimes Q_2 & \leftarrow & \dots \\ & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \downarrow -\text{id} & & \\ 0 & \leftarrow & P_0 \otimes B & \leftarrow & P_0 \otimes Q_0 & \xrightarrow{\text{id} \otimes q_1} & P_0 \otimes Q_1 & \xrightarrow{\text{id} \otimes q_2} & P_0 \otimes Q_2 & \leftarrow & \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & A \otimes Q_0 & & A \otimes Q_1 & & A \otimes Q_2 & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & & & \end{array}$$

Considero il complesso doppio $(P_i \otimes Q_j)_{i,j \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}} = X_{i,j}$

$$\text{e il complesso doppio } Y_{i,j} = \left(\begin{array}{c} 0 \\ \downarrow \\ A \otimes Q_0 \end{array} \leftarrow \begin{array}{c} 0 \\ \downarrow \\ A \otimes Q_1 \end{array} \leftarrow \begin{array}{c} 0 \\ \downarrow \\ A \otimes Q_2 \end{array} \leftarrow \dots \right)$$

C'è un morfismo $\varphi_{..} : X_{..} \rightarrow Y_{..}$ che è 0 quasi ovunque,

tranne $P_0 \otimes Q_i \xrightarrow{p_0 \otimes \text{id}} A \otimes Q_i$, dove p_0 è la mappa $\dots \rightarrow P_1 \xrightarrow{p_1} P_0 \xrightarrow{p_0} A \rightarrow 0$.
Questa mappa $\varphi_{..}$ soddisfa le ipotesi del Lemma per le colonne.

$\Rightarrow \text{Tot}(\varphi_{..})$ è un isomorfismo fra l'omologia di $\text{Tot}(X_{..})$ e l'omologia di $\text{Tot}(Y_{..}) = (A \otimes Q_{..})$

$$\Rightarrow H_i(\text{Tot}(Y_{..})) = H_i(A \otimes Q_{..}) = (L_i(A \otimes -))(B)$$

Se ora pongo $Z_{..} = \begin{pmatrix} P_2 \otimes B \leftarrow 0 \leftarrow \dots \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ P_1 \otimes B \leftarrow 0 \leftarrow \dots \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ P_0 \otimes B \leftarrow 0 \leftarrow \dots \end{pmatrix}$

con lo stesso ragionamento traro

$$H_i(\text{Tot}(X_{..})) = H_i(\text{Tot}(Z_{..})) = H_i(P_0 \otimes B) = (L_i(- \otimes B))(A)$$

Lemma

$$0 \rightarrow A_{..} \rightarrow B_{..} \rightarrow C_{..} \rightarrow 0$$

$$\downarrow \alpha_{..} \quad \downarrow \beta_{..} \quad \downarrow \gamma_{..}$$

$$0 \rightarrow E_{..} \rightarrow F_{..} \rightarrow G_{..} \rightarrow 0 \quad \text{esatte corte di complessi.}$$

Se $\alpha_{..}, \gamma_{..}$ sono quasi-isomorfismi, allora

$\beta_{..}$ è quasi-isomorfismo.

DIMOSTRAZIONE

S.E.L. in omologia: $H_i(A_{..}) \rightarrow H_i(B_{..}) \rightarrow H_i(C_{..}) \rightarrow H_{i-1}(A_{..}) \rightarrow H_{i-1}(B_{..})$

$$\begin{array}{ccccccc} H_i(A_{..}) & \rightarrow & H_i(B_{..}) & \rightarrow & H_i(C_{..}) & \rightarrow & H_{i-1}(A_{..}) \rightarrow H_{i-1}(B_{..}) \\ \downarrow \alpha_{i..} & & \downarrow \beta_{i..} & & \downarrow \gamma_{i..} & & \downarrow \alpha_{i-1..} \quad \downarrow \beta_{i-1..} \\ H_i(E_{..}) & \rightarrow & H_i(F_{..}) & \rightarrow & H_i(G_{..}) & \rightarrow & H_{i-1}(E_{..}) \rightarrow H_{i-1}(F_{..}) \end{array}$$

Applico il Lemma del 5.

□

DIMOSTRAZIONE

Per induzione

$$H_n(\text{Tot}(A_{..})) \xrightarrow{H_n(\varphi_{..})} H_n(\text{Tot}(B_{..}))$$

Questa affermazione dipende da una quantità finita di informazioni (cioè solo da A_{ij} e B_{ij} con $0 \leq i, j \leq n$)

$$\begin{array}{ccc} \begin{matrix} 0 \\ \downarrow \\ 0 \\ \downarrow \\ 0 \end{matrix} & & \begin{matrix} 0 \\ \downarrow \\ 0 \\ \downarrow \\ 0 \end{matrix} \\ \downarrow & & \downarrow \\ r \left\{ A_{i,j} \right\} & \xrightarrow{\varphi_{..}} & r \left\{ B_{i,j} \right\} \end{array}$$

• Se $r=1$: $\text{Tot}(A_{..}) = A_{0..}$, $\text{Tot}(B_{..}) = B_{0..}$

$\text{Tot}(\varphi_{..}) = \varphi_{0..}$ quasi-isomorfismo

• $r \rightarrow r+1$:

$$0 \rightarrow A^{\leq r} \rightarrow A \rightarrow A_{r+1..} \rightarrow 0$$

$$\downarrow \varphi_{..}^{\leq r} \quad \downarrow \varphi_{..} \quad \downarrow \varphi_{r+1..}$$

$$0 \rightarrow B^{\leq r} \rightarrow B \rightarrow B_{r+1..} \rightarrow 0$$

per ind., $\text{Tot}(\varphi_{..}^{\leq r})$
è quasi-isom.

$\text{Tot}(\varphi_{r+1..}) = \varphi_{r+1..}$
è quasi-isom.

$\Rightarrow \text{Tot}(\varphi_{..})$ è quasi-isomorfismo

□

ES Se $\text{Tor}_1(R/I, M) = (0) \quad \forall I \triangleleft R$, allora M è piatto.

SOL Per assurdo, sia

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \text{ f.c.} \quad A \otimes M \rightarrow B \otimes M \text{ non iniettiva}$$

Se $a_1 \otimes m_1 + \dots + a_r \otimes m_r \in \text{Ker}$, posso sostituire A con $\langle a_1, \dots, a_r \rangle =: A'$

$$0 \rightarrow A' \rightarrow A : \text{ se } A' \otimes M \rightarrow A \otimes M \text{ non iniettiva ok, altrimenti } 0 \rightarrow A' \rightarrow B \text{ è un esempio}$$

$\Rightarrow$ wlog A fin.gen.

Similmente posso supporre B fin.gen.

$$B = A + \langle b_1, \dots, b_r \rangle$$

$$0 \rightarrow A \rightarrow A + \langle b_1 \rangle \rightarrow A + \langle b_1, b_2 \rangle \rightarrow \dots \rightarrow A + \langle b_1, \dots, b_r \rangle$$

Quindi wlog basta il caso $0 \rightarrow A \rightarrow A + \langle t \rangle \rightarrow \frac{A + \langle t \rangle}{A} \rightarrow 0$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 \rightarrow I \rightarrow R \xrightarrow{\quad} \frac{\langle t \rangle}{A + \langle t \rangle} \cong R/I \\ & & \parallel & \searrow \tilde{t} & & & \\ \text{Ho } 0 \rightarrow A \rightarrow A + \langle t \rangle \rightarrow R/I \rightarrow 0 & & & & & & \\ \otimes M \downarrow & \text{Tor}_1(R/I, M) \rightarrow A \otimes M \rightarrow (A + \langle t \rangle) \otimes M \rightarrow R/I \otimes M \rightarrow 0 \\ & \parallel & & & & & \\ & 0 & & & & & \end{array}$$

corollario Se R è PID, $\text{Tor}_1(R/(n), M) = (0) \iff M[n] = 0 \quad \forall n \in R$.

DIMOSTRAZIONE

$$0 \rightarrow R \xrightarrow{\cdot n} R \rightarrow R/(n) \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\cdot n} M \rightarrow 0 \quad \swarrow \otimes M$$

$$\Rightarrow \text{Tor}_1(R/(n), M) = M[n]$$

□

Oss. $\mathbb{Q}$ è $\mathbb{Z}$ -piatto

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow 0, \quad M \in \text{Ab} \text{ qualsiasi}$$

$$\Rightarrow 0 \rightarrow A \otimes M \rightarrow B \otimes M \rightarrow \mathbb{Q} \otimes M \rightarrow 0 \text{ esatta}$$

$$\text{Tor}_1(\mathbb{Q}, M)$$

• $\mathbb{Q}$ proiettivo? No, altrimenti

$$\mathbb{Q} \otimes T \cong \mathbb{Z}^{\otimes I} \Rightarrow \mathbb{Q} \text{ libero} \cong \mathbb{Z}^{\otimes J} \text{ assurdo}$$

ES $(R, \mathcal{P})$ locale Noetheriano, $k = R/\mathcal{P}$, M mod fin.gen. piatto (o $\text{Tor}_1(k, M) = 0$). Allora M è libero.

SOL $M \otimes k = \langle \bar{m}_1, \dots, \bar{m}_n \rangle$

$$0 \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow R^n \xrightarrow{e_i} M \rightarrow 0$$

$\otimes k$

$$0 \rightarrow \mathcal{Q} \otimes k \rightarrow R^n \otimes k \xrightarrow{\sim} M \otimes k \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \mathcal{Q} \otimes k = 0 \xrightarrow{\text{Nak}} \mathcal{Q} = 0 \Rightarrow M \cong R^n$$

Teorema di struttura per moduli finitamente generati su R Dedekind

M R -mod fin.gen.

$$M = M_{\text{tors}} \oplus M/M_{\text{tors}} \quad \text{dove } M_{\text{tors}} = \{m \in M \mid \exists r \in R, r \neq 0, r \cdot m = 0\}$$

$$0 \longrightarrow M_{\text{tors}} \longrightarrow M \longrightarrow \underbrace{M/M_{\text{tors}}}_{\text{proiettivo?}} \longrightarrow 0$$

Sia M fin.gen. e libero da torsione. Allora M è proiettivo.

1) Proiettivo $\iff$ Soc. libero

2) P primo di R ; lavoro con $M \otimes R_P$, libero da torsione

3) Se $\text{ht } P = 1$, R_P è un DVR

$\implies M \otimes R_P$ è piatto $\implies$ libero

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow \text{Frac}(R) \xrightarrow{\otimes M} 0 \longrightarrow M \longrightarrow \underbrace{M \otimes_R \text{Frac}(R)}_{k^n}$$

Fissiamo una base $m_1, \dots, m_n$ di $M \otimes k$

$I = \{x \in k \mid x \cdot m_i \in M\}$ è un ideale frazionario di R

$$0 \longrightarrow \underbrace{I}_{x \mapsto x m_i} \longrightarrow M \longrightarrow M' \longrightarrow 0 \implies I \text{ fin.gen.}$$

M' è fin.gen. e libero da torsione: se $x \cdot \bar{m} = 0$, dove $\bar{m} \in M/I m_i$, $x \neq 0$

$$\iff x m \in m_i I \cdot x m = i m_i \iff m = \frac{i}{x} m_i \implies \frac{i}{x} \in I \implies m \in I m_i \implies \bar{m} = 0$$

$$\implies M \simeq I \oplus M'$$

Per induzione, $M \simeq I_1 \oplus \dots \oplus I_r$

$$\simeq R^{r_1} \oplus I \quad \text{dove } I = I_1 \dots I_r$$

Sia ora M un modulo di torsione fin.gen.

$$M = \langle m_1, \dots, m_r \rangle \quad \text{Ann}(m_i) \ni x_i \neq 0 \implies a := \prod m_i \text{ annulla } x_i \forall i \implies aM = (0)$$

M è $R/(a)$ -modulo

$$(a) = \prod P_i^{e_i} \quad \text{con } P_i \text{ primi}$$

$$A/(a) \simeq \prod A/P_i^{e_i}$$

$$M = M \otimes_A A/(a) = M \otimes (\prod A/P_i^{e_i}) = \prod (M/P_i^{e_i} M)$$

$$\text{Fisso } i: A/P_i^{e_i} \simeq A_P/(P A_P)^{e_i} \implies M/P_i^{e_i} M \text{ è un } A_P\text{-modulo}$$

$\downarrow$

$\hookrightarrow \text{DVR} \Rightarrow \text{PID}$

$$\oplus A_P/(P A_P)^{e_i} \simeq \oplus A/P^{e_i}$$

$$\text{oppure } 0 \longrightarrow A/P^{e_i} \longrightarrow M \xrightarrow{x_i} x_i M$$

è iniettiva

e si mostra che A/P^{e_i} è iniettivo su se stesso.

coomologia di gruppo

def. G gruppo finito

Un G -modulo è un gruppo abeliano A munito di un omomorfismo $G \rightarrow \text{Aut } A$

esempio

L/k est. con gruppo G

Sia $(L, +)$ sia $(L^\times, \cdot)$ sono G -moduli.

def. L'anello di gruppo è

$$\mathbb{Z}[G] = \{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{Z} \}$$

esempio

$$\text{Se } G = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}[G] = \frac{\mathbb{Z}[t]}{(t^3-1)}$$

$$a_0[0] + a_1 \frac{1}{t} + a_2 \frac{1}{t^2}$$

$$\mathbb{Z}[\mathbb{Z}] = \mathbb{Z}[t, \frac{1}{t}]$$

$$\begin{array}{ccc} G\text{-modulo} & = & \mathbb{Z}[G]\text{-modulo} \\ A & & M \text{ grp abeliano} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \varphi: G \rightarrow \text{Aut } A & & \psi: \mathbb{Z}[G] \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}} M \\ & & G \subseteq \mathbb{Z}[G]^\times \end{array}$$

$$(\sum a_g g)(\sum b_h h) = \sum_{gh=s} (\sum_{g,h=s} a_g b_h) s \quad (\text{convoluzione})$$

def. $A \mapsto A^G = \{a \in A \mid ga = a \ \forall g \in G\} \subset A$

$$\mathbb{Z}[G]\text{-mod} \longrightarrow A^G = \mathbb{Z}\text{-mod}$$

Oss Sia $\mathbb{Z}$ il G -mod banale

$$\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A) = \{ \varphi_a: \mathbb{Z} \rightarrow A : \varphi_a(1) = a, a \in A^G \} = A^G$$

$$\varphi: \mathbb{Z} \xrightarrow{1} A$$

$$\varphi(gn) = g\varphi(n) \quad \forall n$$

$$n\varphi(1) = ng\varphi(1) \iff \varphi(1) = g\varphi(1) \quad \forall g$$

def. $H^i(G, A) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^i(\mathbb{Z}, A)$

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$$

$$g \cdot \alpha(a) = \alpha(ga), \quad g \cdot \beta(b) = \beta(gb)$$

$$\leadsto 0 \rightarrow A^G \rightarrow B^G \rightarrow C^G \rightarrow H^1(G, A) \rightarrow H^1(G, B) \rightarrow \dots$$

Risoluzione proiettiva di $\mathbb{Z}$ come $\mathbb{Z}[G]$ -modulo

$$\dots \rightarrow \mathbb{Z}[G^3] \xrightarrow{\delta_1} \mathbb{Z}[G^2] \rightarrow \mathbb{Z}[G] \xrightarrow[\substack{g \mapsto 1}]{\delta_0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

$(s_0, -, s_i) \in G^{u_i}$
 $\delta_i(s_0, -, s_i) = \sum_{j=0}^i (-1)^j (s_0, -, \hat{s}_j, -, s_i)$

- δ_i sono omomorfismi di G -moduli
- $\mathbb{Z}[G^i]$ è uno $\mathbb{Z}[G]$ -mod libero
- $\delta_i \circ \delta_{i+1} = 0$
- esattezza
- $\mathbb{Z}[G^i]$ è G -mod con $g \cdot (g_0, -, g_{i-1}) = (gg_0, -, gg_{i-1})$
 $\mathbb{Z}[G^i]$ è libero su $\mathbb{Z}[G]$: una base è
 $(id, s_1, -, s_{i-1})$
 $\oplus \mathbb{Z}[G] \cdot (id, s_1, -, s_{i-1}) = \mathbb{Z}[G^i]$
- $\varphi(\sum agg x) = \sum agg \varphi(x)$
 δ_i è omomorfismo di G -moduli.
 $g \cdot \delta_i(s_0, -, s_i) = \sum_{j=0}^i (-1)^j (gs_0, -, g\hat{s}_j, -, gs_i) = \delta_i(gs_0, -, gs_i) = \delta_i(g \cdot (s_0, -, s_i))$
- $\delta_i \circ \delta_{i+1} = 0$
 $\delta_i(\delta_{i+1}(s_0, -, s_{i+1})) = \delta_i(\sum_{j=0}^{i+1} (-1)^j (s_0, -, \hat{s}_j, -, s_{i+1})) = \sum_{j=0}^{i+1} (-1)^j (\sum_{k=0}^j (-1)^k (s_0, -, \hat{s}_k, -, \hat{s}_j, -, s_{i+1}) + \sum_{k=j+1}^{i+1} (-1)^{k+1} (s_0, -, \hat{s}_j, -, \hat{s}_k, -, s_{i+1})) = 0$

$$\dots \rightarrow \mathbb{Z}[G^3] \rightarrow \mathbb{Z}[G^2] \rightarrow \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\delta_0} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

$$\dots \rightarrow \mathbb{Z}[G^3] \xrightarrow{k_1} \mathbb{Z}[G^2] \xrightarrow{k_0} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{k_{-1}} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

$$\text{t.c. } k_{i-1} \circ \delta_i + \delta_{i+1} \circ k_i = id - 0$$

1° costruzione: $k_i((s_0, -, s_i)) = (g, s_0, -, s_i)$ (non è una mappa di G -moduli)

$$k_{i-1}(\delta_i(s_0, -, s_i)) = k_{i-1}(\sum_{j=0}^i (-1)^j (s_0, -, \hat{s}_j, -, s_i)) = \sum_{j=0}^i (-1)^j (g, s_0, -, \hat{s}_j, -, s_i)$$

$$\delta_{i+1}(k_i(s_0, -, s_i)) = (s_0, -, s_i) + \sum_{j=1}^{i+1} (-1)^j (g, s_0, -, \hat{s}_{j-1}, -, s_i) = (s_0, -, s_i) + \sum_{j=0}^i (-1)^{j+1} (g, s_0, -, \hat{s}_j, -, s_i)$$

$$\Rightarrow id \underset{\text{omot.}}{\sim} 0 \Rightarrow H^i(\mathbb{Z}[G]) = (0)$$

2° costruzione: $k_i((s_0, -, s_i)) = \sum_{g \in G} (g, s_0, -, s_i)$

è omotopia tra 0 e $|G| \cdot id$

Ora è una mappa di G -moduli:

$$k_i(h \cdot (s_0, -, s_i)) = \sum_{g \in G} (g, hs_0, -, hs_i) = \sum_{g \in G} (hg, hs_0, -, hs_i) = h \cdot k_i((s_0, -, s_i))$$

Per calcolare $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^i(\mathbb{Z}, M)$, possiamo prendere l'omologia di

$$0 \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], M) \xrightarrow{\delta_1^*} \text{Hom}(\mathbb{Z}[G^2], M) \xrightarrow{\delta_2^*} \dots$$

$$0 \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], M) \xrightarrow[\substack{\text{Hom}(-, M)(k_i)}]{\delta_1^*} \text{Hom}(\mathbb{Z}[G^2], M) \xrightarrow{\delta_2^*} \dots$$

omotopia tra 0 e $|G| \cdot id$

Su $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^i(\mathbb{Z}, M)$, le mappe 0 e $|G| \cdot id$ coincidono (per $i \geq 1$)

teorema $\forall i \geq 1$ $H^i(G, M)$ è un gruppo abeliano di $|G|$ -torsione.

corollario Se $(|G|, |M|) = 1$, allora $H^i(G, M) = (0) \quad \forall i \geq 1$.

DIMOSTRAZIONE

Considero la moltiplicazione per $|G|$ da $H^i(G, M)$ in sé. È zero per il Teo. D'altra parte, $\cdot |G| : M \rightarrow M$ è isomorfismo:

$$\text{Ker}(\cdot |G|) = \{x \text{ di ord } | \#G \} \cap \{x \text{ di ord } | \#M \} = \{e\}$$

$$a \# G + b \# M = 1 \Rightarrow [a] [\#G] = \text{id}_M$$

$$[a] \cdot M \rightarrow M \text{ induce } H^i(G, [a]) : H^i(G, M) \rightarrow H^i(G, M)$$

$$\dots \leftarrow I_M^1 \leftarrow I_M^0 \leftarrow M \leftarrow 0$$

$$\downarrow [a] \quad \downarrow [a] \quad \downarrow [a]$$

$$\dots \leftarrow I_M^1 \leftarrow I_M^0 \leftarrow M \leftarrow 0$$

$\Rightarrow$ la mappa indotta da $[a]$ su $H^i(G, M)$ è $[a]$.

$$[a] [\#G] = \text{id} \xrightarrow{\cong H^i(G, M)} [a] \circ [\#G] = \text{id}$$

$$\Rightarrow [\#G] \text{ è bigettiva su } H^i(G, M) \Rightarrow H^i(G, M) = (0).$$

□

Calcolo di H^1 e H^2

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \rightarrow & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], M) & \xrightarrow{\delta_1^*} & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G^2], M) & \xrightarrow{\delta_2^*} & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G^3], M) & \rightarrow \dots \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ & M & \xrightarrow{\delta_1^*} & M^G & \xrightarrow{\delta_2^*} & M^{G^2} & \\ & \#(1) & & \begin{array}{c} G \rightarrow H \\ g \mapsto \#(1, g) = c_g \end{array} & & & \end{array}$$

Oss La base "standard" che si prende è $(1, s_1, s_1 s_2, s_1 s_2 s_3, \dots)$

$$\tilde{\delta}_1^*(f_m) (f_m \circ \delta_1)(1, g) = f_m(g) - f_m(1) = g \cdot m - m$$

dove $f_m(1) = m$

$$\delta_1^*(f_m) = f_m \circ \delta_1$$

$$\tilde{\delta}_2^*(c_g) = 0 \iff f \circ \delta_2(1, s_1, s_1 s_2) = 0 \quad \forall s_1, s_2 \in G \iff f(s_1, s_1 s_2) - f(1, s_1 s_2) + f(1, s_1) = 0$$

$$\iff s_1 f(1, s_2) - f(1, s_1 s_2) + f(1, s_1) = 0 \iff c_{s_1} + s_1 \cdot c_{s_2} = c_{s_1 s_2}$$

Conclusione:

$$H^1(G, M) = \frac{\{c \in M^G \mid c(s_1, s_2) = c(s_1) + s_1 c(s_2)\}}{\{g \mapsto gm - m \mid m \in M\}}$$

Oss Se M è un G -mod banale, $H^1(G, M) = \text{Hom}(G, M)$

$$c : \mathbb{Z}[G^3] \rightarrow M \iff \begin{array}{c} G^2 \rightarrow M \\ f_c : (s_1, s_2) \mapsto c(1, s_1, s_1 s_2) \end{array}$$

$$s_1 \cdot f_c(s_2, s_3) - f_c(s_1, s_2, s_3) + f_c(s_1, s_2 s_3) - f_c(s_1, s_2) = 0 \quad (2\text{-cociclo})$$

$$s_1 \cdot f_c(s_2) - f_c(s_1, s_2) + f_c(s_1) = 0 \quad (2\text{-cobordo})$$

def Un 2-cociclo si dice normalizzato se

$$c(\text{id}, \tau) = c(s, \text{id}) = 0 \quad \forall s, \tau \in G$$

ex (1) Se c è un 2-cociclo e $c(\text{id}, \text{id}) = 0$, allora è normalizzato.

(2) Ogni 2-cociclo sta nella stessa classe di omologia di un 2-cociclo normalizzato

Estensioni di gruppi

Def. G gruppo, A gruppo abeliano

Un'estensione di G tramite A è una successione esatta

$$1 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$$

Due estensioni

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \rightarrow & A & \rightarrow & E & \rightarrow & G \rightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \rightarrow & A & \rightarrow & E' & \rightarrow & G \rightarrow 1 \end{array}$$

sono isomorfe se $\exists \varphi: E \rightarrow E'$ omomorfismo di gruppi che fa commutare.

Oss φ è automaticamente isomorfismo.

Obiettivo (i) Ogni estensione definisce un'azione di G su A

(ii) $\text{Ext}(G, A_*) = \{ \text{estensioni di } G \text{ tramite } A \text{ con una data azione di } G \text{ su } A \}$

$$\begin{array}{c} \downarrow 1.1 \\ H^2(G, A_*) \end{array}$$

Oss $1 \rightarrow A \xrightarrow{\iota} E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$

Se ho $h: \ker h \triangleleft E, \ker \pi \triangleleft E \Rightarrow E \cong A \times G$

Se ho $s: (A) \triangleleft E, s(G) \triangleleft E, (A) \cap s(G) = \{e\}, (A) \cdot s(G) = E$
 $\Rightarrow E \cong A \rtimes G$

In questo caso, E si dice split.

$$1 \rightarrow A \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1$$

s sezione insiemeistica $s: G \rightarrow E$ t.c. $\pi \circ s = \text{id}_G$

Def. $g * a := s(g) a s(g)^{-1} \in A$

E' ben posta: se scelgo un'altra sezione $s': G \rightarrow E$
 $g \mapsto s(g) c(g)$

$$s'(g) a s'(g)^{-1} = s(g) c(g) a c(g)^{-1} s^{-1}(g) \stackrel{A \text{ abel.}}{=} s(g) a s(g)^{-1}$$

teorema C'è una biiezione tra $H^2(G, A)$ (dove A ha una fissata struttura di G -modulo) e l'insieme delle estensioni di G tramite A (a meno di isomorfismo) con la proprietà che l'azione indotta di G su A è quella fissata.

Sotto questa biiezione, le estensioni split corrispondono a $0 \in H^2(G, A)$.

$$1 \rightarrow A \rightarrow E \xrightarrow{\pi} G \rightarrow 1 \rightsquigarrow c: G \times G \rightarrow A$$

$$(g, h) \mapsto s(g) s(h) s(gh)^{-1}$$

Verifiche: 1) c è un 2-cociclo

2) $[c] \in H^2(G, A)$ non dipende dalla scelta di s

3) $\text{Ext}(G, A_*) \rightarrow H^2(G, A)$ è iniettiva + surg.

3) se l'est. è split, $[c] = 0$

Costruzione:

G, A , azione di G su A . Fisso $C: G \times G \rightarrow A$ normalizzato

$E := A \times G$ (Se E esiste, i suoi elementi sono della forma $a \cdot s(g)$)

con legge $a_1 \cdot s(g_1) \cdot a_2 \cdot s(g_2) = a_1 \cdot s(g_1) a_2 \cdot s(g_1)^{-1} \cdot s(g_1) \cdot s(g_2) = a_1 \cdot (g_1 * a_2) \cdot s(g_1) \cdot s(g_2) \cdot s(g_1 g_2)^{-1} \cdot s(g_1 g_2)$
di gruppo: $= a_1 \cdot (g_1 * a_2) \cdot C(g_1, g_2) \cdot s(g_1, g_2)$

$$(a_1, g_1) \cdot (a_2, g_2) = (a_1 + g_1 * a_2 + C(g_1, g_2), g_1 g_2)$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Oss} & 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & & A \times G & & \dots & & s: g \mapsto (id, g) \\ & & & & & \downarrow & & & & \\ & & & & & a \mapsto (a, id_A) & & & & \\ & & & & & (a, g) \mapsto g & & & & \end{array}$$

$$(id, g_1) * (id, g_2) * (id, g_1 g_2)^{-1} = (C(g_1, g_2), g_1 g_2) (id, g_1 g_2)^{-1} = (C(g_1, g_2), id)$$

corollario

$1 \longrightarrow A \longrightarrow E \xrightarrow{\pi} G \longrightarrow 1$ successione esatta di gruppi
con A abeliano e $(|A|, |G|) = 1$.

Allora la successione spezza: $\exists s: G \rightarrow E$ omomorfismo di gruppi,
sezione di π , t.c. $E \cong A \times s(G)$.

DIMOSTRAZIONE

E induce un'azione di G su A

le est. con quella azione sono parametrizzate
da $H^2(G, A_*) = (0) \Rightarrow E$ è split. □

Lemma di Fratini

G gruppo finito, $N \trianglelefteq G$, P p -Sylow di N .

(i) $G = N \cdot N_G(P)$

(ii) Se $P \trianglelefteq N$, anche $P \trianglelefteq G$ (cioè $N_G(P) = G$).

DIMOSTRAZIONE

(i) Sia $g \in G$. Considero $gPg^{-1} \cong gNg^{-1} = N$

$\Rightarrow gPg^{-1}$ è p -Sylow di N

Per Sylow, $\exists n \in N$ t.c. $gPg^{-1} = nPn^{-1} \Rightarrow n^{-1}gPg^{-1}n = P$

$$\Rightarrow n^{-1}g \in N_G(P) \Rightarrow g = \underset{N}{n} \cdot \underset{N_G(P)}{x}$$

(ii) $gPg^{-1} = \text{un } p\text{-Sylow di } N$, ma l'unico p -Sylow di N è P
 $\Rightarrow gPg^{-1} = P \Rightarrow P \trianglelefteq G$. □

ES Sia S una R -alg piatta. Allora

(ii) $\text{Tor}_i^R(M, N) \otimes_R S \cong \text{Tor}_i^S(M \otimes_R S, N \otimes_R S) \quad \forall M, N \in \text{Mod } R, \forall i \geq 0$

(i) Se P è R -mod proiettivo, allora $P \otimes_R S$ è S -mod proiettivo

SOL (i) $\exists Q$ t.c. $P \oplus Q \cong R^{\oplus I} \implies (P \otimes_R S) \oplus (Q \otimes_R S) \cong S^{\oplus I}$

(ii) $i=0$: $M \otimes_R N \otimes_R S \cong (M \otimes_R S) \otimes_S (S \otimes_R N)$

$i=1$ $0 \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow 0$ esatta

$$\begin{array}{c} \otimes S \left(\begin{array}{c} 0 \rightarrow Q \otimes S \rightarrow P \otimes S \rightarrow N \otimes S \rightarrow 0 \\ \otimes_S (M \otimes_S) \left(\begin{array}{c} (M \otimes S) \otimes (Q \otimes S) \rightarrow (M \otimes S) \otimes (P \otimes S) \rightarrow (M \otimes S) \otimes (N \otimes S) \rightarrow 0 \\ \uparrow \\ \text{Tor}_1^S(M \otimes S, N \otimes S) \leftarrow \text{Tor}_1^S(M \otimes S, P \otimes S) \\ \parallel \\ 0 \end{array} \right) \end{array} \right. \end{array}$$

$\implies \text{Tor}_1^S(M \otimes S, N \otimes S) \cong \text{Ker}((M \otimes S) \otimes (Q \otimes S) \rightarrow (M \otimes S) \otimes (P \otimes S))$

Ripartendo:

$$\begin{array}{c} 0 \rightarrow \text{Tor}_1^R(M, N) \rightarrow M \otimes Q \rightarrow M \otimes P \rightarrow M \otimes N \rightarrow 0 \\ \otimes S \left(\begin{array}{c} 0 \rightarrow \text{Tor}_1^R(M, N) \otimes S \rightarrow M \otimes Q \otimes S \rightarrow M \otimes P \otimes S \rightarrow M \otimes N \otimes S \rightarrow 0 \\ \implies \text{Tor}_1^R(M, N) \otimes S \cong \text{Ker}(M \otimes Q \otimes S \rightarrow M \otimes P \otimes S) \end{array} \right. \end{array}$$

$i \geq 1$: la successione esatta lunga continua

$0 \leftarrow \text{Tor}_1(M \otimes S, Q \otimes S) \leftarrow \text{Tor}_2(M \otimes S, N \otimes S) \leftarrow \text{Tor}_2(M \otimes S, P \otimes S) = (0)$

ossia $0 \rightarrow \text{Tor}_{i+1}^S(M \otimes S, N \otimes S) \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_i^S(M \otimes S, Q \otimes S) \rightarrow 0$

l'ip. induttiva

$\text{Tor}_{i+1}^R(M, N) \otimes_R S \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_i^R(M, Q) \otimes_R S$

segue dalla s.e.l. per $0 \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow N \rightarrow 0$

ES $R = \mathbb{C}[t^2, t^3]$

$a \in \mathbb{C}, M_a = \{f(t) \in \mathbb{C}[t] \mid f'(0) = a f(0)\}$

M_a è un modulo su R : $r f \in M_a \quad r f(0) = r(0) f(0)$

$(r f)'(0) = r'(0) f(0) + r(0) f'(0) = r(0) a f(0)$

M_a è fin. gen: $M_a = \langle 1+at, t^2 \rangle_R$

Mostriamo che $t^m \in \langle 1+at, t^2 \rangle_R \quad \forall m \geq 2$

$t^m = t^m(1+at) - at^{m+1}(1+at) + a^2 t^m \cdot t^2$

Oss. M_0 è libero: $M_0 = \langle 1 \rangle_R = R$

M_a è libero solo se $a=0$: $M_a = \langle g(t) \rangle \implies \deg g \leq 1$

Supponiamo $a \neq 0$ Se $g(0)=0, g'(0)=0 \implies g=0$. $\nless$

Se $g(0) \neq 0 \implies g(t) = 1+at$ ma t^2 non è multiplo di $1+at$ $\nless$

Mostriamo che M_a è localmente libero:

basta vedere che $1+at$ e t^2 differiscono per molt. per un elemento di $R_p \quad \forall p$.

Se $t^2 \notin P, 1+at = \frac{t^2(1+at)}{t^2} \cdot t^2$

Similmente, se $t^2(1+at) \notin P$, allora $t^2 = \frac{t^4}{t^2(1+at)}(1+at)$

Se $t^2, t^2(1+at) \in P \xrightarrow{a \neq 0} P = (t^2, t^3)$ è massimale

$t^2 = \frac{(1-at+a^2t^2)t^2}{1+a^2t^2}(1+at)$

Oss $M_a \otimes M_b \cong M_{a+b}$

$$M_a \times M_b \longrightarrow M_{a+b}$$

$$(f_a, f_b) \longmapsto f_a f_b$$

$$(f_a f_b)'(0) = f_a'(0) f_b(0) + f_a(0) f_b'(0) = (a+b) f_a(0) f_b(0)$$

È isomorfismo:

• surgettività: $t^2 t^2 = t^4 \in \text{Im}$

$$t^m \in \text{Im} \quad \forall m \geq 4$$

$$t^3 = (1+at)t^3 - at^4$$

$$t^2 = (1+at)t^2 - at^3$$

$$1+(a+b)t = (1+at)(1+bt) - abt^2$$

• iniettività: Localizziamo

Oss $M_a \otimes M_{-a} \cong M_0 = \mathbb{R}$

Oss $M_a \cong M_b \implies M_a \otimes M_{-a} \cong M_b \otimes M_{-a}$

$$\implies b-a=0$$

Quindi $\mathbb{C} \hookrightarrow \text{Pic}(\mathbb{R})$
 $\alpha \longmapsto M_\alpha$

**Teorema 90
di Hilbert**

Sia L/K est. di Galois con gruppo G .
 Allora $H^1(G, L^\times) = (0)$.

Es $K^\times = \{a^n \mid a \in K^\times\}$

$$\mathbb{Q}(\zeta_{24})^{\times 3} \cap \mathbb{Q}^\times = \mathbb{Q}^\times$$

$$1 \longrightarrow \langle \zeta_3 \rangle \xrightarrow{i} \mathbb{Q}(\zeta_{24})^\times \xrightarrow{\alpha \mapsto \alpha^3} \mathbb{Q}(\zeta_{24})^{\times 3} \longrightarrow 1 \quad \text{esatta di } G\text{-moduli}$$

$$G := \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{24})/\mathbb{Q})$$

Prendiamo $H^0(G, -)$

$$1 \longrightarrow \{1\} \longrightarrow \mathbb{Q}^\times \longrightarrow \mathbb{Q}(\zeta_{24})^{\times 3} \cap \mathbb{Q}^\times \longrightarrow H^1(G, \langle \zeta_3 \rangle) = 1$$

$$|G| = \phi(24) = \phi(3)\phi(8) = 2 \cdot 4 \quad \uparrow$$

Es $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q} \quad a+bi \in \mathbb{Q}(i)^\times \text{ con } a^2+b^2=1$

$$G = \text{Gal}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}) = \langle g \rangle$$

$$c: G \longrightarrow \mathbb{Q}(i)^\times \quad c(\sigma) = c(\sigma) \circ c(\tau)$$

$$1 \longmapsto 1$$

$$g \longmapsto a+bi$$

$$\bullet \sigma = \text{id}: c(\tau) = c(\tau) \quad \forall$$

$$\bullet \tau = \text{id}: c(\sigma) = c(\sigma) \cdot 1 \quad \forall$$

$$\bullet \sigma = \tau = g: c(1) = (a+bi) \circ (a+bi) = a^2+b^2 = 1$$

$$[c] \in H^1(G, \mathbb{Q}(i)^\times) = \{1\}$$

$$\implies c \text{ è un cobordo: } \exists x+iy \in \mathbb{Q}(i) \text{ t.c. } c(g) = \frac{g(x+iy)}{x+iy}$$

$$\implies a+bi = \frac{x-iy}{x+iy} = \frac{x^2-y^2+2ixy}{x^2+y^2}$$

$$A^2+B^2=C^2 \quad \left(\frac{A}{C}\right)^2 + \left(\frac{B}{C}\right)^2 = 1$$

Teoria di Kummer

K campo di caratteristica p , n un intero non divisibile per p .

Supponiamo $\zeta_n \in K$.

Classifichiamo le estensioni L/K di Galois con $\text{Gal}(L/K)$ ciclico di ord (n) .

$$[\exists \alpha \in K^* \text{ t.c. } L = K(\sqrt[n]{\alpha})]$$

$$1 \longrightarrow \langle \zeta_n \rangle \longrightarrow K^* \xrightarrow{\alpha \mapsto \alpha^n} K^* \longrightarrow 1 \quad \text{successione esatta di } G = \text{Gal}(K/k) \text{ -moduli}$$

$$1 \longrightarrow \langle \zeta_n \rangle \longrightarrow K^* \longrightarrow K^* \xrightarrow{\partial} H^1(G, \langle \zeta_n \rangle) \longrightarrow 0$$

$$K^*/K^{*n} \cong H^1(G, \langle \zeta_n \rangle) = \text{Hom}(G, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

$$\left. \begin{array}{c} \bar{K} \\ \swarrow \text{Ker } \varphi \\ K \\ \searrow \text{Im } \varphi \end{array} \right\} G \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

$$\partial(\beta) = \left(g \mapsto \frac{\partial(\beta^{g/n})}{\beta^{g/n}} \right)$$

$$\Rightarrow \bar{K}^{\text{Ker } \varphi} = K(\sqrt[n]{\beta})$$

Risoluzione proiettiva di $\mathbb{Z}$ come $\mathbb{Z}[G]$ -modulo, $G = \langle \sigma \rangle$

$$|G| = n$$

$$\dots \longrightarrow \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\cdot(\sigma-1)} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\cdot N} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{\cdot(\sigma-1)} \mathbb{Z}[G] \xrightarrow{g \mapsto 1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

$$\mathbb{Z}[G] = \frac{\mathbb{Z}[\sigma]}{(\sigma^n - 1)} \ni a_0 + a_1\sigma + a_2\sigma^2 + \dots + a_{n-1}\sigma^{n-1}$$

$$(a_0 + a_1\sigma + \dots + a_{n-1}\sigma^{n-1})(\sigma - 1) = 0 \Leftrightarrow a_0\sigma + a_1\sigma^2 + \dots + a_{n-1}\sigma^n = a_0 + a_1\sigma + \dots + a_{n-1}\sigma^{n-1}$$

$$\text{Ker}(\cdot(\sigma-1)) = \{a(\underbrace{1+\sigma+\dots+\sigma^{n-1}}_{=N}) \mid a \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}[G] \cdot N$$

$$(c_0 + c_1\sigma + \dots + c_{n-1}\sigma^{n-1}) \cdot N = (c_0 + c_1 + \dots + c_{n-1}) \cdot N$$

Chi è $\text{Ker}(\cdot N)$? Sono i "polinomi" in σ che si annullano in $1 \rightarrow \sigma \rightarrow \dots \rightarrow \sigma^{n-1} \rightarrow 1$

Conseguenza: calcolo di $H^i(G, A)$ se $G = \langle \sigma \rangle$

$$\begin{array}{ccccccc} \leftarrow & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], A) & \xleftarrow{(\cdot N)^*} & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], A) & \xleftarrow{(\cdot(\sigma-1))^*} & \text{Hom}(\mathbb{Z}[G], A) & \xrightarrow{\varphi} 0 \\ & \uparrow \text{N}^* & & \uparrow \varphi(\sigma-1) & & \uparrow \varphi(1) & \\ & A & \xleftarrow{N^*} & A & \xleftarrow{\varphi(\sigma-1)} & A & \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} x + \sigma x + \sigma^2 x + \dots & \xleftarrow{N^*} & x \\ \sigma x + \sigma^2 x + \dots & \xleftarrow{\varphi(\sigma-1)} & \sigma x - x \end{array}$$

$$H^0(G, A) = A^G$$

$$H^i(G, A) = \begin{cases} A^G & \text{per } i=0 \\ \text{Ker}(N: A \rightarrow A) / \text{Im}(\sigma-1) & \text{per } i \geq 1 \text{ dispari} \\ A^G / N(A) & \text{per } i \geq 2 \text{ pari} \end{cases}$$

$$\text{ES } H^2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \frac{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}}{\{0\}} = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longleftrightarrow \text{Ext}(G, A)$$

$$1 \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow E \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

La classe non banale corrisponde a $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

$$C: G \times G \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \rightsquigarrow \quad E = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{ccc} (0, *) & \mapsto & 0 \\ (*, 0) & \mapsto & 0 \\ (1, 1) & \mapsto & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} (a_1, g_1) * (a_2, g_2) = (a_1 + a_2 + C(g_1, g_2), g_1 g_2) \\ (1, 1) * (1, 1) = (1, 0) \end{array}$$

Teorema di Schur-Zassenhaus

Sia G gruppo finito, $N \triangleleft G$. Supponiamo $(|N|, |G/N|) = 1$.
Allora $G \cong N \rtimes G/N$.

Equivalentemente: $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow G/N \rightarrow 1$
 $\nearrow$ Es. om. di gruppi.

Oss Se N è abeliano: già visto.

DIMOSTRAZIONE

Per induzione su $|G| = a \cdot b$, $a = |N|$, $b = |G/N|$.

Se $|G|=1$, ok; anche se $a=1$ o $b=1$.

Passo 1 Posso separare N minimale tra i sgrg normali di G .

Se esiste $1 \in N' \subseteq N, N' \triangleleft G$, considero

$$1 \longrightarrow \underbrace{N/N'}_{\#N/\#N'} \longrightarrow G/N' \longrightarrow \underbrace{G/N}_G \longrightarrow 1$$

Por hp. ind., G/N' contiene un sgr $K/N' \cong G/N$ (con $K < G, K \geq N'$).

Ora $|K| = |G/N| \cdot |N'| < |G|$

$$1 \longrightarrow N' \longrightarrow K \longrightarrow K/N' \longrightarrow 1$$

e riapplico l'hp. ind: $\#N'/\#N$ è coprimo con $\#G/\#N$

$\Rightarrow K$ contiene sgp isomorfo a $G/N \Rightarrow G$ contiene sgp isomorfo a G/N .

Passo 2 Posso supporre N sia un p -gruppo.

Fisso $p \mid \#N$ e Fisso P p -Sylow di N . Per Frattini,

$$G = N \cdot N_G(P) \implies G/N \cong N_G(P)/N \cap N_G(P)$$

Se $N_G(P) \neq G \iff P \ntrianglelefteq N$ (e quindi in particolare $N \cap N_G(P) \neq N$)

considero $1 \rightarrow N \cap N_G(P) \rightarrow \underline{N_G(P)} \rightarrow G/N \rightarrow 1$
 ha card $< \#G$

$\Rightarrow$ per hp. ind. $\exists$ sgp di $N_G(P)$ isomorfo a G/N .

Se invece $N_G(P) = G \Rightarrow P \triangleleft G \Rightarrow P \triangleleft N$

Siccome N è minimale, $P=N$.

Passo 3 $1 \notin Z(P) \subseteq P = N \triangleleft G \implies Z(P) \triangleleft G$

Per minimalità di N , $Z(P) = P$.

Passo 4 Basta farlo per $N = \mathbb{Z}(P)$ abeliano.



Ext ed estensioni

Def. Sia R un anello con unita, A, C due R -moduli.

Un'estensione di C tramite A è una successione esatta di R -moduli

$$0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow 0$$

Due estensioni E, E' sono isomorfe se $\exists \varphi: E \rightarrow E'$ che fa commutare

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & E & \rightarrow & C \rightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 0 & \rightarrow & A & \rightarrow & E' & \rightarrow & C \rightarrow 0 \end{array}$$

Se φ esiste, è automaticamente un isomorfismo.

Dimostriamo che $\text{Ext}'_R(C, A) \longleftrightarrow \{\text{est. di } C \text{ tramite } A\} / \text{isom.}$

Def. Data $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ estensione, applichiamo $\text{Hom}(-, A)$:

$$0 \rightarrow \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(B, A) \rightarrow \text{Hom}(A, A) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}'(C, A)$$

id

Definiamo la classe associata all'estensione come $\alpha(\text{id}_A)$

Oss Se l'estensione è split, la classe in Ext' è zero:

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{i} A \oplus C \xrightarrow{\pi} C \rightarrow 0$$

Siccome $\text{Hom}(-, A)$ è additivo

$$0 \rightarrow \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(A \oplus C, A) \rightarrow \text{Hom}(A, A) \rightarrow 0 \text{ esatta}$$

$$0 \rightarrow \text{Hom}(C, A) \rightarrow \text{Hom}(A \oplus C, A) \rightarrow \text{Hom}(A, A) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}'(C, A)$$

$\uparrow$
 0

e quindi $\alpha(\text{id}_A) = 0$.

Controlliamo che questa def. dipende solo dalla classe di isom. dell'est.

$$0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow 0$$

$$0 \rightarrow \tilde{A} \rightarrow \tilde{E} \xrightarrow{\tilde{\varphi}} \tilde{C} \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccccc} \rightsquigarrow & \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\partial} & \text{Ext}'(C, A) \\ & \downarrow \text{id} & \supset & \downarrow \text{id} \\ & \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\partial'} & \text{Ext}'(C, A) \end{array}$$

Sia $\Theta: \{\text{est. di } C \text{ tramite } A\} / \text{isom} \rightarrow \text{Ext}'(C, A)$ tale mappa.

Per mostrare che è una bijezione, costruiamo un'inversa.

Pushout Supponiamo di avere un'estensione

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & \downarrow \phi & & \downarrow \psi & & \parallel \\ 0 & \rightarrow & A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{p'} & C \rightarrow 0 \end{array}$$

e un omo di R -moduli $\phi: A \rightarrow A'$

Prendiamo $B' := A' \amalg B = A' \oplus B / \langle (\phi(a), -i(a)) \mid a \in A \rangle$

Chi sono le mappe?

$$\begin{aligned} \cdot i' : A' &\longrightarrow A' \oplus B \longrightarrow A' \amalg B \\ \psi : B &\longleftarrow A' \oplus B \longrightarrow A' \amalg B \end{aligned}$$

Il quadrato di sx commuta:

$$\begin{aligned} a &\longmapsto i(a) \longmapsto \overline{(0, i(a))} \\ a &\longmapsto \phi(a) \longmapsto \overline{(\phi(a), 0)} \end{aligned}$$

• i' iniettiva

$$\begin{aligned} \cdot p' : A' \oplus B / \dots &\longrightarrow C \\ \overline{(a', b)} &\longmapsto p(b) \end{aligned}$$

Per la buona del essere che $(\phi(a), -i(a)) \longmapsto p(-i(a)) = -p(i(a)) = 0$

teorema Θ è bigettiva.

DIMOSTRAZIONE

Costruiamo l'inversa. Fissiamo una succ. esatta

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{j} P \longrightarrow C \longrightarrow 0 \quad \text{con } P \text{ proiettivo.}$$

Applichiamo $\text{Hom}(-, A)$:

$$0 \longrightarrow \text{Hom}(C, A) \longrightarrow \text{Hom}(P, A) \longrightarrow \text{Hom}(M, A) \xrightarrow{\partial} \text{Ext}^1(C, A) \longrightarrow \text{Ext}^1(P, A) = 0$$

Data $x \in \text{Ext}^1(C, A)$, $\exists \alpha \in \text{Hom}(M, A)$ t.c. $\partial \alpha = x$.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{j} & P & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \phi & & \parallel \\ E: & 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A \amalg P & \longrightarrow C \longrightarrow 0 \end{array}$$

Affermo che $\Theta(E) = x$.

Applico $\text{Hom}(-, A)$.

$$\begin{array}{ccccc} \alpha \text{ Hom}(M, A) & \xrightarrow{\partial} & \text{Ext}^1(C, A) & & \partial \alpha = \Theta(E) = x \\ \uparrow \alpha^* & \hookrightarrow & \parallel & & \\ \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\partial_E} & \text{Ext}^1(C, A) & & \Theta(E) \\ \text{id}_A \downarrow & & & & \end{array}$$

Quindi ho costruito un'est. con classe x .

Controlliamo cosa succede se scelgo un diverso $\alpha' \in \text{Hom}(M, A)$ con $\partial \alpha' = x$.

$$\partial \alpha = \partial \alpha' \iff \partial(\alpha - \alpha') = 0 \iff \alpha - \alpha' \in \text{Im}(\text{Hom}(P, A) \xrightarrow{j^*} \text{Hom}(M, A))$$

$$\iff \exists \varphi : P \longrightarrow A \text{ con } \alpha - \alpha' = \varphi \circ j$$

Voglio costruire un omomorfismo

$$A \amalg P \longrightarrow A \amalg P$$

$$\text{prendo } i : A \longrightarrow A \amalg P \text{ e } \sigma + i\varphi : P \longrightarrow A \amalg P$$

Prendo $(\alpha'(m), -j(m))$ con $m \in M$: sta nel nucleo perché

$$\begin{aligned} i(\alpha'(m)) + (\sigma + i\varphi)(-j(m)) &= (i\alpha' - \sigma j - i\varphi j)(m) = (i\alpha' - i\alpha - i\varphi j)(m) \\ &= i(\alpha' - \alpha - \varphi j)(m) = 0 \end{aligned}$$

□

⚠ Si potrebbe fare tutto usando solo moduli iniettivi.

Dimensione proiettiva e dimensione globale

Def. Sia A un anello, M un A -modulo.

La dimensione proiettiva di M è

$$\text{pd} = \inf \{ n \geq 0 \mid 0 \rightarrow P_n \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0 \text{ con } P_i \text{ proiettivi} \}$$

Se M non ammette una ris. proiettiva finita, $\text{pd}(M) = +\infty$.

esempio • A campo : ogni M è proiettivo $0 \rightarrow M \rightarrow M \rightarrow 0$ e $\text{pd}(M) = 0 \forall M$

• $A = \mathbb{Z}$ (PD): $0 \rightarrow \mathbb{Z}^{\otimes n} \rightarrow \mathbb{Z}^{\otimes n} \rightarrow M \rightarrow 0 \rightarrow \text{pd}(M) \leq 1$

Esistono esempi con $\text{pd}(M) = 0$ (ad es. $M = \mathbb{Z}$)

e con $\text{pd}(M) = 1$ (ad es. $M = \mathbb{Q}$, non proiettivo)

• $M = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: calcoliamo $\text{Ext}^i(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \neq (0)$

1° modo ci sono almeno 2 est. di $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tramite $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ nella categoria degli $\mathbb{Z}$ -moduli.

2° modo $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$

$\left(\text{Hom}(-, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \right)$

$$0 \leftarrow \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \xleftarrow{(\cdot 2)^*} \text{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \leftarrow 0$$

$$0 \leftarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xleftarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \leftarrow 0$$

$$\Rightarrow \text{Ext}^0(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \text{Ext}^1(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

In generale, $\text{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(m,n)\mathbb{Z}$

$$\text{Ext}^1(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} / n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \simeq \frac{\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}}{(n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z})/m\mathbb{Z}} \simeq \frac{\mathbb{Z}}{(m,n)\mathbb{Z}}$$

Def. La dimensione globale di A è

$$\text{gldim}(A) = \sup \{ \text{pd}(M) \mid M \in \text{Mod } A \}$$

esempio $\text{gldim}(K) = 0$
 $\text{gldim}(\mathbb{Z}) = 1$

Teorema di Auslander-Buchsbaum-serre

$(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano.

(i) $\text{gldim}(A) < +\infty \iff A$ regolare.

(ii) Se vale una delle condizioni in (i), allora $\text{gldim}(A) = \dim(A)$.

Conseguenze

1) A Noeth. regolare, P primo $\Rightarrow A_P$ regolare

2) A Noeth. di dim Krull d. finita. Allora

A è regolare $\iff \text{gldim} \leq d$

e in tal caso coincidono.

3) Teorema delle syzigie di Hilbert:

se K è un campo e $A = K[x_1, \dots, x_n]$, ogni A -modulo

ha una ris. proiettiva di lunghezza $\leq n$.

Fatto Ogni mod. proiettivo fin.gen. su $K[x_1, \dots, x_n]$ è libero

$\Rightarrow$ ogni A -mod fin.gen. ha una ris. proiettiva libera finita.

Lemma A anello, $M \in \text{Mod } A$. Sono equivalenti:

- (i) $\text{pd}(M) \leq d$
- (ii) $\text{Ext}^i(M, N) = 0 \quad \forall N \in \text{Mod } A \quad \forall i > d$
- (iii) $\text{Ext}^{d+1}(M, N) = 0 \quad \forall N \in \text{Mod } A$
- (iv) Per ogni succ. esatta
$$0 \rightarrow M_d \rightarrow P_{d-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

con $P_0, \dots, P_{d-1}$ proiettivi, anche M_d è proiettivo.

DIMOSTRAZIONE

(ii) $\Rightarrow$ (iii) ovvio

(i) $\Rightarrow$ (ii) usando una ris. di lunghezza $\leq d$ per calcolare Ext^i

(iv) $\Rightarrow$ (i) comincio a costruire una ris. proiettiva al solito modo
(iv) mostra che a lunghezza d mi fermo.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Partiamo da una succ. esatta

$$0 \rightarrow M_d \rightarrow P_{d-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

e la spezziamo in succ. esatte corte

$$0 \rightarrow M_{j+1} \rightarrow P_j \rightarrow M_j \rightarrow 0$$

dove $M_0 = M$ e M_d compare nella succ.

Per ogni $N \in \text{Mod } A$, applicando la s.e.l. di $\text{Hom}(-, N)$ trovo

$$\text{Ext}^{i-1}(P_j, N) \rightarrow \text{Ext}^{i-1}(M_{j+1}, N) \rightarrow \text{Ext}^i(M_j, N) \rightarrow \text{Ext}^i(P_j, N) \quad \forall i \geq 2$$

$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$

$$\text{Quindi } \text{Ext}^{i-1}(M_{j+1}, N) \cong \text{Ext}^i(M_j, N)$$

$$\Rightarrow \text{Ext}^1(M_d, N) \cong \text{Ext}^2(M_{d-1}, N) \cong \dots \cong \text{Ext}^{d+1}(M_0, N)$$

$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$

per (iii)

Per la caratterizzazione dei proiettivi, M_d è proiettivo. □

corollario $\text{gldim}(A) = \inf \{d \geq 0 \mid \text{Ext}^d(M, N) = (0) \quad \forall M, N\}$

Lemma $\text{Ext}^i(M, N) = (0) \quad \forall M, N \iff \text{Ext}^i(M, N) = (0) \quad \forall N \quad \forall M \text{ fin. gen.}$

DIMOSTRAZIONE

Baer per $i=1$ + dimension shifting

corollario $\text{gldim}(A) = \sup \{\text{pd}(M) \mid M \text{ fin. gen.}\}$

proposizione $(A, \mathfrak{m}, k)$ locale Noetheriano, M A -mod fin. gen. Allora
 $\text{pd}(M) \leq d \iff \text{Tor}_{d+1}(M, k) = (0)$

DIMOSTRAZIONE

($\Rightarrow$) Usando una ris. proiettiva di Dugh $\leq d$.

($\Leftarrow$) Per induzione su d

- $d=0$: abbiamo visto che $\text{Tor}_i(M, k) = 0 \Rightarrow M$ libero $\Rightarrow \text{pd}(M) = 0$

- $d \geq 1$: prendiamo $0 \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ con P proiettivo.

Prendendo ok troviamo

$$\text{Tor}_i^R(P, k) \rightarrow \text{Tor}_i^R(M, k) \xrightarrow{\cong} \text{Tor}_{i-1}^R(N, k) \rightarrow \text{Tor}_{i-1}^R(P, k) \quad \forall i \geq 2$$

In particolare. $0 = \text{Tord}_H(M, k) \cong \text{Tord}(N, k)$

Wlog P è fin.gen (io prendo ilbero di rango = n° di generatori di M);

anche $N \subseteq P$ è lin. gen. perché A è Noeth.

Per hp. ind. su N , $\text{pd}(N) \leq d-1$.

Se $0 \rightarrow Q. \rightarrow N \rightarrow 0$ è tale ris, allora.

$0 \rightarrow Q \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$ è ris. di M di lunghezza $\leq d$.

[illegible]

teorema A anello Noetheriano regolare, $P \in \text{Spec} A$. Allora A_P è regolare.

DIMOSTRAZIONE

Sei M un massimale che contiene P . Vale $(A_M)_P \cong A_P$

Quindi posso supporre A locale regolare

Per ABS, $\text{gdim}(A) < +\infty$: ogni A -mod ha una ris. proiettiva finita.

Sia $r = \dim A < +\infty$. Considero

$$0 \rightarrow K_n \rightarrow A^{\alpha_{n-1}} \rightarrow \dots \rightarrow A^{\alpha_1} \rightarrow A^{\alpha_0} \rightarrow A/p \rightarrow 0$$

Siccome $\text{pd}(A/p) \leq \text{gldim}(A) = \dim A = n$, per il lemma Kr è proiettivo e fin.gen.

$\Rightarrow K_r$ è libero: $K_r = A^{d_r}$

Tensorizzo per A_p , che è piatto su A :

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}_p^{\frac{d}{2}} \rightarrow \mathbb{Z}_p^{\frac{d}{2}} \rightarrow \dots \rightarrow \mathbb{Z}_p^{\frac{d}{2}} \rightarrow \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\frac{d}{2}} \mathbb{Z}_p \rightarrow 0$$

è una ris. proiettiva finita di $\mathbb{A}^p/\mathbb{P}_{\mathbb{A}^p}$.

Questo implica $\text{grdim}(A_p) < +\infty$.

In effetti, usando tale ris. proiettiva, posso calcolare

$$\text{Tor}_{RH}(M, A_D(p_{A_D})) = (0) \quad \forall M \in \text{Mod}_{A_D} \implies \text{pd}(M) \leq r$$

$$\Rightarrow \text{gldim}(A_P) \leq r \xRightarrow{\text{ABS}} A_P \text{ è regolare.}$$

7

teorema

A anello Noetheriano di dim Krull $d < +\infty$.
 Vale A regolare $\iff \text{gldim}(A) \leq d$
 e in tal caso $\text{gldim}(A) = d$.

DIMOSTRAZIONE

($\Leftarrow$) Fissiamo P un ideale massimale di A .

Seccome $r = \text{gldim}(A) < +\infty$, c'è una ris. di lunghezza $\leq r$ di A/P come A -mod.

$Q. \rightarrow A/P \rightarrow 0$. Tensorizzo per A_P (che è piatto) e

trovo una ris. proiettiva $Q. \otimes A_P \rightarrow A_P/P A_P \rightarrow 0$ come A_P -moduli.

Come prima $\text{gldim}(A_P) < +\infty \xrightarrow{\text{ABS}} A_P$ regolare e $\dim(A_P) = \text{gldim}(A_P) \leq r$

$\dim A = \sup \dim A_P \leq r = \text{gldim}(A) \leq \dim A \implies \dim A = \text{gldim} A$

($\Rightarrow$) Sia A regolare, M A -modulo fin. gen. Scriviamo

$$0 \rightarrow M_d \rightarrow P_{d-1} \rightarrow \dots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

con P_i proiettivi. Dato dim. che M_d è proiettivo, equiv. loc. Sidero

Sia Q un primo. La localizzazione A_Q è regolare, quindi per ABS

$$\text{gldim}(A_Q) = \dim(A_Q) \leq \dim A \implies \text{pd}(M \otimes A_Q) \leq \text{gldim}(A_Q) \leq d$$

$$0 \rightarrow M_d \otimes A_Q \rightarrow P_{d-1} \otimes A_Q \rightarrow \dots \rightarrow P_0 \otimes A_Q \rightarrow M \otimes A_Q \rightarrow 0$$

Per il lemma, $M_d \otimes A_Q$ è proiettivo $\implies$ Sidero.

Questo vale $\forall Q$, quindi M_d è proiettivo $\implies \text{pd}(M) \leq d \forall M$

$$\implies \text{gldim}(A) \leq d.$$

□

Lemma

$(A, \mathfrak{m}, k = A/\mathfrak{m})$ locale Noetheriano.

$\text{gldim}(A) \leq r \iff \text{Tor}_{n+1}(M, k) = 0 \forall M \in \text{Mod} A \iff k$ ammette una ris. proiettiva di lunghezza al massimo r

ES $H^2(S_3, \mathbb{Z})$ dove $\mathbb{Z} = S_3$ -modulo banale

sol $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow 0$ succ. esatta di gruppi
con azione banale

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{0} H^1(S_3, \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(S_3, \mathbb{Q}) \rightarrow H^1(S_3, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rightarrow$$

$$\rightarrow H^2(S_3, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(S_3, \mathbb{Q}) \rightarrow \dots$$

$$H^1(S_3, \mathbb{Z}) = \text{Hom}(S_3, \mathbb{Z}) = (0)$$

$$H^1(S_3, \mathbb{Q}) = \text{Hom}(S_3, \mathbb{Q}) = (0)$$

$$H^1(S_3, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \text{Hom}(S_3, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \text{Hom}(S_3/S_3', \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \text{Hom}(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

$H^2(S_3, \mathbb{Q})$ è un gruppo abeliano di 6-torsione su cui

• 6 è un isomorfismo (perché 6 è su $\mathbb{Q}$)

$$\implies H^2(S_3, \mathbb{Q}) = (0)$$

$$\implies H^2(S_3, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

ES $1 \rightarrow A \times A \rightarrow G \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 1$ dove $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ agisce su A tramite $I \cdot (a_1, a_2) = (a_2, a_1)$
 Dimostrare che $G \cong (A \times A) \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

sol $H^2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, A \times A) = (A \times A)^G / N(A \times A) = \{ (a, a) \} / \langle (a_1, a_2) + (a_2, a_1) \rangle = 0$
 Prendendo (a, id) trovo $N(a, id) = (a, a)$

DEF (i) Dato un complesso B , chiamiamo $B[-1]$ il complesso

$$B[-1]_n := B_{n-1}, \quad d_n^{B[-1]} = (-1) d_{n-1}^B$$

(ii) Sia $f: B \rightarrow C$ un morfismo di complessi.

Definiamo il complesso $\text{cone}(f)$ come

$$\begin{array}{ccccc} C_{n+1} & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & C_{n-1} \\ f_{n+1} \uparrow & & f_n \uparrow & & f_{n-1} \uparrow \\ B_{n+1} & \longrightarrow & B_n & \longrightarrow & B_{n-1} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc} C_{n+1} & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & C_{n-1} \\ & \searrow f_n & & \searrow f_{n-1} & \\ B_n & \longrightarrow & B_{n-1} & \longrightarrow & B_{n-2} \end{array}$$

$$\text{cone}(f)_n := C_n \oplus B[-1]_n = C_n \oplus B_{n-1}$$

$$d_n^{\text{cone}(f)}: C_n \oplus B_{n-1} \longrightarrow C_{n-1} \oplus B_{n-2}$$

$$(c, b) \longmapsto (d_n^C(c) + f_{n-1}(b), -d_{n-1}^B(b))$$

$$d_n^{\text{cone}(f)} = \left(\begin{array}{c|c} d_n^C & f_{n-1} \\ \hline 0 & -d_{n-1}^B \end{array} \right)$$

$$d_{n-1}^{\text{cone}(f)} \circ d_n^{\text{cone}(f)} = \left(\begin{array}{c|c} d_{n-1}^C & f_{n-2} \\ \hline 0 & -d_{n-2}^B \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} d_n^C & f_{n-1} \\ \hline 0 & -d_{n-1}^B \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} d_{n-1}^C \circ d_n^C = 0 & d_{n-1}^C \circ f_{n-1} - f_{n-2} \circ d_{n-1}^B = 0 \\ \hline 0 & d_{n-2}^B \circ d_{n-1}^B = 0 \end{array} \right)$$

Lemma

C'è una successione esatta corta

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow \text{cone}(f) \longrightarrow B[-1] \longrightarrow 0$$

$$C_n \hookrightarrow C_n \oplus B_{n-1} \longrightarrow B_{n-1}$$

DIMOSTRAZIONE

Esattezza come moduli $\checkmark$

$$\begin{array}{ccc} C_n & \xrightarrow{i_n} & \text{cone}(f)_n \\ d_n^C \downarrow & & \downarrow d_n^{\text{cone}(f)} \\ C_{n-1} & \xrightarrow{i_{n-1}} & \text{cone}(f)_{n-1} \end{array}$$

Similmente per la proiezione.

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{i} & (C, 0) \\ \downarrow d^C & & \downarrow d^{\text{cone}(f)} \\ d^C(c) & \xrightarrow{i} & (d^C(c), 0) \end{array} \quad \left(\begin{array}{c|c} d_n^C & f_{n-1} \\ \hline 0 & d_{n-1}^B \end{array} \right) \begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_n^C(c) \\ 0 \end{pmatrix}$$

□

DEF Sia M un A -modulo e $x_1, \dots, x_d \in A$.

Definiamo il complesso di Koszul $K(x_1, \dots, x_d; M) = K(d; M)$ come

$$d=1 \quad K(1; M): \quad 0 \longrightarrow M \xrightarrow{x_1} M \longrightarrow 0$$

$$d \geq 2 \quad K(d; M) = \text{cone}(K(d-1; M) \xrightarrow{x_d} K(d-1; M))$$

esempio $K(1, M)$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\cdot x_1} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \cdot x_2 & & \downarrow \cdot x_2 & & \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\cdot x_1} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \\ & & 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\cdot x_1} & M \longrightarrow 0 \\ & & \oplus & \nearrow \cdot x_2 & \oplus & \nearrow \cdot x_2 & \oplus \\ 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\cdot (-x_1)} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

$K(2, M)$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \xrightarrow{\iota} & M^2 & \xrightarrow{\pi} & M \longrightarrow 0 \\ & & & & \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 m_1 + x_2 m_2 \\ & & m_1 \mapsto (x_2 m_1, -x_1 m_1) \end{array}$$

$K(3, M)$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M^3 & \longrightarrow & M^3 \longrightarrow M \longrightarrow 0 \\ & & & & \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1 m_1 + x_2 m_2 + x_3 m_3 \\ & & \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 m_3 - x_3 m_2 \\ x_3 m_1 - x_1 m_3 \\ x_1 m_2 - x_2 m_1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Lemma $K(d; M)_i \cong M^{(d)}$

Dimostrazione

E' vero per $d=1$;

$$\begin{aligned} K(d+1; M)_i &= K(d; M)_i \oplus K(d; M)_{i-1} \\ &\cong M^{(d)} \oplus M^{(d)} = M^{(d+1)} \quad \square \end{aligned}$$

Coomologia di $K(d; M)$

$$0 \longrightarrow K(d-1; M)_\bullet \longrightarrow K(d; M)_\bullet \longrightarrow K(d-1; M)[-1]_\bullet \longrightarrow 0 \quad \text{per il lemma sui coni}$$

In analogia ottengo:

$$\begin{aligned} H_i(K(d-1; M)_\bullet) &\longrightarrow H_i(K(d; M)_\bullet) \longrightarrow H_i(K(d-1; M)[-1]_\bullet) \xrightarrow{\partial} H_{i-1}(K(d-1; M)_\bullet) \\ &\parallel \\ &H_{i-1}(K(d-1; M)_\bullet) \end{aligned}$$

Calcolo di ∂ :

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow B_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow 0 \quad H_i(C_\bullet) \longrightarrow H_{i-1}(A_\bullet)$$

$$0 \longrightarrow A_i \xrightarrow{b_i} B_i \xrightarrow{c_i} C_i \longrightarrow 0$$

$$\partial[c] = [a_{i-1}]$$

$$0 \longrightarrow A_{i-1} \xrightarrow{a_{i-1}} B_{i-1} \xrightarrow{c_{i-1}} C_{i-1} \longrightarrow 0$$

$$a_{i-1} \rightsquigarrow d_{i-1}^0(c)$$

Nel nostro caso: sia $c \in K(d-1; M)_{i-1} = K(d-1; M)[-1]_i$

sollevamento di c in $K(d; M)_i = K(d-1; M)_i \oplus K(d-1; M)_{i-1}$ $(0, c)$

Applico il differenziale: $(x_d c, d_{i-1}^{K(d-1; M)}(c)) = (x_d c, 0)$ perché c è un ciclo

Quindi $\partial[c] = [x_d c]$: ∂ è semplicemente $\cdot x_d$

Otteniamo

$$0 \longrightarrow \frac{H_i(K(d-1; M))}{x_d H_i(K(d-1; M))} \longrightarrow H_i(K(d; M)) \longrightarrow H_{i-1}(K(d-1; M)) [x_d] \longrightarrow 0$$

proposizione $H_0(K(d; M)) = M/(x_1, \dots, x_d)M$

DIMOSTRAZIONE

$$d=1: 0 \rightarrow M \xrightarrow{x_1} M \rightarrow 0$$

$$H_0(K(1; M)) = M/x_1 M$$

$d \geq 2$: uso la successione costruita sopra con $i=0$

$$0 \rightarrow \frac{H_0(K(d-1; M))}{x_d H_0(K(d-1; M))} \xrightarrow{\sim} H_0(K(d; M)) \rightarrow 0$$

$$H_0(K(d; M)) \simeq \frac{M/(x_1, \dots, x_{d-1})M}{x_d M/(x_1, \dots, x_{d-1})M} \simeq M/(x_1, \dots, x_d)M$$

□

def. $x_1, \dots, x_d \in A$, M un A -modulo.

Diciamo che $x_1, \dots, x_d$ è regolare in M se

(i) $[x_i]: M/(x_1, \dots, x_{i-1})M \rightarrow M/(x_1, \dots, x_{i-1})M$ è iniettiva

(ii) $M/(x_1, \dots, x_d)M \neq (0)$

teorema Se $x_1, \dots, x_d$ è regolare in M si ha
 $H_i(K(d; M)) = 0 \quad \forall i \geq 1$.

DIMOSTRAZIONE

Intanto $H_i = 0 \quad \forall i \geq d+1$ perché $K(d; M)_i \simeq M^{(d)}$, che è zero per $i > d$.

$$d=1: 0 \rightarrow M \xrightarrow{x_1} M \rightarrow 0 \quad \leadsto H_1 = M[x_1] = (0)$$

$d \geq 2, i \geq 2$:

$$0 \rightarrow \frac{H_i(K(d-1; M))}{x_d H_i(K(d-1; M))} \rightarrow H_i(K(d; M)) \rightarrow H_{i-1}(K(d-1; M)) [x_d] \rightarrow 0$$

$\begin{matrix} \parallel & & \parallel \\ 0 & & 0 \end{matrix}$

per hp ind.

$$d \geq 2, i=1: 0 \rightarrow 0 \rightarrow H_1(K(d; M)) \xrightarrow{\sim} H_0(K(d-1; M)) [x_d] \rightarrow 0$$

$$\text{ma } H_0(K(d-1; M)) = M/(x_1, \dots, x_{d-1})M$$

Per ipotesi, $\bullet x_d: M/(x_1, \dots, x_{d-1})M \rightarrow M/(x_1, \dots, x_{d-1})M$ è iniettiva
 $\Rightarrow H_1(K(d; M)) = (0)$.

□

teorema Sia $(A, \mathfrak{m})$ locale Noetheriano.
 Se A è regolare, allora $\text{gldim}(A)$ è finita
 e in effetti $\text{gldim}(A) = \dim(A)$.

DIMOSTRAZIONE

Per dimostrare che $\text{gldim}(A) < +\infty$, basta trovare d.t.c.

$$\text{Tor}_{d+1}(k, M) = (0) \quad \forall M$$

Basta trovare una risoluzione proiettiva di k di lunghezza $\leq d$.

A regolare $\Rightarrow \exists x_1, \dots, x_d$ sist. reg. di parametri
 che è anche una succ. regolare in A

Il complesso $K(x_1, \dots, x_d; A)$ è esatto in grado ≥ 1 e

$$H_0 = A/(x_1, \dots, x_d)A \cong k$$

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{2} A \xrightarrow{1} A \xrightarrow{0} A \rightarrow k \rightarrow 0$$

è esatta in ogni grado $\Rightarrow$ è una ris. proiettiva di lunghezza $\leq d$

Per dire $\text{gldim}(A) = d$, basta esistere un modulo che ha dimensione proiettiva d

Dimostriamo che $\text{pd}(k) = d$ facendo vedere che $\text{Tor}_d(k, k) \neq 0$

Per calcolarlo prendo $\otimes k$ del complesso sopra:

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{0} k^d \xrightarrow{0} \dots \xrightarrow{0} k^d \xrightarrow{0} k \rightarrow 0$$

I differenziali sono 0 perché combinazioni di $x_1, \dots, x_d$, che sono 0 su k

$$\Rightarrow \text{Tor}_d(k, k) \cong k \neq (0).$$

